


LUKION OPETUSSUUNNITELMAN 2021 MUKAINEN

# BIOS 1 – ELÄMÄ JA EVOLUUTIO EVOLUUTIO-OSION ANALYYSI

MIKKO TUULIRANTA

TARKISTETTU & PÄIVI-  
TETTY TOINEN PAINOS



**Lukion biologian kirjan BIOS1:n (Sanoma Pro 2016) evoluutio-osion analyysi tarkastettuna ja täydennettynä uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisen painoksen analyysillä**

Kirjoittanut: Mikko Tuuliranta

Kannet ja taitto: Ari Takku

Oikoluku: Lasse Uotila

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan e-versio on täysin maksuton, ja se on vapaasti saatavilla [www-sivuilltamme osoitteesta luominen.fi/koulubiologia](http://www.sivuilltamme.osoitteesta). Kirjaa voi vapaasti myös jakaa eteenpäin, ja siitä voi ottaa lainauksia artikkeleihin yms. Kaikenlainen kaupallinen käyttö tai hyödyntäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa Luominen ry:ltä.

1. painos 2018, LOPS 2016 mukainen

ISBN 978-952-99782-6-7 (nid.)

ISBN 978-952-99782-7-4 (PDF)

2. painos 2021, LOPS 2021 mukainen

ISBN 978-952-69229-7-3 (PDF)

Kustantaja:

Luominen ry

PL 10, 33581 Tampere

Puh. 020 730 7400 (myös tekstiviesti)

Sähköposti: [asiakaspalvelu@luominen.fi](mailto:asiakaspalvelu@luominen.fi)

Nettisivut: [luominen.fi](http://luominen.fi)



KANSI: Munasolu, istock.com/Jezperklauzen | Suurenuslasi, istock.com/ChakisAtelier | Maapallo, NASA | BIOS1-kannet, Sanoma Pro

**LU**  **MINEN.FI**

# 1. Painoksen esipuhe

Suoritin yläasteen ja kirjoitin ylioppilaaksi 1990-luvulla. Yläasteella evoluutio alkoi läpileikata monien aineiden opetusta. Kemian tunnilla opin elämän synnyn ratkenneen Millerin kokeissa. Biologian opettaja vitsaili itsensä ja erään Riston olevan lähempänä apinoita kun molemmat kykenivät liikuttelevaan päänahkaansa. Hän esitteli myös mm. pikkusormen ”todisteena” evoluutiosta. Erityisen mieleenpainuva oli lukion historian kurssi, jolla kerrottiin monista ihmisen apinaolio-esi-isistä. Muistan hämmästelleni niitä opettajalle ääneen todisteina siitä, että olemme todella syntyneet apinaolioista. Vaikka opettaja antoi vaivautuneen oloisen vastauksen siitä, että kyse oli vain yhdestä teoriasta, niin oppikirjan sanoma ei jättänyt asiasta mitään epäselvyyttä. Samaa viestivät jatko-opintojeni aikana tiededokumentit, tiedelehdet, yms.

Kuulin vuonna 2005 ensimmäisen kerran kritiikkiä evoluutiota kohtaan. Ryhdyin tutkimaan asioita ja minulle selvisi, että totena opetettu evoluutioteoria on parhaimmillaan kokeellisen ja todellisen tieteen tavoittamattomissa oleva todistamaton *uskomus*.<sup>1</sup> Ajatusmaailmani koki todellisen vallankumouksen. Muistan, miten kävin mielessäni läpi kaikkea koulussa oppimaani. Olin hämmästynyt ja rehellisesti sanottuna hyvin närkästynyt siitä, että minulle oltiin opetettu kiistattomana totuutena asioita, jotka parhaimmillaan ovat vain yksipuoleinen kuva asioista ja pahimmillaan lähempää tarkastelua kestäväntöntä disinformaatiota. Olivatko opettajat olleet tietoisia näistä asioista? Jos olivat, miksi niistä ei kerrottu minulle? Mielestäni olisin ansainnut kuulla kaiken.

Tämän kirjan kirjoittaja kirurgi Mikko Tuuliranta julkaisi ensimmäisen evoluutiota käsittelevän kirjansa vuonna 1989. Miten mielelläni olisinkaan yläasteella kuullut evoluutiokritiikistä sen sijaan, että sitä opetettiin minulle muka kiistattomana tosiasiana! Opettajani olisivat voineet suoraan kertoa kritiikistä opetuksessaan tai edes johdattaa minut sen pariin.

Tästä syystä onnittelen Sinua! Kädessäsi oleva kirja on viimeisimmän lukion biologian kirjan (BIOS 1 – Elämä ja evoluutio) evoluutio-osion analyysi. Se on kuin lukuopas, jonka avulla sinut johdatetaan lukion oppikirjan evoluutio-osion läpi ja samalla osoitetaan viiltävällä tarkkuudella juuri ne asiat, joihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Tämän kirjan käsikirjoitus on lähetetty BIOS 1:n kustantajalle ja tekijöille vuonna 2018 helmi/maaliskuun vaihteessa. Emme ole saaneet mitään kommentteja, mutta toivomme, että analyysi huomioidaan seuraavassa painoksessa.

Mielestäni opiskelijoille tulee ehdottomasti antaa kaikki mahdollinen tieto, ja heitä tulee vielä lisäksi kannustaa ottamaan asioista itse selvää mahdollisimman monipuolisesti. Uskon, että puolueettomasti asioihin perehtyvä tekee saman johtopäätöksen kuin minä, Mikko ja moni muu – me emme ole sokean sattuman tulosta, vaan meidät on luotu.

## ARI TAKKU

*suoritti yläasteen Tulkkilan yläasteella, kirjoitti ylioppilaaksi Kokemäen lukiosta 1998 ja valmistui tietotekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2005. Hän toimii kristillisen Luominen-tiedelehden vastaavana päätoimittajana ja asuu vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa Tampereella.*

---

1 Todellinen tiede perustuu nykyhetkessä tehtäviin, toistettaviin kokeisiin, joita voidaan koko ajan havainnoida. Menneisyyden kertaluonteisiin tapahtumiin keskittyvä evoluutioteoria ei siis määritelmän mukaan ole todellista kokeellista tiedettä, vaan kyse on alkuperätieteestä. Alkuperätieteen tuloksien tulkinnessa tulkitsijan maailmankuvalla on hyvin suuri vaikutus.

## 2. Painoksen esipuhe

Ajantasalla oleva päivitys on tieteellisen aikakautemme laatumerkki; lääkärinä jouduin melkein päivittäin päivittämään tietojani lähes viisikymmentä vuotta. Oppikirjojen sanotaan olevan vanhentuneita jo painosta tullessaan. Painettujen kirjojen ongelma on siinä, että monista syistä, kuten taloudellisista, johtuen, niitä ei voida päivittää joka vuosi. Oppikirjojen kalleutta perustellaan mm. sillä, että päivitykset tulevat niin kalliiksi. Esimerkiksi nyt käsittelyssä olevan *BIOSI*:n hinta Suomalaisessa kirjakaupassa oli tänä syksynä (2021) 51,75€!

Koulukirjat uusittaneen tavallisesti noin viiden vuoden välein, aihepiiristä riippuen: matematiikan kirjat tuskin paljoa päivitystä tarvitsevat, kun taas biologian kirjat pitäisi joiltain osiltaan päivittää lähes vuosittain. Siirtyminen paperista ekirjoihin kuitenkin poistaa tätä hankaluutta.

Vuonna 2018 analysoimastani lukion biologian oppikirjasta (*BIOSI*, 2016) tuli siis tänä syksynä uusi painos. Koska olen koko aikuisikäni elänyt ”päivitysten maailmassa”, päätin katsoa tarvitseeko myös *BIOSI*:n analyysi päivitystä uuden painoksen johdosta. Ennako-oletukseni oli, että tuskin ja olin melko oikeassa. Stephen J. Gould (1941-2002) oli 1900-luvun tunnustetuimpia paleontologeja ja evoluution tutkijoita. Hän arvosteli kovin sanoin biologian oppikirjojen kirjoittajia siitä, että he eivät vaivaudu seuraamaan aikaansa, vaan kopioivat vanhojen kirjojen tiedot lähes sellaisinaan uusiin laitoksiin. Erityistä moitetta saivat saksalaisen eläintieteen professori Ernst Haecklin vääristelemät selkärankaisalkoiden kuvat vuodelta 1874 (jotka edelleenkin esiintyvät eräässä toisessa lukiomme biologian oppikirjassa [*Koralli*, 2016]).

Mitä uuden *BIOSI*:n evoluutio-osioon tulee, Gouldin havainto pätee yhä: länsirintamalla ei mitään uutta – ei ainakaan merkittävää. Miksi ei mitään uutta (ja positiivista)? Siksi, että mitään uusia positiivisia todisteita evoluution ”suurista askelista”, siis makroevoluutiosta tai ns. elämän synnyn kokeista, Mars-tutkimuksista tms., ei ole ilmaantunut. Päinvastaisia havaintoja / tutkimustietoa sitä vastoin karttuu jatkuvasti, mutta niistä ei tietenkään puhuta; kirjoittajat tuskin ovat edes niistä tietoisia.

Evoluutio-osuutta on hieman lisätty (muun tiedon kustannuksella!): Kokonaan uusi ”aluevaltaus” on kosminen evoluutio (yksi sivu). Jotta sille olisi saatu tilaa, biologiassa erittäin keskeiset entsyymit on kuitattu yhdellä lauseella, vaikka edellisessä laitoksessa niille oli uhrattu puolitoista sivua kuvien kera! ”Uutena tietona” esitellään tiedemiesten jo ajat sitten täysin epärealistiseksi julistamaa RNA-maailmaa! Monia kuvia on vaihdettu, jotta vaikutelma päivityksestä olisi uskottavampi.

Uuden *BIOSI*:n lyhyt analyysi löytyy tämän kirjan lopusta, ja sen jälkeen vielä muutama sana toisesta käytössä olevasta lukion biologian kirjasta (*Koralli BI*, 2016).

Jyväskylässä lokakuussa 2021

### MIKKO TUULIRANTA

suoritti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Louis Pasteurin yliopistossa Ranskan Strasbourgissa ja valmistui kirurgian erikoislääkäriksi Tampereen yliopistollisesta sairaalasta vuonna 1983. Hän toimii Luominen ry:n hallituksen puheenjohtajana. Lue lisää: [luominen.fi/mikko-tuuliranta](http://luominen.fi/mikko-tuuliranta).

# Sisällysluettelo

1. Painoksen esipuhe.....	2
2. Painoksen esipuhe.....	3
1. Painoksen kiitokset, johdanto & taustaa.....	6
Miksi analysoida juuri BIOS 1?.....	8
Aiemmat koulubiologian analyysit 1 ja 2.....	10
2. Painoksen kiitokset.....	11
Lukuohje, analyysissä käytetystä muotoilusta.....	12
BIOS 1 / Luku 2: Mitä elämä on?.....	13
Elämän tunnistaa monista ominaisuuksista (s.18).....	13
BIOS 1 / Luku 7: Evoluutio perustuu muunteluun ja luonnonvalintaan.....	14
Evoluutio on sopeutumista muuttuviin ympäristöihin (s.73).....	14
Geenimutaatiot ovat evoluutiolle tärkeitä (s.75).....	16
Vastaväite: geenimutaatiot ovat parhaimmillaankin lähes merkityksettömiä.....	17
Mutaatiokokeet tuottivat pahimillaan kuolemaa ja parhaimmillaankin pelkkiä kuriositeetteja.....	19
Solubiologian keskeinen dogma eli DNA "elämän piirustuksina" on kuollut.....	19
Ympäristö aiheuttaa muuntelua (s.77).....	21
Luonnonvalinta muuttaa populaation alleelien lukusuhteita (s.78).....	22
Luku 8: Populaatioista voi vähitellen kehittyä uusia lajeja.....	23
Mikroevoluutiossa populaatioiden geenikoostumus muuttuu (s.86).....	23
Makroevoluutiossa syntyy uusia lajeja (s.87).....	23
Uusi kasvilaji voi syntyä nopeastikin (s.90).....	24
Pullonkaulailmiön seurauksena vain pieni osa populaatiosta jatkaa sukua (s.92).....	24
Avainsopeutumat mahdollistavat uusien elinympäristöjen valtaamisen (s.95).....	25
BIOS 1 / Luku 9: Elämä syntyi ja kehittyi merissä.....	26
Alkumaapallon olosuhteet mahdollistivat elämän synnyn (s.100).....	26
Elämän syntyä edelsi pitkä kemiallinen evoluutio (s.101).....	28
Vesi – Vihoviimeinen paikka biomolekyylien synnylle.....	29
Millerin–Ureyn kokeet tuottivat lähinnä myrkkyjä.....	34
Fotosynteesin kehittyminen merkitsi valtavaa kehitysaskelta (s.103).....	36
Fotosynteesin kehittyminen olisi ollut tulella leikkimistä.....	40
Miten oppikirjat selittävät fotosynteesin kehittymistä?.....	42
Hapen lisääntyminen johti soluhengityksen kehittymiseen (s.104).....	44
Aerobisen, happeen perustuvan soluhengityksen evoluutio?.....	46
Tumallinen solu syntyi tumattomien solujen sulautuessa yhteen (s.104).....	47
Aerobisen ja anaerobisen liitto – mahdoton yhtälö?.....	50
Mitokondriolla on muutakin tekemistä kuin energian tuotanto.....	51
Kromosomit ja "kromosomit".....	53
Monisoluisien eliöiden alkuperän mysteeri.....	54
"Elämän piirustukset" on taltioitu jättikokoiseen munasoluun, geenien ulkopuolelle.	
Geenikeskeinen "moderni" synteesi/evoluutioteoria on kuollut.....	56
Suvullisen lisääntymisen mysteeri.....	58

Evoluutio tapahtui väärässä järjestyksessä.....	59
Trilobiitin mykistävän nerokkaat silmät.....	60
BIOS 1 / Luku 10: Kasvit kehittyivät levistä.....	61
Kasvien ja sienten evoluutio on kulkenut rinnakkain (s.118).....	62
BIOS 1 / Luku 11: Eläimet sopeutuivat elämään maalla.....	63
Liskoista nisäkkäiksi?.....	67
Dinosauruksista linnuiksi – vai linnuista dinosauruksiksi?.....	70
Dinosaurusten aikakausi?.....	75
BIOS 1 / Luku 12: Ihmisen evoluutio alkoi kädellisistä nisäkkäistä.....	78
Nivelten "4-bar -mechanism" ei voi kehittyä.....	82
Liian vanhoja ihmismäisiä jalanjälkiä.....	83
Kun aivot kasvoivat syömällä.....	84
BIOS 1 / Luku 13: Evoluutiota tutkitaan monella tavalla.....	86
Fossiilien ikä voidaan määrittää tarkasti (s.144).....	86
Johtofossiiliajoitus on kehäpäätelmä.....	86
Radioaktiivisen iänmäärityksen sudenkuoppia.....	87
Radiohiilen mysteeri.....	88
Kivet eivät ole kelloja (Rocks aren't clocks).....	89
Jotkin lajit ovat säilyneet pitkään samanlaisina (otsikko, s. 145 ).....	90
Fossiiliarja kertoo jonkin lajin kehityshistorian.....	90
Onko eläimissä ja ihmisessä evoluutiopolun varrelta jääneitä surkastumia?.....	92
Pikakelaavatko selkärankaisalkiot lajikehitystään? Onko ihmisalkiolla häntä ja kidukset?.....	95
Ovatko selkärankaisten eturaajojen luut todiste yhteisestä kantamuodosta?.....	96
Ihmisen ja simpanssin kromosomit ja DNA.....	97
DNA:n emäsjärjestys kertoo sukulaisuussuhteista (s.148).....	98
Molekyylit kääntävät omia aikojaan.....	99
Yhteenveto ja johtopäätökset.....	101
Tarvitaan syvällisempää tiede- ja evoluutio-opetusta.....	102
Loppusanat.....	102
Lukion opetussuunnitelman 2021 mukainen BIOS1 – elämä ja evoluutio.....	104
Poimintoja uudesta kirjasta.....	105
Luku 4: Mikroevoluutio perustuu mutaatioihin, luonnonvalintaan ja sattumaan.....	106
Luku 5: Makroevoluutiosta populaatiosta syntyy uusia lajeja.....	106
Luku 6: Eliömaailman luokittelu perustuu evoluutiotutkimukseen.....	107
Luku 7: Elämä syntyi ja kehittyi merissä.....	107
Luku 10: Eläimet sopeutuivat elämään maalla.....	108
Luku 11: Ihmisen evoluutio on osa kädellisten evoluutiota.....	110
1.7 Biologinen tutkimus noudattaa tiettyjä vaiheita.....	111
Summa summarum: LOPS 2021 yhteenveto.....	112
Lopuksi pari irtopointia siitä, miten kaikki kehittyi tai ei kehittynyt.....	113
Koralli BI <sub>1</sub> , lukion biologia.....	114

# 1. Painoksen kiitokset

Tahdon kiittää lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Lasse Uotilaa oikoluvusta ja tekstiä ja kirjaa koskevista monista hyvistä huomioista ja ehdotuksista.

## 1. Painoksen johdanto & taustaa

Skeptisyyteni evoluutiota<sup>1</sup> kohtaan heräsi 1970-luvulla ja juontaa juurensa edellisen vuosikymmenen lopulle: Lukiomme biologian kurssiin kuuluneesta evoluutioteoriasta ja oppikirjassamme kuvatusta ihmisen sukupuusta tuli oman elämäni (ja ammattini) vedenjakaja: Olin alkukesästä 1969 pyrkimässä Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Osana valintakriteereitä oli kirjallinen kuulustelu, jonka pohjana oli *Lukion biologia*, Sorsa-Leikola-Mattila-Sorsa (1966). Opettelin kirjan lähes ulkoa – paitsi ihmisen sukuun Kurténin mukaan.<sup>2</sup> En nähnyt mitään syytä ruveta pönttämään päähäni jotain kuviteltua raapustusta, jonka alla oli jokin kummallinen latinankielinen nimi (nimi, jonka omistaja koostui kirjan kuvan mukaan kahdesta leukaluun palasta ja muutamasta hampaasta). Otuksella ja sen oletetuilla, kauan sitten eläneillä jälkeläisillä kun ei joka tapauksessa pitäisi olla mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Asennoitumistani sukupuuta kohtaan voitaisiin kutsua pragmaattiseksi eli käytännölliseksi: miksi vaivata päätä moisella turhuudella, kun kukaan järkäv ihminen ei kuitenkaan kysyisi sitä pääsykokeissa. Asenteellani ei ollut mitään tekemistä luomiskysymyksen tai uskonnollisen vakaumuksen kanssa; olin sekularisti, maallistuneen kodin maallistunut kasvatti. Jumalan olemassaoloon toki uskoin, mutta Jumala istui elämäni junan viimeisessä vaunussa ja minä veturissa.

Pääsykoekuulustelussa oli kaksi kysymystä: 1) Kaasujen vaihto hengityksessä, ja 2) Ihmisen sukuu Kurténin mukaan! En siis päässyt Helsinkiin. Saman vuoden syyskuussa lähdin kokeilemaan onneani Ranskaan (Strasbourg), jossa sain lääketieteen lisensiaatin opintoni päätökseen vuonna 1976. Tuon seitsemän vuoden aikana en koskaan kuullut tiedekuntamme luentosaleissa sanoja ”evoluutio”, ”Kurtén”, ”ihmisen sukuu”, ”Ramapithecus” tai ”Darwin”. Päinvastoin: neurofysiologian professorimme Karli totesi kerran luennollaan, että ”hermoimpulssin hyppäyksellinen kulku myeliinituppisissa aksoneissa on nerokkaasti suunniteltu” – kommentti, joka herätti ajattelemaan: Biokemia, ihmisen anatomia ja fysiologia, sydämen ja munuaisten rakenne ja toiminta jne. vaikuttivat niin monimutkaisilta, että jos halusi olla älyllisesti rehellinen, evoluutioteoriaa sukupui-  
neen oli pakko ruveta ihmettelemään. Mieleen alkoi hiipiä epäilyn häivä: miten jostain ammoniakista ja fosforisuoloista sisältävästä Darwinin ”pienestä lämpimästä lätäköstä” voisi molekyyliliin onnekkaiden törmäilyjen vaikutuksesta syntyä ensin jotain bakteerien kaltaisia ”yksinkertaisia alkueliöitä” ja lopuksi variksia, apinoita ja ihmisiä?

1 Evoluutio voi olla monimerkitsevä käsite. Evoluutiolla/evoluutioteorialla, jota koskevaa kouluopetusta aion nyt analysoida, tarkoitetaan elämän spontaania syntyä ”tyhjästä” sekä täysin uudentyypisten eliöryhmien kehittymistä ”yksinkertaisista” alkumuodoista. (Joskus puhutaan myös makroevoluutiosta.)

2 Björn Kurtén (1924–1988) oli suomalainen paleontologi. Hänen laatimassaan sukupuussa ”kantaisämme” oli *Ramapithecus*, josta siis todisteena kaksi-kolme leukaluun palasta ja muutama hammas. Sittemmin Kurténin ”todisteet” osoittautuivat olevan peräisin sukupuuttoon kuolleen orankirodun edustajalta. Muuan ystäväni on lukenut kaikki Kurténin julkaisemat kansantajuiset teokset. Yhdessä niistä hän kuulemma kuvailee *Ramapithecusta* ja sen elintapoja niin tarkasti, että luulisi hänen jopa viettäneen sen kanssa yhteisiä hetkiä. (*Ramapithecus* löytyi Intiasta 1930-luvulla, mutta nykykäsityksen mukaan ihmisen kantamuoto syntyi Afrikassa.)

Kotimaahan palattuani huomaisin, että Kurténin sukupuu oli kaatunut jo vuosikymmenen alkupuolella. Puun muisto jäi kuitenkin elämään. Myöhemmin, saatuani erikoislääkärin opintoni päätökseen ja asettauduttuani aloilleni, aloin ottaa asioista selvää ja kritisoin ihmisen oletettua polveutumista eräässä kirjassani.<sup>3</sup> Sanomalehti *Kalevan* tiedetoimittaja Holopainen veti siitä herneet nenäänsä ja esitti, että lääkäriinointeuteni pitäisi perua: ”Evoluutio on biologian selkäranka ja biologia on lääketieteen selkäranka. Jos mies ei ymmärrä evoluutiota, ei hän voi toimia lääkärinä!”<sup>4</sup>

Reaalilääketiede ja tiedetoimittajan evoluutiolääketiede ovat kuitenkin olleet melkein yhtä kaukana toisistaan kuin itä on lännestä. Pari esimerkkiä: Darwinin teoria<sup>5</sup> on toiminut lääketieteellisen kehityksen jarruna kuviteltuine turhine elimineen, roska-DNA-oppeineen<sup>6</sup> jne.: Apina- eli sukupuuteoria harhautti lääkärit vuosikymmeniksi hoitamaan selkäsairaita väärillä periaatteilla. Kuviteltuja turhia elimiä (surkastumia) poistettiin kevein perustein altistaen potilaat toimenpiteistä johtuville komplikaatioille. Vielä 1950-luvun alussa ei tiedetty, miten ihmisen munuainen väkevöi virtsaa. Hargitay, Kuhn ja Wirtz esittivät vuonna 1951, että munuaisemme toimii vastavirtausperiaatteella. Ajan vaikutusvaltaisain munuaisekspertti ja darvinisti Homer Smith kuitenkin vastusti heidän teoriaansa ja tutkimustyötään kahdeksan vuoden ajan toimien lääketieteen kehityksen jarrumiehenä. Smithin mukaan munuaisemme ei voi toimia vastavirtausperiaatteella: Vastavirtausperiaate on liian monimutkainen; sellainen ei olisi voinut kehittyä pienin askelin vähittäisten muutosten kautta, mekanismi jota Darwinin teoria edellytti.

Lääkärit eivät tarvitse Darwinin teoriaa ymmärtääkseen esimerkiksi selkäsairauksia, nivustyriä, suonikohjuja, peräpukamia, influenssavirusten, sairaalabakteerien ja sirppisoluanemian ”evoluutiota”, alkion kehitystä, umpilisäkkeen, häntäluun, silmän ”vilkkuluomen”, ihokarvojen, karvankohottajalihaksen, jaokkeisten vatsalihasten tai kuumeen merkitystä.

Pennsylvanian yliopiston kemian professori Philip Skell kysyi eri alojen tutkijoilta vaikuttiko evoluutioteoria jollain tapaa heidän tutkimustyöhönsä:

”Kysyin hiljattain yli 70 arvostetulta tutkijalta, että olisivatko he tehneet työtään toisin, jos olisivat ajatelleet, että Darwinin teoria on väärä. Kaikilta

3 *Evoluutio – tieteen harha-askel*, Ristin Voitto 1989.

4 Jorma Palo, Helsingin yliopiston neurologian professori, joka toimi myös lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina, esitti muistaakseni joskus 1980-90-lukujen taitteessa, että lääketieteelliseen tiedekuntaan ei pitäisi ottaa opiskelijoita, jotka eivät usko Darwinin teoriaan. Peruste: heistä ei voi tulla hyviä tutkijoita, koska he uskovat ”yliluonnolliseen” (johon lääketiede ei voi perustua). Esitystä ei kuitenkaan hyväksytty.

5 Darwinin teorialla tarkoitin tässä (ellen toisin mainitse) hänen alkuperäisestä teoriastaan 1930-40-lukujen taitteessa johdettua ns. uusdarwinistista teoriaa, ”modernia synteisiä”, joka luonnonvalinnan ohella perustuu mutaatioihin ja populaatiogenetiikkaan. (Darwinin aikaan mutaatioista eli perimän, DNA:n muutoksista ei tietenkään tiedetty mitään.)

6 1970-luvulla, kun molekyylibiologia alkoi kehittyä, huomattiin, että vain noin 1 – 1,5 % DNA:sta koodaa proteiineja. Koska 99 prosentin funktiota ei tunnettu, evoluutioteoretikot alkoivat väittää, että se on ”fossiilista” DNA:ta, surkastumaa, jolla ei enää ole mitään funktiota. Siksi se on *vahva todiste* tapahtuneesta evoluutiosta: ”Valegeenien rinnalla on hämmästyttävä tosiasia, että perimästä valtaosa (ihmisellä 95 prosenttia) on täysin tarpeetonta ja se voisi aivan hyvin kadota” (Richard Dawkins, *Maaailman hienoin esitys – Evoluution todisteet*, Terra Cognita 2009, s.306-307). Siksi ”roska”-DNA jätettiin lähes tutkimatta lähes 40 vuodeksi, harhaoppi, jota *Cell Biology International* kutsui molekyylibiologian kaikkien aikojen suurimmaksi skandaaliksi: ”Jos roskaa olisi tutkittu siinä kuin proteiineja koodavaa DNA:takin, tietomme genetiikasta ja sairauksistamme olisi nyt aivan eri tasolla. – Mutta nyt olemme lähes 40 vuotta myöhässä.” Lukemistani koulubiologian oppikirjoista en kuitenkaan ole löytänyt mainintoja roska-DNA:sta (engl. *junk-DNA*).



sain saman vastauksen: en.<sup>[7]</sup> Tutkin myös viime vuosisadan kaikkein merkittävimpiä biotieteellisiä saavutuksia: DNA-kaksoiskiirteen löytyminen, ribosomin rakenteen ja toiminnan selvittäminen, genomien kartoitus, lääkeainetutkimus, ruuan tuotannon ja terveydenhuollon parantaminen, kirurgian kehitys jne. Tenttasin myös biologeja, joiden työkenttään kuuluvat sellaiset alueet, joita darvinistisen paradigman luulisi hyödyntävän kaikkein eniten eli vastustuskyvyn syntyä antibiooteille ja tuholaismyrkyille. Täällä, kuten muuallakin, sain huomata, ettei Darwinin teoria ollut tarjonnut mitään havaittavaa opastusta. Mutta sitten kun jokin läpimurto oli jo tehty, teoria kaivettiin esiin ikään kuin 'mielenkiintoisena sanan selityksenä'" (*The Scientist* 19/16, August 2005, p. 10).

Olen kiitollinen vuoden 1969 pääsykoekysymysten laatijalle. Jos toisenakin kysymyksenä olisi sukupuun sijasta ollut jotain asiallisempaa, olisin saanut paremmat pisteet ja ehkä päässyt Helsinkiin. Mutta onneksi sain muuttaa ulkomaille, sain oppia uuden kielen ja oppia tuntemaan vierasta kulttuuria. Ranskasta löysin myös oman erikoisalani, kirurgian maailman huippuja kuten René Stoppan, josta tuli myös pitkäaikainen ystävä. Sain seurata heidän työtään ja osallistua heidän järjestämiinsä koulutustilaisuuksiin – Kurténin sukupuun ansiosta.

## Miksi analysoida juuri BIOS 1?

Analyysin kohteena on BIOS 1 siksi, että se sattui olemaan uusin, jonka kirjakaupan hyllyltä löysin (ja josta siitäkin löytyy ihmisen sukupuu, vuosimallia 2016, järjestysnumero xyz). Ja siksi, että tämänkin kirjan moniin tietoihin, jos haluaa olla älyllisesti rehellinen, on pakko suhtautua skeptisesti. Monet niistä ovat kyseenalaisia, *osa selvästi virheellisiä*: kirja esittelee tiedon ohella myös tiedon nimellä kulkevaa vale/näennäistietoa. [BIOS 1 ei tietenkään ole poikkeus, samat opit löytyvät muistakin koulukirjoista – jopa jo peruskoulun 7. luokan biologiasta (esim. *Silmu*)].

En silti halua syyttää tekijöitä disinformaatiosta. Heidän toimintansa lienee ymmärrettävissä mm. siitä syystä, että ns. vertaispaine kollegojen (ja naturalismin porttivahtien) taholta saattaa olla melkoinen: Perinteet pakottavat, velvoittavat esittämään evoluution ikään kuin se perustuisi tietoon, luonnontieteiden havaintoihin: Kaikkihan ovat jo vuosikymmenet niin opettaneet – kuten ne yliopistojen kurssikirjat, joita olen käyttänyt apunani tätä analyysia laatiessani. Tekijät todennäköisesti itsekin uskovat kirjoittamaansa – liekö heidän mieleensä edes tullut, että se, mitä heille itselleenkin on aikoinaan opetettu, ei ehkä aina ollutkaan aivan totta? – Niin tai näin, **BIOS 1:ssä on useita virheitä**. Vertaispaineita tai ei, kirjoittajien olisi syytä päivittää tietoaan.

---

7 Tämä on siis tulkittavissa vain siten, että tutkijat tekivät työnsä ikään kuin Darwinin teoriaa ei olisikaan.

Miksi vanhoista opeista ei haluta luopua? Siksi, että perinteisten ”todisteiden” kaatuminen kyseenalaistaisi koko uusdarwinismin eli ”modernin” synteessin<sup>8</sup> (Lainausmerkit siksi, että ”moderni” on tässä tapauksessa vuosimallia noin 1940.) Eikä evoluutiolle käytännössä ole – ei ainakaan ns. ”sivistyneissä länsimaissa” juuri muuta vaihtoehtoa kuin vanha tuttu Mooseksen luomiskertomus ja ns. älykäs suunnittelu (*design*). Se ei kuitenkaan voi tulla kysymykseen, sillä teokratian ja uskonnollisten ääri liikkeiden peikot alkavat heti kummitella – ja jo pelkkä ajatus Luojusta kauhistuttaa: Äiti Luonto on sentään niin paljon mukavampi kuin Isä Jumala, joka on asettanut luoduilleen moraalisia velvoitteita. Tätä mieltä oli esim. Harvardin yliopiston biologian professori Richard Lewontin:

”Pidämme tieteen<sup>9</sup> puolta huolimatta joidenkin sen ajatusrakennelmien päivänselvästä mielettömyydestä – huolimatta siitä, että tiedeyhteisö suvaitsee toteennäyttämättömiä, kuvitelmiin perustuvia tarinoita, koska meillä on ennakkositoumus, sitoutuminen materialismiin. Lisäksi materialismimme on ehdotonta, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa ovenrakoon.”<sup>10</sup>

Siispä oppikirjojen laatijoiden, jos uskottavina tieteen edustajina esiintyä haluavat, on toimittava tuon ennakkositoumuksen puitteissa. Siihen liittyy kirjoittamaton laki, että teoriaa ei saa edes epäillä. Ja vaikka he sisimmässään epäilisivätkin, he eivät voi tuoda sitä julki sen pelossa, että ”joutuvat synagogasta erotetuiksi”: Yliopistomaailmassa kriittinen suhtautuminen evoluutioteoriaan saattaa tietää ongelmia, kuten vaikeuksia saada tutkimusmäärärahoja jne. Uraputki saattaa nousta pystyyn. Ja pelkästään sen tunnustaminen, että tiede ei tiedä elämän synnystä mitään, ei yhtään mitään, on mahdotonta.

Analyysini apuna olen käyttänyt mm. seuraavia (evoluutiouskoisia) teoksia:

- Alberts, Johnson ym.: *Molecular Biology of The Cell*, Garland Science 2015
- Benton Michael: *Vertebrate Palaeontology*, WILEY Blackwell 2015
- Campbell, Reece ym.: *Biology – A Global Approach*, Pearson 2015
- Heino & Vuoto: *Biokemian ja solubiologian perusteet*, WSOY 2007
- Madigan, Martinko ym.: *Brock Biology of Microorganisms*, Pearson 2009
- Sariola, Frilander ym.: *Kehitysbiologia – Solusta yksilöksi*, Duodecim 2015

Kaikki nämä pitävät evoluutiota – makroevoluutiota itsestään selvytenä. Mutta jos tarkemmin perehtyy kirjojen väitteisiin ja ”todistuksiin”, ei tarvita kovin suurta oppineisuutta eikä viisautta huomatakseni ne kyseenalaisiksi, epämääräisiksi ja joskus keskenään ristiriitaisiksi. Usein evoluutio vain mainitaan sivulauseissa ikään kuin tapahtuneena tosiasiana, itsestään selvytenä ilman minkäänlaisia perusteluja. Ks. esim. oppikirjojen esitykset fotosynteesin ”kehittymisestä” sivulta 36.



8 Uusdarwinismille, modernille synteessille on etsitty vaihtoehtoja jo vuosikymmenet ilman että ns. tieteellinen yhteisö olisi päässyt niistä minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen. Jo tämä osoittaa teorian monet heikkoudet ja puutteet. Tästä muutama sana aivan lopussa.

9 Pidämme tieteen puolta...” – Lue: ”materialistisen tieteen tulkinnan” puolta.

10 Lewontin, R., Billions and billions of demons (review of *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark* by Carl Sagan, 1997), *The New York Review*, p. 31, 9 January 1997.

## Aiemmat koulubiologian analyysit 1 ja 2

Joistakin aihepiireistä löytyy perusteellisempaa tietoa tammikuussa 2014 osittain päivitetystäni Koulubiologian analyyseistä 1 ja 2, jotka löytyvät Luominen ry:n kotisivulta nimellä *Evoluutioteorian analyysi 1* ja 2. Ne ovat kuitenkin melko laajoja. Tämä analyysi on tarkoituksella laadittu lyhyemmäksi, jotta useampi jaksaisi sen lukea. Tässä ei olekaan tarkoitus käsitellä oppikirjan kaikkia evoluutioväittämiä – ainakaan kovin laajasti.



**Koulubiologian analyysit on vapaasti luettavissa ja tulostettavissa netistä: [luominen.fi/koulubiologia](http://luominen.fi/koulubiologia).**

## 2. Painoksen kiitokset

Kiitän lämpimästi uuden analyysin oikoluvusta lukion maantieteen ja biologian lehtori Tuula Väyrystä (Viitasaari). Hän kommentoi uutta painosta mm. seuraavasti:

”Lukion pakollisessa kahdessa biologian kurssissa perusbiologian asioita on aivan mitättömän vähän. Esimerkiksi mitoosi, meioosi ja proteiinisynteesi mainitaan kuvissa ihan vaan sivumennen. Pakollisessa kurssissa on perinnöllisyystiedettä, mutta biologian yo-kokeissa on jo tultu siihen, että tehtävät ovat vain varjo entisestä. Taso on huimasti laskenut ja esimerkiksi tämän syksyn yo-kokeessa ollut perimän tehtävä oli aivan naurettavan helppo.”

Haluan kiittää myös DI Ari Takkua koko kirjan uudesta oikoluvusta sekä huomiosta, joiden pohjalta myös vanhaa tekstiä on hieman muokattu ja lisätty jotain uutta (esim. korvanliikuttajalihasten funktio).

Jyväskylässä lokakuussa 2021  
Mikko Tuuliranta

## Lukuohje, analyysissä käytetystä muotoilusta

Koska tämä kirja on toisen kirjan (lukion oppikirjan) analyysi, muotoilulla on selvästi eroteltu mikä osa kirjasta on lainausta analysoitavasta kirjasta ja tällä tavoin on pyritty helpottamaan analyysin lukemista.

Korkeimman tason otsikko viittaa BIOS 1:n lukuihin. Yleensä korkeimman tason otsikon alla on BIOS 1:n alaotsikko, joka on hieman pienemmällä fontilla. Aliotsikoita on myös ilman ylempien tason otsikoita. Aliotsikoissa on aina suluissa viittaus BIOS 1:n sivunumeroihin. Molemmat otsikot tunnistaa tiiviimmästä fontista ja kursivoinnista:

### ***Viittaus BIOS 1:n lukuun X***

#### ***Alemman tason otsikko (viittaus BIOS 1:n sivuun xyz)***

Analyysin kirjoittajan lisäämät otsikot on muotoiltu leveämmällä, ei-kursivoidulla fontilla:

### **Esimerkki kirjoittajan omasta otsikosta**

Kirjassa on kahdenlaisia lainauksia. Suorat lainaukset BIOS 1:stä on sisennetty aaltoviivalla eroteltuina kokonaisuuksina (ja mukana on yleensä myös BIOS 1:n sivunumero).

*”Tämä lause esittää BIOS 1:stä lainattua osiota. Alkuperäisessä (eli BIOS 1:ssä) olevat muotoilut esitetään **lihavoituna** kun taas analyysin kirjoittajan korostukset on esitetty alleiviivauksin.”*  
(viittaus BIOS 1:n sivuun xyz)

Suorat lainaukset muista lähteistä on sisennetty ilman aaltoviivoja ja erilaisella fontilla:

”Tämä lause esittää muusta lähteestä otettua suoraa lainausta. Sen ympärillä ei ole aaltoviivoja ja sen tunnistaa isommasta ja erilaisesta fontista.”

## **BIOS 1 / Luku 2: Mitä elämä on?**

### **Elämän tunnistaa monista ominaisuuksista (s.18)**

Näitä ominaisuuksia luetellaan yhdeksän, joista viimeisenä evoluutio eli *lajinkehitys*:

*”Eliöiden geneeissä tapahtuu muutoksia, joiden avulla eliöt sopeutuvat vallitseviin ympäristöoloihin sekä mahdollisiin ympäristön muutoksiin. Saalistuksen kohteena olevat eläinlajit esimerkiksi sulautuvat yleensä hyvin ympäristöönsä, kuten kuvan merihevon. Parhaat naamioitujat selviävät hengissä ja saavat eniten jälkeläisiä. Näin huonommin sopeutuneiden yksilöiden määrä pikkuhiljaa vähenee. Tätä lajin sopeutumista muuttuviin ympäristöoloihin kutsutaan evoluutioksi” (s.19).*

Sopeutuminen muuttuviin ympäristöoloihin (tässä tapauksessa naamioituminen) on siis yhtä kuin evoluutio. Suojavärin muutos voidaan kuitenkin saada aikaan pelkällä ”yksinkertaisella” yhden tai muutaman geenin ilmentymisen säätelyllä. Mutta: kun oppikirjassa päästään varsinaiseen evoluutio-osioon, evoluution määritelmä onkin jo muuttunut joksikin aivan muuksi: dinosaurukset kehittyivät linnuiksi – vaikka ympäristön muutos ei siihen pakottanutkaan, eikä muutos syntynyt jollain yksinkertaisella geenin ilmentymisen säädöllä, vaan tarvittiin suuri määrä kokonaan uudenlaisia genejä. Ja mitä tulee esimerkiksi merihevosien suojavärin tai jäniksen takakoiven pituuden säädön osuudella hengissä säilymiseen ja suvun jatkoon, niiden merkitys saattaa olla marginaalinen. Esim. Motoo Kimuran mukaan kelpoisuuden periytyvyys saattaa olla niinkin alhainen kuin 0,004 (tästä myös sivuilla 21–22).

## **BIOS 1 / Luku 7: Evoluutio perustuu muunteluun ja luonnonvalintaan**

### **Evoluutio on sopeutumista muuttuviin ympäristöihin (s.73)**

**Mitä evoluutio siis on?** Luvussa kaksi se oli ”lajin sopeutumista muuttuviin ympäristö-oloihin”. Nyt käsitettä on jo laajennettu: se ei enää olekaan pelkkää suojaväriä tms., vaan kokonaan uusien lajien syntyä:

”Kaikki maapallolla tavattavat miljoonat eliölajit, samoin kuin kaikki jo sukupuuttoon kuolleet lajit, ovat evoluution tulosta. **Evoluutiolla** tarkoitetaan lajinkehitystä, jossa eliölajit muuttuvat ja niistä voi kehittyä uusia lajeja. – Evoluutio on saanut aikaan maapallomme nykyisen biologisen monipuolisuuden, ja evoluutio jatkuu edelleen” (s.73).

Entä mitä lajilla tarkoitetaan?

”Saman **lajin** yksilöt pystyvät lisääntymään keskenään ja saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Lajin yksilöt eroavat kuitenkin geeneiltään toisistaan. Tätä erilaisuutta kutsutaan lajin sisäiseksi **muunteluksi**. – Ilman muuntelua laji ei pystyisi sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Muuttuneissa olosuhteissa juuri niihin olosuhteisiin ominaisuuksiltaan parhaiten sopivat yksilöt menestyvät. Näin lajissa tapahtuu jatkuvaa muutosta ympäristön olosuhteiden muuttuessa” (s.74).

Kirja kuitenkin myöntää, että:

”Lajin määritelmä ei ole yksiselitteinen. Usein sukulaislajien erottaminen toisistaan on hankalaa. Geenitutkimuksen kehittyessä onkin havaittu, että eri lajien väliset risteymät ovat luonnossa melko yleisiä. Lähilajeihin kuuluvat yksilöt voivat pariutua keskenään ja tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä”.

Tekstin ohessa, sivulla 74 on kuva sini- ja jouhisorsan risteymästä. Itse näin vuonna 2012 Seinäjoella eräässä puistossa variksen ja harakan risteymän/hybridin: Siinä vaikutti olevan enemmän varista kuin harakkaa, joten munan muninut osapuoli oli todennäköisesti varis (munassa on enemmän informaatiota kuin siittiössä). (Valitettavasti en tuolloin omistanut kännykkäkameraa.)

Se, mitä evoluutiolla tarkoitetaan, riippuu siis siitä, mitä lajilla tarkoitetaan? Mutta koska lajin määritelmä ei ole yksiselitteinen, ei myöskään evoluution määritelmä ole yksiselitteinen. Lajimääritelmästä enemmän tuonnempana, mutta nyt pari sanaa lajikäsitteestä:

Aikaisemmin biologit ajattelivat, että lähilajien risteytymisiä tapahtuu harvoin ja lähinnä vain eläintarhoissa (esim. leijona ja tiikeri), ja että näin syntyneet hybridilajit ovat vähemmän kelpoisia. Kuitenkin, jo vuonna 1759 eli sata vuotta ennen Darwinin *Lajien syntyä* Carl Linnaeus esitti kirjassaan *Generatio Ambigena*, että alkuperäiset, luodut lajityypit

(kantalajit)<sup>11</sup> ovat sittemmin erilaistuneet nykyisiksi lajeiksi heimoittain siten, että kukin alkuperäinen luotu kantalaji olisi ollut aina yhden heimon perustaja. Linnaeus risteytti eri kasvilajeja ja arveli, että moni nykyilaji on saattanut syntyä hybridisaatiosta alkuperäisen kantalajin alkaessa ”hajota” suvuiksi ja lajeiksi. Englantilainen kasvitieteilijä ja pappi, Darwinin aikalainen William Herbert tutki *Amaryllidaceae*-heimon kasveja ja esitti, että lajeilla jotka risteytyvät (riippumatta siitä, ovatko jälkeläiset lisääntymiskykyisiä tai eivät), on ollut yhteinen kantamuoto. Vaikka Herbert tutki lähinnä kasveja, hän oli sitä mieltä, että esimerkiksi ketuilla ja koirilla on täytynyt olla yhteinen kantamuoto, ”alkukoira”.

Elizabeth Pennisi kirjoitti vuonna 2016 *Science*-tiedelehteen artikkelin<sup>12</sup>, jolla oli provokatiivinen otsikko: ”Shaking up the Tree of Life” (Elämän puuta ravistelemassa) todeten mm.: ”Aikaisemmin lajien ajateltiin pitävän kutinsa (*keep to themselves*). Mutta nyt hybridejä putkahtelee esiin joka paikasta haastaen evoluutioteorian.”

Miksi hybridit haastavat Darwinin opin ja hänen ”elämänpuunsa”? Kahdesta syystä. 1) Siksi, että Darwinin puu haarautuu rungosta (joka kuvaa kaikkien eliöiden yhteistä, kuviteltua kantamuotoa) ensin paksuiksi haaroiksi, nämä sitten ohuemmiksi ja lopulta ”terminaaliseksi oksiksi”, jotka edustavat nykyisiä, usein varsin pitkälle erikoistuneita lajeja. Mutta hybridit saavat aikaan sen, että evoluutioaikataulun mukaan jo miljoonia vuosia sitten toisistaan erilleen kasvaneet ja omille teilleen kehittyneet oksat kasvavatkin uudestaan yhteen vaikka teorian mukaan niin ei pitäisi tapahtua. 2) Teoriaan perustuva ennustus on ollut, että uusien lajien synty on hidas prosessi, nopeimmillaankin ehkä satoja tuhansia vuosia (ihmisen tapauksessa n. 6–7 miljoonaa vuotta). (”Uuden lajin synty kestää yleensä kauan ja on pitkän kehityksen tulosta”, toteaa kirjamme sivulla 87.) Mutta nyt on havaittu, että uudet lajit voivatkin syntyä nopeasti, jopa muutamien vuosien kuluessa (ks. esim. Darwinin sirkuista sivulta 59).

Mitä evoluution evoluutioon ja sen moniin määritelmiin tulee, siteeraan hieman vanhempaa, vuoden 2005 oppikirjaa (*Elämä*, WSOY, s.26), joka määritteli evoluution seuraavaan tapaan:

”**Evoluutio** tarkoittaa populaatioiden ja lajien perinnöllistä muuttumista... Yksilö, jolla on jokin mutaation aiheuttama uusi hyödyllinen ominaisuus, saattaa saada **valintaedun** lajitovereihinsa verrattuna... Valinta siis suosii geenejä, jotka parantavat yksilön **kelpoisuutta** eli **fitnessiä** populaation muihin yksilöihin verrattuna... Evoluutiota nimitetään myös lajinkehitykseksi. Evoluutio ei kuitenkaan ole välttämättä kehittymistä parempaan eli edistystä vaan muuttumista” (lihavointi alkuperäinen, alleviivaus allekirjoittaneen).

11 Tämä ajatus lienee peräisin luomiskertomuksesta, jossa alkukielessä, hepreassa on sana *min*, joka on laaja käsite ja tarkoittaa tavallisesti jotain tietyn tyyppistä eliöryhmää kuten siivekkäitä, märehäijöitä, kissaeläimiä jne. ja se on käännetty englanniksi sanalla *kind* tai *likeness*, ei *species* eli laji kuten suomenkielessä. Hypoteesin mukaan kantajien edustajilla oli laaja perimä, joka salli erikoistumisen erilaisiin uusiin ympäristöoloihin. Tämä ei ole ainakaan ristiriidassa sen havainnon mukaan, että esimerkiksi kaikilla karhuilla vaikuttaa genomikartoitusten mukaan olleen yhteinen kantamuoto, josta mm. jääkarhut polveutuvat. Jääkarhut ovat kuitenkin menettäneet osan geneettisestä informaatiostaan eivätkä voi enää muuntua takaisin maakarhuiksi, jos napajäätiköt sulavat. Darwinin aikana oli kuitenkin luonnonfilosofeja, jotka mukamas luomiskertomukseen perustuen väittivät, että lajit on luotu muuttumattomiksi ja kukin vain johonkin tiettyyn ympäristöön. Darwin osoitti, että he olivat väärässä ja hyvä niin.

12 *Science* 354(6314):817–821.



Eli muuttuminen (suuntaan mihin tahansa?) = evoluutio? – Kyllä: Mutta Darwinin aikoihin evoluutio oli vielä yksisuuntaista kehittymistä kohti täydellisyyttä:

”Ja siksi voimme jokseenkin varmasti pitää tulevaisuutta pitkiksi ajoiksi turvattuna. Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään täydellisyyttä kohti” (Darwin: *Lajien synty*, Karisto, 1988, s. 666).

*The Oxford English Dictionary*'n mukaan evoluutio on ”kehitysprosessi alkeisvaiheesta kypsään tai valmiiseen tilaan”.

Mutta nykyään myös takaperoinen kehitys eli taantumisen ja sukupuuttoon kuoleminen katsotaan evoluution piiriin kuuluviksi ilmiöiksi, sen ”loppuhuipentumaksi”: esim. ihmisen evoluutio jatkuu sukupuuttoon saakka totesi muuan ”asiantuntija” jokin aika sitten sanomalehti *Keskisuomalaisen* ”tiede”palstalla.

Koska evoluution määritelmä on kehittynyt näin laveaksi ja joustavaksi, jokaiseen tilanteeseen sopivaksi, olisi kai tyhmää ilmoittaa, että ei usko evoluutioon lainkaan? Niinpä minäkin uskon evoluutioon: 1) mikrotasoiseen evoluutioon, joka on tosiasiaa vain muuntelua, sopeutumista ja erikoistumista, jolla on rajansa. 2) takaperoiseen evoluutioon, eliöiden taantumiseen ja sukupuuttoon (oma lajimme mukaan lukien).

BIOS 1:n mukaan lajit siis muuttuvat *jatkuvasti* (jos ympäristöolosuhteet muuttuvat):

} ”Näin lajissa tapahtuu jatkuvaa muutosta ympäristön olosuhteiden muuttuessa” (s.74). }

Tämä ei taida olla aivan totta: Maailma on ”täynnä” ns. eläviä fossiileja, sellaisia, jotka eivät evoluution aika-asteikon mukaan ole muuttuneet mihinkään kymmeneen tai satoihin miljooniin vuosiin, vaikka ympäristöt ovat muuttuneet. Hyvin monilla fossiililla lajeilla on elossa olevia, kaltaisiaan lajitovereita (tästä enemmän tuonnempana).

## ***Geenimutaatiot ovat evoluutiolle tärkeitä (s.75)***

} ”Geenimutaatiot ovat evoluutiolle välttämättömiä, koska niiden seurauksena populaatioon muodostuu uusia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat lajin sopeutumiseen. – Mutaatiot ovat aina sattumanvaraisia. Pieni osa mutaatioista on sellaisia, että niistä on yksilölle hyötyä. Osalla mutaatioista taas ei ole mitään vaikutusta yksilön ominaisuuksiin. Monet muuttuneista geeneistä karsiutuvat nopeasti pois joko sattumalta, tai siksi, että niiden tuottamat uudet ominaisuudet ovat yksilölle haitallisia. Useimmat mutaatiot tapahtuvat muissa kuin sukusoluissa, joten ne eivät periydy ja katoavat yksilön kuollessa ” (s.75). }

## Vastaväite: geenimutaatiot ovat parhaimmillaankin lähes merkityksettömiä

Sukusoluissa tapahtuvat mutaatiot ovat kaikkein vaarallisimpia, sillä ne aiheuttavat keskenmenoja, epämuodostumia ja perinnöllisiä sairauksia.<sup>13</sup> Muissa kuin sukusoluissa tapahtuvat mutaatiot johtavat joko syöpään tai solujen vanhenemiseen ja niistä johtuviin rappeuttaviin sairauksiin, tai molempiin.

Alla siteeraus tuoreesta lääketieteellisestä artikkelista, joka koskee *mitokondrio-DNA* -mutaatioita ja ihomme vanhenemista:<sup>14</sup>

”Mitokondriaaliseen DNA:han syntyy toistuvasti luontaisen oksidatiivisen stressin aiheuttamia vaurioita (=mutaatioita), erityisesti tiettyjä ja tietyn pituisia deletioita (=poistumia), joita kutsutaan yleisdeletioiksi ja ne ovat kymmenen kertaa yleisempiä auringovalolle altistuvalla iholla kuin valolta suojassa olevalla. Nämä deletiot puolestaan johtavat yhä lisääntyvään oksidatiiviseen stressiin ja vapaiden happiradikaalien lisääntymiseen, jotka heikentävät solun kykyä tuottaa energiaa. Valolle altistuneen ihon mtDNA-vaurioiden määrä ei korreloi niinkään kalenteri-ikään vaan valovaurion asteeseen. Ultravioletivalo kiihdyttää myös tuma-DNA:n telomeerien<sup>[15]</sup> lyhentymistä ja johtaa DNA-vaurioproteiinien, kuten kasvainten estoproteiini p53:n aktivaatioon. Tämä taas johtaa joko ohjelmoituun solukuolemaan tai siihen, että solu siirtyy ns. vanhuustilaan, jolloin se ei pysty enää jakautumaan”

p53 on ns. kasvainesto-proteiini, joka pysäyttää solun jakaantumisen, jos DNA-kopiossa havaitaan virhe (=mutaatio). Jos virhettä ei pystytä korjaamaan, p53 aktivoi ns. apoptoosin eli ohjelmoidun solukuoleman. Mutta jos itse p53-geeniin tulee mutaatio, syntyy toimimaton tai huonosti toimiva p53-proteiini. Jos, ja kun tällaiseen soluun tulee muita mutaatioita, se saa jakaantua normaaliin tapaan ja tuottaa solumutantteja, joista osa voi kehittyä syöpäsoluiksi. Esimerkiksi tupakansavu saattaa vaurioittaa p53-geeniä ja johtaa keuhkosyöpään.

Huomaa, että rappeuttavien sairauksien lisäksi myös herkistyminen tartuntataudeille, kuten tuberkuloosille ja meningokokin aiheuttamalle aivokalvon tulehdukselle, johtuvat mutaatioista. Puhumattakaan syövästä, jotka *kaikki* johtuvat mutaatioista. Jos mutaatiot siis aiheuttavat kudossoluissa tällaista tuhoa, miten ne voisivat aiheuttaa päinvastaisia muutoksia sukusoluissa? Siksi solut on ohjelmoitu korjaamaan syntyneet mutaatiot, että pysyisimme terveinä mahdollisimman pitkään, ja että DNA geneineen välittyisi mahdollisimman alkuperäisenä uudelle sukupolvelle. Jos mutaatiot ovat aiheuttaneet elämän monimuotoisuutta synnyttänyttä evoluutiota, miksi solut on ohjelmoitu eliminoimaan nuo mutaatiot?

13 Toukokuuhun 2018 mennessä Cardiffissa sijaitseva Human Gene Mutation Database oli rekisteröinyt jo yli 220 000 eri tyyppistä perinnöllisiä sairauksia aiheuttavaa *tumaDNA*-mutaatiota ([www.hgmd.cf.ac.uk](http://www.hgmd.cf.ac.uk)).

14 Tobin D.J., Introduction to skin aging, *Journal of Tissue Viability* 26(1):37-46, 2017, doi:10.1016/j.jtv.2016.03.002.

15 Telomeerit ovat aiotumaisten kromosomien päissä sijaitsevia, niitä suojaavia DNA:n toistojaksoja, jotka lyhentyvät jokaisen solun jakaantumisen aikana. Vanhenevat solut eivät pysty enää korvaamaan menetettyä telomeeripätkää. Kun telomeeri on kulunut loppuun, kromosomi alkaa hajota.

”Mikäli mutaatio tapahtuu sukusoluissa, uusi alleeli voi siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Joskus tällainen mutaatio voi aiheuttaa ominaisuuden, joka parantaa yksilön sopeutumista ympäristöönsä. Nämä yksilöt lisääntyvät yleensä muita paremmin, ja uudenlainen alleeli alkaa lisääntyä populaatiossa” (s. 76).

Genetiikan historia (ja lääketiede) tuntevat vain muutamia harvoja ns. ”positiivisia” mutaatioita, jotka *tietyissä olosuhteissa* saattavat aiheuttaa ominaisuuden, joka parantaa yksilön sopeutumista ympäristöönsä. Nämä vähäpätöiset geenivirheet ovat useimmiten jollain tavalla haitallisia, mutta saattavat *sivuvaikutuksena* aiheuttaa sopeutumisen tiettyyn ympäristöön / erikoisolosuhteisiin. Esimerkiksi sirppisoluanemia heterotsygoottisena (vain toiselta vanhemmalta perittynä) suojaa afrikkalaisia malarialta (mutta on silti sairaus). Sama koskee bakteerien antibioottiresistenssiä, hyttysten DDT:n vastustuskykyä tai rottien varfariini- eli rotanmyrkkyyresistenssiä. Mutaatiosta huolimatta afrikkalaiset ovat pysyneet tavallisina afrikkalaisina, bakteerit bakteereina, hyttysset hyttysinä ja rotat rottina. Genetiikka ei siis tunne mutaatioita, jotka olisivat *lisänneet* evoluution tarvitsemaa *geneettistä informaatiota*, informaatiota, joka olisi pystynyt synnyttämään *uusia, kehittyneempiä* eliöitä.

Syksyllä 2013 Keski-Suomessa nousi myrsky vesilasissa, kun muuan Viitasaaren lukion biologian opettaja oli jättänyt evoluutio-osion itseopiskelun varaan (jonka lukioasetus sallii). Tästä syntyi keskustelua sanomalehti *Keskisuomalaisessa*. Kirjoitin vastineen ja pyysin esimerkkejä positiivisista, evoluutiota aiheuttavista mutaatioista. Muuan kemian opiskelija esitti bakteerien antibioottiresistenssiä, mikä ei tietenkään kelpaa. Jyväskylän yliopiston evoluutiogenetiikan professori Anneli Hoikkala esitteli aikuisten laktoositoleranssin! Mutta: aikuisten laktoositoleranssi on sairaus, kuten geenivirheen löytänyt, edesmennyt geneetikkomme Leena Palotie totesi: ”Minusta on ironista, että niin kutsuttu sairaus onkin normaali tila”.<sup>16</sup> Kysyin Hoikkalalta, että eikö hänellä ole tiedossa mitään ”parempaa mutaatiota”. Hän vastasi: ”Koska suhtaudutte evoluutioon niin kyynisesti, en halua keskustella kanssanne.” Tästä on nyt aikaa yli neljä vuotta, enkä ole saanut vielä mitään tietoa ”paremmista mutaatioista”.

Evoluution tarvitsemaa uutta geneettistä informaatiota ei voi syntyä myöskään siten, että jokin DNA:n osa sattumalta kahdentuu (ns. geeniduplikaatio) ja että kahdentuneeseen osaan tulee mutaatioita, jotka lopulta synnyttävät uuden, toiminnallisen geenin. Tästä enemmän tietoa geneetikko John Sanfordin kirjassa *Eliömaailma rappeutuu*.<sup>17</sup>

16 Randerson J., Too old to take it – Now we know why it’s usually only babies who can stomach milk, *New Scientist* 2002, 173;2326:13. [On ikävä tosiasia, että moni suomalainen on lihottanut itsensä maidolla sairaalakuntoon – tai maito (usein rasvaton eli ”kaloritön”) on ollut merkittävä osatekijä. Ei ole harvinaista, että aikuinen suomalainen juo kaksi – jopa kolme litraa maitoa päivässä. Tämä perustuu omaan, vuosikymmenien kokemukseen ja tuhansien potilaiden haastatteluihin. Itse join viimeiset maitoni syyskuussa 1969. Ranskassa asumiseni vuosina en nähnyt kenenkään koskaan juovan maitoa.]

17 Sanford, J.C., *Eliömaailma rappeutuu*, liite 4: Voivatko geeniduplikaatio ja polyploidia kasvattaa geneettistä informaatiota, Datakirjat 2015, toinen tarkistettu painos 2018. [luominen.fi/emr](http://luominen.fi/emr).

## Mutaatiokokeet tuottivat pahimillaan kuolemaa ja parhaimillaankin pelkkiä kuriositeetteja

Aina siitä lähtien (1900-luvun alku), kun mutaatiot ”keksittiin”, niitä ruvettiin tuottamaan keinotekoisesti (säteily, kemikaalit, kylmä/kuumakäsittely) siinä toivossa, että saataisiin aikaan evoluutiota, ”kehittyneempiä” eliöitä. Banaanikärpäsiä kiusattiin ainakin sata vuotta, kasveja ainakin 40 vuotta (ns. mutaatiojalostus), matoja, hiivaa ja bakteereja vuosikymmenet. Tulos? Kuolleita alkioita, epämuodostuneita, rampoja yksilöitä – parhaimmillaankin pelkkiä kuriositeetteja, kuten sahalaitaisia, kirjavalehtisiä koristekasveja. – Sekä miljoonia hukkaan heitettyjä dollareita ja tuhansia miestyövuosia.

## Solubiologian keskeinen dogma eli DNA ”elämän piirustuksina” on kuollut

28. helmikuuta vuonna 1953 James Watsonin ja Francis Crickin kerrotaan menneen vallankumouksellisen työpäivänsä kunniaksi paikalliseen publiin. Tarinan mukaan Crick julisti muille läsnäoleville: ”Me olemme löytäneet elämän salaisuuden!” Tällä hän tarkoitti sitä, että he olivat keksineet DNA:n kemiallisen rakenteen.

Kaksi vuotta myöhemmin romanialainen biologi George Palade löysi ribosomit ja vuosi siitä Volkin ja Astrachan löysivät DNA:n kaltaisen molekyylin, RNA:n, joka vie viestin tuman DNA:sta ribosomeille, joissa proteiinisynteesi tapahtuu. Vuonna 1958 Crick muotoili solubiologian keskeisen dogman (*central dogma*): Geneettinen informaatio kulkee aina tumasta soluun, ei koskaan päinvastoin: DNA tekee RNA:ta ja RNA tekee proteiineja.

Tämä ei ole aivan totta, mutta sitä ei tietenkään tiedetty vuonna -58. Niinpä siitä (*central dogma*) johdettiin, tai se alettiin ymmärtää vielä laajemmin, siten että DNA sisältää ”geneettisen ohjelman eliön rakentamiseksi” – DNA on yhtä kuin ”elämän piirustukset” (*blueprint of life*). Vielä vuonna 1987 Watsonin toimittama *Molecular Biology of the Gene* kertoi, että ”me tiedämme, että ohjeet siitä, miten muna kehittyy aikuiseksi on kirjoitettu DNA-molekyylin emästen lineaariseen järjestykseen”. Ja vielä niinkin myöhään kuin v. 2006 Francis Collins kertoi kirjassaan *The Language of God* (Jumalan kieli): ”DNA on hämmästyttävä kirjoitus, joka kantaa kaikki ohjeet ihmisen rakentamiseksi!” – DNA tekee RNA:ta, RNA tekee proteiineja ja proteiinit tekevät meidät!

Näin ei kuitenkaan ole. Ja kun ei ole, BIOS 1:n väite ”geenimutaatiot ovat evoluutiolle välttämättömiä”, ei pidä paikkaansa; mutaatiot eivät ole ”evoluution raaka-aineita”.

Miksi DNA ei voi sisältää ”elämän piirustuksia”?<sup>18</sup> Sen ymmärtämiseen ei tarvita suurta oppineisuutta: Ihminen (tai mikä eliö tahansa) ei ole yhtä kuin kokoelma geenituotteita eli proteiineja (tai RNA:ta). Mitä ovat sellaisen talon piirustukset, joissa on luettelo pelkistä rakennukseen tarvittavista hirsistä, laudoista ja nauloista? Jos kyseessä on puutalo, hirret ja laudat ovat *välttämättömiä*, mutta eivät *riittäviä*. Ja kaiken lisäksi, DNA:ssa ei ole suoria ohjeita läheskään kaikkien niiden proteiinien valmistamiseksi, joita solut tarvitsevat: Geeni (DNA) ei tee RNA:ta ja RNA ei tee proteiineja, on yhtä totta kuin ym. solubiologian keskeinen dogma.

18 Missä elämän piirustukset sitten ovat? Ks. s. 56.

Aitotumaisten eliöiden geenit koostuvat introneista ja eksoneista: Kun DNA on transkriptoitu RNA:ksi, intronit leikataan pois, jonka jälkeen eksonit (tai vain osa niistä) liimataan yhteen (RNA:n silmukointi) lähetti-RNA:ksi. Tämän lisäksi osa eksoneista voidaan tuplata. Ja vielä: Puolivalmista lähetti-RNA:ta voidaan muokata vaihtamalla joitain nukleotidikirjaimia (emäksiä) tai lisäämällä niitä (RNA:n editointi). Näiden toimenpiteiden jälkeen valmis lähetti-RNA ei välttämättä muistuta kovinkaan paljoa alkuperäistä RNA-kopiota. (Eikä DNA:n emäsjärjestys siis läheskään aina muutu suoraan proteiinin aminohappojärjestykseksi.) Tästä johtuen samasta geenistä voidaan muokata jopa 18 000 erilaista lähetti-RNA:ta, kuten esimerkiksi banaanikärpäsen tapauksessa. Eikä RNA:n muokkausohjeita ole koodattu DNA:n emäsjärjestykseen (eli mutaatiot eivät voi siihen vaikuttaa).

Entä määrääkö lopulliseen emäsjärjestykseensä muokattu RNA proteiinin rakenteen? Ei läheskään aina: Proteiinin aminohappojärjestys määrää tavallisesti sen sekundaarirakenteen eli alfa-kierteet ja beeta-levyt ja joskus jopa tertiaarirakenteen. Tertiaarirakenne on proteiinin toiminnan kannalta yhtä tärkeä kuin Abloy-avaimen täsmälliseen leveyteen ja kulmaan jyrskityt lovet. Jos yksikin on väärin, lukko ei aukea. Usein ribosomilla tuotettu polypeptidiketju (”esi-proteiini”) tarvitseekin monimutkaisia avustajamolekyylejä eli *kaperoneja* (jotka ovat itsekin proteiineja) laskostuakseen lopulliseen muotoonsa. Mutta merkillistä on, että täsmälleen samanlaisille polypeptidiketjuille voidaan luoda hyvin erilaisia muotoja – ja päinvastoin: erilaiset ketjut voidaan laskostaa samaan muotoon.

Laskostumisen lisäksi, monet proteiinit tarvitsevat jatkomuokkausta, joista tavallisin lienee ns. glykosylaatio eli ”sokerointi”, jolloin muodostuu ns. glykoproteiineja. Hiilihydraatit, kuten sokerit, voivat muodostaa hyvin monimutkaisia, haaroittuvia rakenteita ja ne sisältävät paljon enemmän informaatiota kuin DNA. Eikä DNA:n emäsjärjestyksessä ole ohjeita proteiinien glykosylaatiosta. Geneettisen koodin, DNA-koodin lisäksi onkin alettu puhua myös sokerikoodista. Sokerikoodilla vaikuttaa olevan keskeinen rooli alkionkehityksessä, sillä solukalvojen glykoproteiinit määräävät mm. solujen jakaantumisenopeuksia, solujen välistä viestien vaihtoa, solujen orientaatiota, liikkumista sekä niiden tarttumista toisiinsa. Periytyvää muutosta eli evoluutiota voi tapahtua vain ituradalla ja alkionkehityksessä, jossa sokerikoodilla saattaa olla paljon tärkeämpi rooli kuin ”yksinkertaisella” DNA-koodilla (mahdollisine mutaatioineen). DNA- ja sokerikoodin lisäksi solussa on monia muitakin koodeja, kuten epigeneettinen koodi, tubuliinikoodi ja bioelektrinen koodi.

Toistan kirjan argumentin:

*”Mikäli mutaatio tapahtuu sukusoluissa, uusi alleeli voi siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Joskus tällainen mutaatio voi aiheuttaa ominaisuuden, joka parantaa yksilön sopeutumista ympäristöönsä. Nämä yksilöt lisääntyvät yleensä muita paremmin, ja uudenlainen alleeli alkaa lisääntyä populaatiossa.”*

Tämä siis pätee vain suppeasti, niin suppeasti, että ei voida puhua ainakaan perinteisestä evoluutiosta, sellaisesta, joka synnyttää pikkuhiljaa (pitkien aikojen kuluessa) täysin uudenlaisia eliöitä, esim. kalojen kehitystä maaselkäränkaisiksi. Ja kaiken lisäksi: Kirjan väite ”Nämä yksilöt lisääntyvät yleensä muita paremmin, ja uudenlainen alleeli alkaa lisääntyä populaatiossa”, on hyvin kyseenalainen: Yksinäinen mutaatio suuressa maailmassa on lähes aina tuomittu katoamaan. Ja vaikka se jossain suhteessa parantaisikin yksilön kelpoisuutta, kelpoisuuden periytyvyys, kuten jo totesin, saattaa olla niinkin pieni kuin 0,004. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ominaisuuksiltaan hieman parannellun yksilön mahdollisuudet saada enemmän lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä ei riipu paremmuudesta, vaan olosuhteista, hyvästä ja huonosta tuurista eli ns. biologisesta kohinasta. Tästä enemmän esim. ym. kirjassa *Eliömaailma rappeutuu* (luku 6, kohinan lähempi tarkastelu).

## ***Ympäristö aiheuttaa muuntelua (s.77)***

*”Ympäristötekijät, kuten ravinto, vaikuttavat myös geenien toimintaan ja geenien toiminnan säätelyyn. Tämä ympäristön ja perimän vuorovaikutus voi periytyä joskus jälkeläisillekin. Esimerkiksi eräillä sammakkoeläimillä on havaittu, että nuijapäiden saama ravinto vaikuttaa niiden kehitykseen. Ravinnosta riippuu kehittykö niistä aikuisena sekaravinnonsyöjiä vai kasvisyöjiä. Ravinnon käyttötapa periytyy myös niiden jälkeläisille. –Näin myös ympäristön aiheuttama muuntelu voi periytyä” (s.77).*

Näin on: ympäristö voi laukaista sopeutumisreaktioita, eliöön jo etukäteen ohjelmoituja epigeneettisiä mekanismeja (geenien ilmentymiseen vaikuttavia kromosomien rakenteellisia ja kemiallisia muutoksia kuten metylaatiota ilman DNA:n emäsjärjestyksen muutoksia eli mutaatioita). Nämä voivat joskus periytyä, mutta siinä kyse on pelkästä sopeutumismuuntelusta, ei varsinaisesta evoluutiosta, uusien lajityyppien synnystä. Ympäristö, kuten kylmyys, voi suosia pitkäkarvaisia susia, mutta ympäristö ei luo pitkäkarvaisuuden aiheuttavia geenejä.

## Luonnonvalinta muuttaa populaation alleelien lukusuhteita (s.78)


”Muuntelun ansiosta samaan populaatioon kuuluvat yksilöt poikkeavat toisistaan. Populaation sisällä esiintyy luonnossa **kilpailua**, koska eliöiden lisääntyminen on yleensä nopeaa. – Kilpailussa menestyvät parhaiten ne yksilöt, joilla on juuri senhetkiseen ympäristöön ja olosuhteisiin parhaiten sopiva ominaisuuksien yhdistelmä. – Tätä evoluutioteokijää kutsutaan **luonnonvalinnaksi**. – Parhaiten sopeutuvat yksilöt kykenevät tuottamaan enemmän lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä kuin muut ja niiden alleelit alkavat yleistyä populaatiossa. Luonnonvalinta suosii niitä alleeleja, jotka lisäävät yksilöiden **kelpoisuutta eli fitnessiä**. Kelpoisimmilla yksilöillä on siis paras kyky säilyä elossa lisääntymisikään asti ja tuottaa eniten lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä” (s.78).

Tämä argumentti kumottiin jo yllä: luonnonvalinta toki toimii, mutta sen ”voima” on kovin heikko. (Vaikka se voi muuttaakin populaation alleelisuhteita, evoluutio vaatii paljon muutakin kuin pelkkiä uusia suhteita.) Kimura siis arvioi, että jopa 99,6 % kelpoisuudesta eli fitnessistä saattaa mennä hukkaan. Ja kokonaan toinen ongelma on itse *kelpoisimman synty*: Luonnonvalinta voi kyllä suosia, jopa säilyttää kelpoisimman, mutta ei voi aikaansaada sen syntyä. Tämän tunnusti mm. evoluutiobiologi Andreas Wagner vuonna 2015 suomennetussa kirjassaan *Kelpoisimman synty – Evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu* (Terra Cognita). Wagnerin kirja ei kuitenkaan tarjoa kelpoisimman syntyyn mitään biologisesti tai geneettisesti uskottavaa ratkaisua. Tämän kirjan laaja analyysi löytyy Luominen ry:n kotisivuilta.<sup>19,20</sup>

Muuntelusta BIOS 1 mainitsee klassisen teollisuusmelanisman ja myrkkä kestävät ”superrotat”. Myrkkä tai ei, rotat ovat pysyneet rottina. Ja koivumittarit ovat pysyneet koivumittareina joko ilman ilmansaasteita tai niiden kanssa.

Kirja-arvio: *Kelpoisimman synty*

# Evoluution suurin arvoitus jäi ratkaisematta



kanssi: Terra Cognita

**Voit lukea analyysin Wagnerin kirjasta ”Kelpoisimman synty” Luominen-lehden numerosta 27 tai netistä [luominen.fi/wagner](http://luominen.fi/wagner).**

19 Tuuliranta, M., Evoluution suurin arvoitus jäi ratkaisematta - arvio kirjasta Kelpoisimman synty, *Luominen* 27:72.

20 Tuuliranta, M., Kelpoisimman synty – evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu: Kirjan analyysi + suppea ”tietoisku” modernin synteesin ongelmista, [luominen.fi/wagner](http://luominen.fi/wagner) (PDF). Kustantaja ja kirjaa ylistäneet vapaa-ajattelijat eivät ole analyysiä kommentoineet.

## **Luku 8: Populaatioista voi vähitellen kehittyä uusia lajeja**

### **Mikroevoluutiossa populaatioiden geenikoostumus muuttuu (s.86)**

”Ilmiötä, jossa saman lajin populaatiot muuttuvat vähitellen geenikoostumukseltaan erilaisiksi, kutsutaan **mikroevoluutioksi**” (s.86).

Populaatioiden geenikoostumusten eli alleelisuhteiden vaihteluita ja niiden aikaansaamia sopeutumisia on tapahtunut ilmeisesti aina, ja sitä on tavattu sanoa muunteluksi: maailma muuttuu. Mutta nyt kun evoluutiokäsitettä on haluttu laajentaa, myös muuntelulle on annettu uusi nimi: *mikroevoluutio*. Miksi? Siksi, että nimen muutoksen myötä siitä voidaan johtaa evoluutioteoreettinen ”kaava”: mikroevoluutio + paljon aikaa = makroevoluutio. (Vrt. Veikkaus Oy:n 1960-luvun mainos: 1 X 2, pennit miljooniksi!) Kaava voi päteä veikkauksessa, mutta ei reaaliologiassa, jossa *paljon aikaa on elämän vihollinen*: Mitä enemmän aikaa, sitä enemmän haitallisia geenimutaatioita ja rappeutumista ja sitä lähempänä sukupuuttoa ollaan (ks. *Eliömaailma rappeutuu*).

### **Makroevoluutiossa syntyy uusia lajeja (s.87)**

”Kun populaatiot ovat kehittyneet niin erilaisiksi, että eri populaatioiden yksilöt eivät voi saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, on syntynyt uusi laji. Uusien lajien syntyyn johtavaa evoluutiota kutsutaan **makroevoluutioksi**. Se on seurausta populaatioiden mikroevoluutiosta. Uuden lajin synty kestää yleensä kauan ja on pitkän kehityksen tulosta” (s.87).

”Erillään olevien populaatioiden yksilöille kehittyä erilaisia elintoimintoihin, rakenteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä eroja. Kaikkia niitä tekijöitä, jotka estävät populaatioiden tai lajien yksilöitä tuottamasta lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, kutsutaan **lisääntymisesteiksi**. Ne estävät yksilöitä risteytymästä keskenään, vaikka maantieteellinen este poistuisi. Tällöin yhdestä lajista on kehittynyt kaksi eri lajia. Esimerkiksi norppien erilaistumisen oletetaan etenevän niin pitkälle, että ne kehittyvät omiksi lajeikseen joskus tulevaisuudessa. On arvioitu, että isoilla hitaasti lisääntyvillä nisäkäslajeilla lajiutumisen kestää 1–2 miljoonaa vuotta” (s.90).

Jääkauden olosuhteet jakoivat erään pohjoisen tikkapopulaation kahteen joukkoon. Kun jääkausi ja sen aiheuttama isolaatio päättyi, osapopulaatiot olivat muuntuneet sen verran, että ne eivät ilmeisesti kyenneet enää lisääntymään keskenään (luonnollisissa oloissa). Näin ”alkutikasta” oli syntynyt vihertikka ja harmaapäätikka. Biologisen lajimääritelmän mukaan ne ovat siis eri lajeja. Lajimääritelmiä on kuitenkin ainakin 15–16, ja esimerkiksi viher- ja harmaapäätikköjen tai saimaannorppien tapauksissa, ei ole oikeutettua puhua makroevoluutiosta eli *kokonaan uudenlaisten lajityyppien synnystä*. Biologisen lajikäsitteen ohella onkin alettu puhua *perusryhmästä* (tai lajityypistä): Kaikki yksilöt, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään. Samaan perusryhmään kuuluvat mm. kalkkuna, kukko, fasaani ja kuningasfasaani. Myös vihertikka ja harmaapäätikka kuuluvat samaan perusryhmään ja se, että niiden risteytymiä ei ole havaittu, ei todista, että niitä ei ole.



## *Uusi kasvilaji voi syntyä nopeastikin (s.90)*

*”Uuden lajin syntyminen on yleensä hidas ja monivaiheinen tapahtuma. Joskus uusi kasvilaji voi kuitenkin syntyä nopeasti. . . Kromosomiluvun moninkertaistuminen, olivatpa kromosomit sitten peräisin samasta lajista tai eri lajeista, on kasveilla tärkeä uuden lajin syntyyn johtava tekijä. Arviolta 25–50 prosentilla maapallon kukkakasveista on moninkertaistunut kromosomisto” (s.90).*

Näin on. Kyseisten kasvien geneettinen informaatio ei silti ole lisääntynyt: Kahdessa BIOS 1 -kirjassa (tai tuplaantuneessa genomissa) ei ole sen enempää informaatiota kuin yhdessäkään eikä lauseen toistaminen tuo puheeseen mitään uutta. Siitä syystä tällainen evoluutio jää *heimon* (esim. heinäkasvit, *Graminaea*, n. 6000 lajia) *sisäiseksi muunteluksi*. Siinä mielessä tämä ei ole evoluutiota (jos se määritellään eliömaailman luoneena prosessina: geneettisen informaation laadullisena kasvuna sekä uusien toimintojen ja rakenteiden syntyminenä). Kromosomiluvun moninkertaistuminen (polyploidia) ei synnytä täysin uudentyyppisiä eliöitä – ja sitä paitsi se *nopeuttaa geneettistä rappeutumista*: Kasvi, jonka kromosomisto on tuplaantunut, rappeutuu nopeammin kuin yksinkertaisen kromosomiston omaava. Miksi? Siksi, että kaikista geeneistä on olemassa ”varmuuskopio”. Tuplageenit heikentävät luonnonvalinnan kykyä poistaa ne yksilöt, jotka ovat saaneet haitallisia mutaatioita. Tällöin geneettisestä rappeutumisesta (ja sukupuutosta) tulee entistä varmempaa (ks. *Eliömaailma rappeutuu*, s.157–161).

## *Pullonkaulailmiön seurauksena vain pieni osa populaatiosta jatkaa sukua (s.92)*

*”Tapahtumaa, jossa yksilöiden määrä luonnonkatastrofin tai ihmisen vaikutuksesta kutistuu tilapäisesti muutamaan yksilöön, kutsutaan **pullonkaulailmiöksi**. Myös nykyinen ihmispopulaatio on varhaisessa kehitysvaiheessaan käynyt läpi pullonkaulailmiön. Olikin vähällä, ettei koko ihmispopulaatio kuollut sukupuuttoon jo ennen kuin se lähti levittäytymään Afrikasta” (s.92).*

Näin on (paitsi että en allekirjoita ulos-Afrikasta hypoteesia): Nykyihmiskunta on geneettisesti kovin monotoninen<sup>21</sup> ja geneettinen muuntelu on tuoretta, eräiden tutkimusten mukaan jopa vain 5000 vuotta vanhaa. Ihmiskunta vaikuttaa niin homogeeniseltä, että nykyään ei puhuta enää edes roduista, vaan ihmisryhmistä.

21 Tosin muuan tuore tutkimus kyseenalaistaa tämän (Tomkins, josta lisää sivulla 99).

## Avainsopeutumat mahdollistavat uusien elinympäristöjen valtaamisen (s.95)

*”Sopeutumislevittäytyminen edellyttää yleensä jonkin sellaisen sopeutuman kehittymistä, joka mahdollistaa uuden elinympäristön valtaamisen tai kokonaan uuden elämäntavan harjoittamisen. Tällaisia sopeutumia kutsutaan **avainsopeutumiksi**.*

*Lintujen kehitys on hyvä esimerkki sopeutumislevittäytymisestä, joka mahdollisti ilman valloituksen. Lentämisen teki mahdolliseksi eturaajojen kehittyminen siiviksi sekä höyhenpeite. Höyhenet ovat samaa alkuperää kuin matelijoiden suomet.” (s.95).*

Sekä suomuissa että höyhenissä on keratiini-nimistä proteiinia (aivan kuten sinun kynsisäkin). Se ei silti ole todiste, että sinun kyntesi ja lintujen sulat ovat kehittyneet matelijan suomuista. Lintujen oletetusta kehityksestä alkaen sivulta 70.

Höyhen Wikimedia Commons



Liskon (Lacerta agilis) nahka. Wikimedia / Cruzd

**Höyhenien ja suomujen yhteinen rakennusaine (keratiini) ei todista niiden kehittyneen yhteisestä kantamuodosta. Vaikka ne muistuttaisivat toisiaan huomattavasti (mitä ne eivät tee, kuten kuvasta voi päätellä), niiden samankaltaisuus olisi aivan yhtä hyvä todiste yhtenevästä suunnittelusta – kuten esimerkiksi auton ja polkupyörän renkaiden samankaltaisuus.**

## **BIOS 1 / Luku 9: Elämä syntyi ja kehittyi merissä**

### **Alkumaapallon olosuhteet mahdollistivat elämän synnyn (s.100)**

Tässä luvussa evoluutio laajenee lopulliseen suuruuteensa, itse elämän syntyyn. Tutkitaan tällaisen evoluution uskottavuutta hieman tarkemmin: Mitä elämän synnystä tiedetään/kuvitellaan:

*”Elämän synnyn selvittäminen on biologian haastavimpia tehtäviä. Yksi selvittämiseen liittyvistä ongelmista on, että elämän alkuaajoista ei ole konkreettisia todisteita, kuten fossiileja. On kuitenkin toisenlaisia todisteita, joita löytyy nykyisin elävistä eliöistä. Kaikkien eliöiden solut ovat nimittäin rakenteeltaan ja toiminnaltaan pääpiirteissään samanlaisia, mikä kertoo niiden yhteisestä alkuperästä” (s.100).*

Siis biologian haastavimpia tehtäviä? Lievästi ilmaistu. Jos totta puhutaan, elämän synnyn selvittäminen on biologian kaikkien aikojen ylivoimaisesti haastavin tehtävä. Näin jo siitäkin syystä, että emme tiedä elämästä vielä kovinkaan paljoa: mitä se on? Kuka tietää? Sen verran sentään tiedetään, että se ei olekaan molekyylien onnekasta törmäilyä jossain ”kalvopussissa”. Ja sekin on opittu, että tuota molekyylien törmäilyä ohjaa informaatio eikä sattuma. Yksi määritelmä voisikin olla, että elämä on informaatiota.<sup>22</sup> Mutta mistä se tuli? Kukaan ei tiedä:

**”Informaation alkuperä on ajan ja paikan tuolla puolen, tapahtumahorisontin takana - viimeinen mysteeri, jota ihminen ei voi selvittää”**  
(Noam Chomsky, naturalisti, informaatioteorian pioneereja).

(Samun sivun kuvateksti kertoo, miten jotkut bakteerit ja arkeonit pystyvät elämään syvällä maankuorella kovassa kuumuudessa ja paineessa, tai valtameren pohjalla tai Kuolleen meren erittäin suolaisessa vedessä. Tämä kuulemma kertoo siitä, että alkumaapallon ”rajut olosuhteet” eivät sittenkään olleet elämän synnyn kannalta mahdottomat. – Olivat tai eivät, monet muut ”olosuhteet” olivat. Eikä kukaan tiedä yhtään mitään noista ”alkumaapallon rajuista olosuhteista”, kyseessä on naturalistinen tarina.)

1980-luvulla *Kanava*-lehdessä käytiin ajatusten vaihtoa evoluutiosta. Muuan kirjoittaja päätti hedelmättömäksi osoittautuneen keskustelun seuraavasti: **”Biologialle saattaisi olla eduksi, jos se maailman selittämisen sijasta tyytyisi tutkimaan sitä, miten luonto tänään toimii.”** – Viisas neuvo.

<sup>22</sup> Geneettisessä informaatiossa on tunnistettavissa useita tiedon tasoja kuten tilastotiete, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka ja apobetiikka. Sitä ei tule sekoittaa fyysikaalisessa luonnossa itsestään syntyvään järjestykseen, kuten lumihiihtoleisiin tai suolakiteisiin. Kirjan muste ja paperi ei määrää siihen kirjoitettua informaatiota sen enempää kuin DNA-molekyylin ”kirjaimet” DNA:ssa olevaa informaatiota. On järjenvastaista uskoa monimutkaisen täsmennetyn geneettisen informaation syntyneen sattumalta.

BIOS 1:n mukaan elämän synnystä on kuitenkin olemassa ”toisenlaisia todisteita”: *Kaikkien eliöiden solut ovat nimittäin rakenteeltaan ja toiminnaltaan pääpiirteissään samanlaisia, mikä kertoo niiden yhteisestä alkuperästä.*

**Yhteinen alkuperä?** Mitähän sillä tarkoitetaan? Naturalistin mielestä sitä, että kaikki elämä on saanut alkunsa jostain yksinkertaisesta ”alkueliöstä”, jonka jälkeläiset alkoivat mutaatioiden ja luonnonvalinnan johdosta erilaistua kohti nykyisiä elämän muotoja. Tätä oletettua alkueliötä kutsutaan myös *yhteiseksi kantamuodoksi* (engl. *Last Universal Common Ancestor, LUCA*). Siitä ei kuitenkaan ole mitään havaintoja (kuten kirjammekin toteaa); kukaan ei tiedä hänestä yhtään mitään. Siitä huolimatta hänestä on kirjoitettu paljon, hyvin paljon viimeisen 150 vuoden aikana.

Juutalaisten, kristittyjen ja muslimien mielestä yhteinen alkuperä on Luojan luomistyössä: kaikilla eliöillä on yksi ja sama Suunnittelija. Tämä näkökulma ei ole yhtään sen epätieteellisempi tai epäloogisempi kuin joku ”LUCA”.

”*Kaikkien eliöiden solut ovat nimittäin rakenteeltaan ja toiminnaltaan pääpiirteissään samanlaisia*”: Riippuu siitä, kuinka ”pääpiirteissään” tulkitaan. Lisäksi myös perusaineenvaihdunta on ”pääpiirteissään samanlaista” – ja pitääkin olla. Näin siksi, että elämme samassa maailmassa: meillä on sama aurinko, vesi, happi, typpi, hiilidioksidi, fosfori jne. Niiden prosessointiin tarvitaan samat perusvälineet, kuten ATP-syntaasi-niminen protonivirralla toimiva generaattori, joka tuottaa soluille niiden tarvitseman polttoaineen, ATP:n.

Eliömaailma on kuitenkin erittäin monipuolinen ja moninainen, erityisesti mikro-organismien maailma: usein eroavaisuuksia on paljon enemmän kuin yhtäläisyyksiä: monet bakteerit eroavat toisistaan enemmän kuin ihminen hiirestä, joilla niilläkin lienee enemmän eroja kuin samanlaisuuksia.

Kirjan argumentin (*kaikkien eliöiden solut ovat nimittäin rakenteeltaan ja toiminnaltaan pääpiirteissään samanlaisia*) mukaan joskus kauan sitten on siis ollut solu (LUCA?), joka jo omasi nykyiset yhteiset rakenne- ja toimintapiirteet. Kun evoluutio sitten eteni satunnaisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta, LUCA:n jälkeläiset saivat niiden myötä vähitellen, pitkien aikojen kuluessa uusia toimintoja ja rakenteita, yksi solu sellaisia ja toinen tällaisia.

Näin toki voidaan ajatella, mutta se on *historian tulkintaa*, eikä sillä ole mitään tekemistä reaali biologian kanssa; hypoteesi ei perustu luonnontieteiden havaintoihin eikä tutkimustuloksiin vaan oletettuun historiaan. Näinhän kirjammekin tunnusti: ”*Yksi selvittämiseen liittyvistä ongelmista, on että elämän alkuajoista ei ole konkreettisia todisteita, kuten fossiileja.*” Kirja syyllistyykin tässä loogiseen virhepäätelmään: Ensin se tunnustaa historiallisten todisteiden puutteen, mutta silti vetoaa oletettuun historiaan (eli yhteiseen kantamuotoon).

Se siitä. Seuraava BIOS 1:n väite on todella hämmästyttävä:

{ *”Sateet piiskasivat autiota maankuorta ja irrottivat siitä erilaisia mineraaleja, ja lopulta vesi täytti maankuoren suuret altaat.” (s.100).* }

Miten ihmeessä BIOS 1 on saanut säätilatietoja noin 4000 miljoonan vuoden takaa?

## Elämän syntyä edelsi pitkä kemiallinen evoluutio (s.101)

”Elämän arvellaan syntyneen kolmessa vaiheessa. Ensin kaasukehässä olleista epäorgaanisista aineista muodostui hiilestä rakentuvia yksinkertaisia **orgaanisia** yhdisteitä, elämän rakennusaineita. Näitä olivat esimerkiksi DNA:n, RNA:n ja proteiinien rakennesosat. Tätä vaihetta, jossa epäorgaanisista aineista syntyi vähitellen orgaanisia aineita, sanotaan **kemialliseksi evoluutioksi**.

Seuraavassa vaiheessa nämä elämän rakennusaineet liittyivät yhteen, jolloin muodostui isoja jättimolekyylejä: ensin DNA:ta ja sitten sen ohjeiden mukaan syntyneitä proteiineja.

Kolmannessa vaiheessa jättimolekyylit kerääntyivät **kalvon** sisälle, joka erotti ne ympäristöstä. On havaittu, että suuret orgaaniset molekyylit, kuten rasvat, tarttuvat helposti kiinni toisiinsa ja muodostavat kalvoja, joista edelleen muodostuu pisaroita. **Pisaran** pinta vastasi solukalvoa, sillä se voi vaikuttaa aineiden kulkuun pisaran sisään ja sieltä ulos. Kun pisaran sisälle kertyi nukleiinihappoja ja proteiineja, voidaan **alkusolun** – ja elämän – ajatella syntyneen” (s.101).

Samalta sivulta löytyy perinteinen tulivuori/salama/meteoriittipommitus/valtameri-kuva perinteisen tekstinsä kera:

”Maapallon pinta oli kauan alttiina voimakkaalle ultraviolettisäteilylle, salamoinnille ja meteoriittipommituksille. Myös tulivuoren purkauksia<sup>[23]</sup> oli jatkuvasti. Kaikki edellä mainitut tapahtumat toimivat energianlähteinä<sup>[24]</sup>, jolloin kaasukehän epäorgaaniset aineet saattoivat reagoida keskenään. On myös mahdollista, että vesi ja monet muut orgaaniset molekyylit tulivat maapallolle meteoriittien mukana. Reaktioiden seurauksena meriin alkoi kertyä DNA:n ja proteiinien rakennosia, elämälle välttämättömiä yhdisteitä.”

Kaikki yllä esitetyt *arvelut* ovat mielikuvituksen tuotetta. Kuvitellut ”rakentavat kemialliset” reaktiot ovat fysiikan ja kemian lakien vastaisia. Oppikirjojen kirjoittajien arvovalta kuitenkin antaa oppilaiden silmissä näille arveluille ”tieteen sädekehän”: Sen täytyy olla totta, koska opettaja sanoi niin ja kirjassakin niin lukee. Perustelen lyhyesti: Kaasukehän (hapettoman!) *oletetuista* epäorgaanisista molekyyleistä, kuten hiilimonoksidista (häkä), vedystä, metaanista, ammoniakista ja vesihöyrystä saattoi syntyä salamoinnin, ultraviolettisäteilyn jne. vaikutuksesta pieniä orgaanisia molekyylejä, kuten aminohappoja (ks. Millerin koe BIOS 1:n s. 110).

Näin on saattanut tapahtua (jos ilmakehä<sup>25</sup> ja säätila oli yllä kuvitellun kaltainen). Mutta: ”Seuraavassa vaiheessa nämä elämän rakennusaineet liittyivät yhteen, jolloin muodostui *isoja jättimolekyylejä*.” Tämä menee jo valehtelun puolelle. Miksi? Siksi, että kuvatekstin mukaan ”Reaktioiden seurauksena meriin alkoi kertyä DNA:n ja proteiinien rakennosia, elämälle välttämättömiä yhdisteitä” (siis isoja jätti- eli makromolekyylejä). Ja huomaa, että tämän luvun otsikko kuuluu: ”Elämä syntyi ja kehittyi meressä” (verbi ei siis ole oletusmuodossa, kuten ”saattoi” tai ”ehkä”).

23 Melkoinen osa tulivuorikaasuista on kemialliselle evoluutiolle myrkyllistä hiilidioksidia (ks. alle).

24 Tekstissä mainitut tärkeät energian lähteet toimivat samalla myös tuhonlähteinä (ks. alle).

25 Alkuilmakehän oletetusta hapettomuudesta tuonnempana.

## Vesi – Vihoviimeinen paikka biomolekyylien synnylle

Meri (vesi) on se vihoviimeinen paikka, jossa jättikokoisia, monimutkaisia biomolekyyliä kuten proteiineja, DNA:ta ja RNA:ta voisi syntyä – ja vieläpä itsestään. Miksi? Jokaisen, joka vähänkin tuntee kemiaa, pitäisi tietää tämä: Proteiinit kootaan aminohapoista ribosomilla solun sisällä, suojatuissa ”erikoisolosuhteissa” (solun sisällä ei esim. ole juurikaan ns. vapaata vettä, kuten meressä). Aminohapot ovat vesiliuoksessa melko stabiileja, eivätkä reagoi toistensa kanssa muodostaakseen proteiineja. Sitä varten ne pitäisi aktivoida. Salama tai UV-säteily voi tosin joskus suorittaa tällaisen ”virityksen”. Mutta: aktivoitu aminohappo reagoisi välittömästi vesimolekyylin kanssa, ellei sen kyljessä sattuisi olemaan toista aminohappoa, joka olisi myös aktivoitu täsmälleen samaan aikaan (ja oikeasta paikasta). Ja vaikka muutamat aminohapot onnistuisivatkin muodostamaan lyhyen peptidiketjun, proteiinin esiasteen, se pian katkeaisi jostain kohtaa. Miksi? Siksi, että kaikki epäorgaanisen kemian reaktiot ovat käänteisiä ja luonto entropian lain mukaisesti pyrkii tasapainoon, energiaminimiin: Kun kaksi aminohappoa liittyy yhteen, reaktiossa vapautuu yksi vesimolekyyli. Puhutaan *dehydraatioreaktiosta*. Jos syntynyt peptidiketju jää vapaasti vesiliuokseen, se joutuu lämpöliikkeessä olevien vesimolekyylien pommituksen kohteeksi. On laskettu, että ns. elämän lämpötiloissa, 5–40 asteessa vesimolekyylien keskimääräinen nopeus (ns. Brownin liike) on yli 2000 km/t (kaksituhatta). Kun H<sub>2</sub>O osuu sopivasti ketjun peptidisidokseen, se purkaantuu (ja sitoo samalla yhden vesimolekyylin).

Sama reagointi veden kanssa koskee DNA:n ja RNA:n rakenneosia: Solussa RNA-säikeet syntyvät transkriptiossa DNA-säikeiden kopioina. Tällöin sytosiini pariutuu guaniinin ja adeniini urasiilin kanssa. Pariutuminen tarvitsee kuitenkin koneiston, *joka asettaa tyypimäiset oikeaan asentoon* siten, että ne pystyvät muodostamaan vetysidokset sapluunan vastinemäksien kanssa. Ongelma on siinä, että rakennuspalikat, vapaat yksittäiset nukleotidit eivät solun ulkopuolisessa vesiliuoksessa voi spontaanisti muodostaa uutta RNA-säiettä, vaikka käytettävissä olisikin sapluuna. Näin siksi, että *tyypimästen sitoutumispaikat ovat hydrofiilisiä* (vettä puoleensa vetäviä), jolloin ne reagoisivatkin veden eivätkä sapluunan vastinemästen kanssa. Lisäksi tyypimästen runko-osat ovat hydrofobisia (vettä hylkiviä), jolloin ne liimautuisivat toisiinsa kylki kylkeä vasten eikä mitään kelvollista RNA-rihmaa voisi syntyä.

Tämän kiusallisen ilmiön havaitsi elämän synnyn tutkija Nicholas Hud (vasta) vuonna 2007. Sen jälkeen hän onkin muuttanut omaa tarinaansa siitä, miten elämä alkumeressä kehittyi: Ensimmäiset ”alkeelliset solut” syntyivät alkumeren matalarantaisissa saaristoissa. Laajat matalavetiset rannat mahdollistivat sen, että syntymässä olevat elämän peruspalikat pääsivät vuorovesi-ilmiön ansiosta välillä kuivumaan, jotta vesi ei olisi niitä hajottanut. Hudin mukaan elämän synnyn seuraaminen olisi ollut suurin piirtein samaa kuin olisi seurannut maalin kuivumista! (Jälleen uusi *ad hoc* -hypoteesi loputtomalta tuntuvassa selitysten sarjassa.)

Oppikirjamme tulivuori/salama/meteoriittipommitus-sivulla 101 on toinenkin kuva ja siihen liitetty teksti:

”Alkusolun oletetaan syntyneen seuraavalla tavalla: Rasvamolekyylit, joilla oli vesihakuinen ja vesipakoinen pää, järjestäytyivät vedessä kaksikerroksiseksi kalvorakenteeksi. Sitten ne muodostivat pisaroita meren aallokon iskiessä rantaan. Pisaroiden pinnasta muodostui alkeellinen solukalvo, jolloin pisaran sisään saattoi kerääntyä DNA:n ja proteiinien rakenneosia.”

Asiallista tässä on ainoastaan se, että kirja käyttää oletusmuotoa: ”oletetaan syntyneen seuraavalla tavalla”. Jo yllä mainitsemissani kirjassa *Kelpoisimman synty – evoluution suurimman arvoituksen ratkaisu* evoluutiobiologi Andreas Wagner on sentään hieman rehellisempi:

”Vaikka ajattelumme on kehittynyt huomattavasti ensimmäisistä alkulientä koskevista pohdintoista, jotkin ongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Yksi on itsejakautuvasta kalvopisarasta alkeelliseen soluun vievällä tiellä oleva viimeinen este. Jos solun sisällä oleva RNA replikoiduu nopeammin kuin solu kasvaa, se lisääntyy, kunnes solu on valmis räjähtämään. Jos taas solu kasvaa nopeammin kuin RNA replikoiduu, sillä oleva RNA:n pitoisuus vähenee ja monet pisarat saavat tyhjiä jälkeläisiä. Onnistuakseen elämän piti saavuttaa tasapaino eli sen oli **säädettävä** replikaatiota ja sen kasvua tarkasti siten, että RNA ei replikoidu nopeammin kuin sen säiliö kasvoi. 1900-luvun tiede on jättänyt tämän arvoituksen seuraavalle sukupolvelle” (s. 56-57).<sup>26</sup>

Näin on: ”jättänyt tämän arvoituksen seuraavalle sukupolvelle”: Eikä seuraava, 2000-luvun sukupolvi ole päässyt sen pidemmälle. – Vaikka populaarimedia, kuten *Tieteen kuvalehti* koettaa silloin tällöin esittää ongelman lähes ratkaistuksi: ”Elämän reseptit tunnetaan. Laboratorioissa syntyy uutta elämää – ELÄKÖÖN ELÄMÄ” (Erikoisnumero 13/2005, kansilehden tekstiä). Laboratorioissa siis syntyi uutta elämää vuonna 2005? Todellako? Aihetta käsitellään artikkelissa, joka on otsikoitu ”ELÄMÄN RESEPTIT: Kaikki ainekset tiedossa – tekotapa tuntematon” (s.26-31): Artikkelissa kuvataan molekyylibiologi Jack Szostakin koetta vuodelta 2003: Szostak sekoitti keskenään savihiukkasia, RNA-molekyylejä ja rasvahappoja. Muutamassa tunnissa RNA-molekyylit sitoutuivat savihiukkasiin ja rasvahapot alkoivat muodostaa *solumaisia vesikkeleitä*, jotka ympäröivät hiukkaset. Vesikkelit pystyivät liittämään itseensä lisää rasvahappoja, jotka saivat rakulat kasvamaan. Kun niistä tuli riittävän suuria eli halkaisijaltaan noin 130 nanometrin kokoisia, *tutkijat saivat ne jakaantumaan*. (Miten, sitä ei kerrota.)


Szostak käytti laboratoriossaan ilmeisesti joko hiiva- tai bakteerisolun tuottamaa RNA:ta, sillä kuten jo yllä kävi ilmi, sitä ei voi syntyä itsestään. Lisäksi vaikuttaa siltä, että tutkijat jotenkin keinotekoisesti ”avustivat” kalvopisaran jakaantumista? Tällaisella alkeellisella kokeella ei ole mitään tekemistä elämän synnyn kanssa. Melkein sama kuin jos ampuisin ilmakiväärillä kohti kuuta ja väittäisin, että luoti lensi kuuhun saakka.

26 Huomaa, että tässä puhutaan RNA:sta, ei DNA:sta, kuten BIOS 1. Yleensä on uskottu, että ensin syntyi yksinkertaisia RNA-juosteita ja vasta myöhemmin kaksoiskierteistä DNA:ta; on puhuttu ns. RNA-maailmasta.

Myös Szostakin kollega Steen Rasmussen yritti vastaavalla menetelmällä luoda elämää ja hän suunnitteli kokeen, jossa syntyville eliöille muodostuisi kyky rakentaa itseään. Lehti jatkaa: ”Szostakin ja Rasmussenin tutkimusten tarkoituksena on siis *aikanaan* luoda keinotekoisia elämää. Sitä ennen on kuitenkin otettava selville [– –] Ehkä Rasmussen, Szostak ja heidän tutkijatoverinsa saavat tuloksia, jotka valottavat sitä, mitä maapallolla todella tapahtui neljä miljardia vuotta sitten.”

Kansilehden teksti siis kertoi, että laboratorioissa syntyy uutta elämää. Aihetta käsittelevä artikkeli kuitenkin totesi, että tutkimusten tarkoituksena onkin vain *aikanaan* luoda keinotekoisia elämää. Tämähän on kuin suoraan iltapäivälehtien otsikoista. Olenkin kutsunut *Tieteen kuvalehteä* Tieteen Iltasanomiksi. Joku, jolla ei ehkä ollut rahaa ostaa lehteä R-kioskin hyllyltä, tai ei ollut aikaa lehteen tutustua, sai kuitenkin lehtihyllystä tiedon, että ”laboratorioissa syntyy uutta elämää” ja uskoo siihen varmasti vielä tänäkin päivänä...

Kuva: Caleb Sallisbury © creation.com. Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, Luku 1, Onko Jumala olemassa?



**Kun tutkimus paljastaa elämästä yhä mykistävämpää suunnittelua ja informaatiota sen väitetään syntyneen satunnaisuudesta. Samalla avaruudesta pyritään tunnistamaan edes jonkinlainen informaatiota sisältävä signaali, jota käytettäisiin ilman muuta selväksi todistukseksi ulkoavaruuden älykkästä lähettäjistä.**




Tähän liittyen kirjastamme löytyy kuvatehtävä sivulta 110: **Millerin ja Ureyn koe:**

”Alla oleva piirroskuva esittää Millerin ja Ureyn vuonna 1953 laboratoriossa suorittamaa koetta. Vesihöyryä ja kaasua johdettiin lasipalloon, jonne kohdistettiin sähköpurkauksia. Viikon kuluttua kaasut jäähdytettiin ja syntynyt liuos analysoitiin. Vesiliuoksessa oli aminohappoja ja joitain muita orgaanisia yhdisteitä.”

Tutustu kuvassa esitettyyn koejärjestelyyn.

- Mitä tutkijat halusivat selvittää?
- Mikä oli heidän hypoteesinsa?
- Selitä, mihin koejärjestely perustui.
- Mikä oli kokeen tulos?
- Mitä virhelähteitä kokeeseen sisältyy?




**Kuuluissa Millerin–Ureyn koe. Vähemmän kuuluisia ovat sen elämälle myrkylliset tulokset.**

Kuvan mukaan kaasut olivat metaani  $\text{CH}_4$ , ammoniakki  $\text{NH}_3$ , hiilimonoksidi eli häkä  $\text{CO}$ , vetykaasu  $\text{H}_2$  ja vesihöyry  $\text{H}_2\text{O}$ . Kirjan edellisiin laitoksiin (painokset 1–5) oli päässyt pujahtamaan kiusallinen virhe: häkäkaasun asemasta olikin hiilidioksidi,  $\text{CO}_2$ . Miksi Miller ja Urey eivät käyttäneet hiilidioksidia? Siksi, että hiilidioksidin hajotessa sähköpurkauksen vaikutuksesta, kaasuseokseen olisi muodostunut liikaa happea. Mitä happi olisi haitannut? Se selviää kirjan sivulta 103:

*”Hapen ilmaantumisella kaasukehään oli monia tärkeitä seurauksia. Happi reagoi kaasukehässä olleiden myrkyllisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin, metaanin ja ammoniakkin kanssa. Sen seurauksena myrkylliset kaasut hävisivät ja kaasukehän koostumus alkoi pikkuhiljaa kehittyä nykyisenlaiseksi.”*

Millerin ja Ureyn kokeet edellyttävät siis hapetonta ”alkuilmakehää”. Mutta sellainen elää enää vain oppikirjoissa. Jo 1970-luvulla alkoi tulla esiin todisteita, että planeettamme ilmakehässä on aina ollut happea. Tähän viittaavat esim. erittäin vanhoiksi ajoitetut esikambriset hapettuneet rautamalmit, joita on löytynyt mm. Grönlannista ja Australiasta. (Tästä tarkemmin alkaen sivulta 44.)



**Aminohapot ovat epäsymmetrisiä molekyylejä kuten hansikkaat ovat epäsymmetrisiä vaatekappaleita. Solu valmistaa vain vasenkätisiä aminohappoja, mutta abiottiset prosessit kuten Miller-tyyppiset kokeet tuottavat molemminkätisiä aminohappoja suurin piirtein saman verran (ns. raseemisena seoksena). Ne ovat solulle myrkyllisiä. Näin siksi, että yksikin vääräkätinen aminohappo voi pilata proteiinin vääristämällä sen 3-ulotteista rakennetta. Kukaan ei ole osannut selittää, miten ”alkuliemi” eliminoi vääräkätiset aminohapot. Selityksiksi on tarjottu mm. polarisoitunutta valoa ja ”haihtumista”.**

## Millerin–Ureyn kokeet tuottivat lähinnä myrkyjä

*Mikä oli kokeen tulos?* Se, että Millerin koeputken pohjalle kertyi ruskeaa myrkyllistä tervaa ja muurahaishappoa. Pienellä saannilla syntyi myös yksinkertaisia aminohappoja, mutta ei läheskään kaikkia niitä kahtakymmentä, joita solu välttämättä tarvitsee.

Kirjan tehtäväosa siis kysyy: **Mitä virhelähteitä kokeeseen sisältyy?** Tärkein virhelähde lienee kokeen lähtökohta, oletus hapettomasta ilmakehästä. Siinä ei siis myöskään saanut olla tulivuorikaasua eli hiilidioksidia, CO<sub>2</sub>.<sup>27</sup> Toinen virhelähde on siinä, että syntyneet yksinkertaiset yhdisteet siirrettiin suojaan laitteiston alaosaan olevaan säiliöön, jotta kipinöinti ei saman tien hajottaisi niitä harvoja aminohappoja, joita saatiin syntymään.

Mitä itse ”alkuliemeen” tulee, brittiläinen geokemisti Jim Brooks kirjoitti siitä v. 1985:<sup>28</sup>

”Jos sellaista olisi maapallolla joskus ollut pitkähkön aikaa, olisi siihen kertynyt suhteellisen runsaasti typpipitoisia orgaanisia yhdisteitä (aminohappoja, nukleiinihapon emäsosia jne.). Niistä olisi todennäköisesti syntynyt huomattavia määriä ’typpipitoista koksia’, jota olisi säilynyt monissa prekambriassa kerrostumissa. (Tällaista ’koksia’ saadaan normaalisti kuumennettaessa runsaasti tyyppiä sisältäviä aineita.) Runsaasti typpisiä aineksia ei ole kuitenkaan vielä löydetty varhaisen prekambriajan kivilajeista. Näyttää olevan täysin päinvastoin: varhaisen prekambriajan orgaanisessa aineessa on suhteellisen alhainen typpipitoisuus (alle 0,15 %).”



Wikimedia, Poeticbent / Sodipodi clipart

**Millerin–Ureyn koe tuotti elämälle myrkyllistä tervaa ja muurahaishappoa. Moni kuvittelee yhä virheellisesti, että koejärjestely olisi todistanut elämän synnyn hypoteettisessa alkuliemessä.**

En ole kuullut, että tuota ”koksia” olisi senkään jälkeen löydetty. Palaan Brooksinkin kirjaan tuonnempana.

27 Kun Millerin kokeita myöhemmin toistettiin hiilidioksidipitoisessa kaasuseoksessa, ei saatu syntymään juuri mitään mielenkiintoista. (Ks. esim. Zahnle ym.: Earth’s Earliest Atmospheres, *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, June 23, 2010.)

28 Brooks, J., *The Origin of Life*, 1985, s.118. Suom. *Näin alkoi elämä*, Sanan Kirjat, 1987.

{ *”Nykyisin ajatellaan, että elämä on syntynyt maapallolla vain kerran. Kaikilla maapallolla tavatuilla elämänmuodoilla on siis yhteinen alkuperä”* (s.102). }

Miksi näin ajatellaan? Siksiköhän, että yhdestäkin elämän synnystä on tullut niin suuri tieteellinen ongelma? Jos elämää olisi syntynyt useita kertoja, esim. kolmesti, ongelma olisi kolminkertainen.

{ *”Vanhimmat elämän merkit on löydetty Grönlannista. Ne ovat noin 3,8 miljardia vuotta vanhoja, ja niitä voidaan pitää eräänlaisina hyvin karkeina versioina ensimmäisistä elävistä soluista”* (s.102). }

Tällä viitataan Grönlannin Ishuan kivilajien orgaaniseen ainekseen. Brooks: ”Orgaaninen aines Ishuan kivilajeissa on hyvin vaikeasti tulkittavissa. Ei voida sanoa jyrkästi, että elämää oli (tai ei ollut) niiden kivilajien syntyaikoina, sillä väitteellä ei ole selviä luonnontieteellisiä todisteita” (s.115). Jos aines on hyvin vaikeasti tulkittavaa, miten tiedetään, että se edustaa ”ensimmäisten solujen karkeita versioita”?

{ *”Koska ilmakehässä ei tuolloin vielä ollut otsonia, nämä bakteerejakin alkeellisemmat eliöt olivat alttiina ultravioletisäteilylle, mikä aiheutti niiden perimässä runsaasti mutaatioita. Mutaatiot tuottivat uusia ominaisuuksia, joista luonnonvalinta suosi sopeutumisen kannalta parhaita. Näin **biologinen evoluutio** saattoi alkaa”* (s.102). }

Tämä on korkeamman luokan toiveajattelua: Mutaatiokokeita on siis tehty yli sata vuotta ja ne kertovat aivan jotain muuta kuin mitä kirjamme väittää. – Mutta ainahan voi kuvitella, että joskus silloin hyvin kauan aikaa sitten, kun maailma oli erilainen... Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä biologian eikä luonnontieteiden kanssa. Mutaatioista tuonempana. Kukahan muuten tietää, mitä olivat nuo ”bakteerejakin alkeellisemmat eliöt”?

{ *”Elämän kehityshistoria ei ole ollut suoraviivaista, vaan siinä on ollut monia erilaisia polkuja ja umpikujia. Evoluutiolla ei myöskään ole pyrkimystä minkäänlaiseen täydellisyyteen, määrättyyn suuntaan tai päämäärään”* (s.102). }

Kuitenkin, hieman aikaisemmin, sivuilla 78–85 kerrottiin, miten luonnonvalinta suosii, miten luonnonvalinta ohjaa, miten se karsii, suuntaa jne.

## Fotosynteesin kehittyminen merkitsi valtavaa kehitysaskelta (s.103)

”Merkittävä harppaus elämän kehityksessä tapahtui noin 3 miljardia vuotta sitten, kun **fotosynteesi** eli auringon valon avulla tapahtuva yhteyttäminen kehittyi. Bakteerisolujen sisälle muodostui fotosynteesissä tarvittavia väriaineita, kuten **lehtivihreää** eli klorofylliä, joka pystyi sitomaan auringon valoenergiaa. –Auringon valoa hyödyntävät bakteerit olivat **syano**ba**kteereja**, myöhemmin syntyvien viherhiukkasten edeltäjiä” (s.103).

”Fotosynteesi eli valoenergian muuttaminen kemialliseksi energiaksi on eliökunnassa laajalle levinnyt taito<sup>[29]</sup>: fotosynteettiset prokaryootit ja eukaryootit bakteereista leviin ja korkeampiin kasveihin asuttavat elinympäristöjä maaperässä ja vesissä. Fotosynteettisiä arkkeliöitä<sup>[30]</sup> ei ole kuitenkaan löydetty, mikä viittaa siihen, että fotosynteesi kehittyi vasta sen jälkeen, kun arkit ja bakteerit olivat eronneet omiksi kehityslinjoikseen. Tämä eroaminen tapahtui varhain solujen historiassa, joten fotosynteesi on hyvin vanha ilmiö. Fotosynteesissä valokvanttien eli fotonien energia muuntuu ATP:ksi ja NADPH:ksi. Nämä kuluvat sitten sokereiden ja muiden orgaanisten molekyylien syntetisoimiseen CO<sub>2</sub>:sta” (Heino & Vuento, s.120).

Orgaaninen aines on aina syntynyt fotosynteesin kautta. (Poikkeus ehkä se vähäinen osuus, mitä kemolitotrofit tuottavat, tai mitä tuottivat kuvitteellisen alkuiltmakehän UV-säteily ja salamointi.) Eli ilman fotosynteesiä täällä olisi vain kemolitotrofisia bakteereja ja arkkeliöitä. Totta siis on, että ”merkittävä harppaus” tällaisesta elämän monotonisuudesta sen moninaisuuteen ja monipuolisuuteen on fotosynteesin ansiota.

Mutta: Väite ”kun fotosynteesi eli auringon valon avulla tapahtuva yhteyttäminen kehittyi”<sup>31</sup>, ei nykytiedon valossa vaikuta lainkaan uskottavalta. Näin siksi, että *mitkään tunnetut* fotosynteesisysteemit eivät voi kehittyä yksinkertaisimmista systeemeistä (ei pienin, eikä suuremminkaan askelin) – fotosynteesit ovat nerokkaasti integroituneita ”kaikki–tai–ei mitään”-järjestelmiä.<sup>32</sup> Fotosynteesien täytyi syntyä kerralla ja täysin toimintavalmiina, ei vähitellen jostain ei-fotosynteesistä. Fotosynteesin *valoreaktiot* ja siihen kiinteästi linkittynyt *Calvinin sykli* (kuin myös sitä hyödyntävä *Krebsin sykli*) lienee yksi kaikkein monimutkaisimmista integroiduista biokemiallisista järjestelmistä, reaktiosarja, jossa valoenergia muunnetaan sähköksi, sitten NADPH- ja ATP-molekyyleiksi, joiden energialla tuotetaan ensin sokeria, sitten amino- ja rasvahappoja jne. Systemi perustuu kvanttimekaniikkaan, ilmiöön, jonka muuttamat ihmiskunnan nerot löysivät vasta 1920-luvulla.

29 Huomaa: ”Taito” (joka syntyi tyhjästä).

30 Arkeoneja

31 Fotosynteesinkin tapauksessa kehitymisellä tarkoitettaneen uusdarwinistisen teorian mukaista sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan aikaansaamaa vähittäistä, pienten perättäisten askelten kehitystä yksinkertaisesta monimutkaisempaan.

32 Integroitu monimutkaisuus tarkoittaa monien osien muodostamien kokonaisuuksien mittavaa yhteistoimintaa.

Kaikki levät ja kasvit sekä monet syanobakteerit käyttävät veteen perustuvaa ja happea tuottavaa kaksinkertaista, sarjaan kytkettyä järjestelmää, fotosysteemi ykköstä (FS 1) ja fotosysteemi kakkosta (FS 2). Kuitenkin, ainakin purppurabakteerit, viherbakteerit, heliobakteerit<sup>33</sup> sekä jotkut syanobakteerit käyttävät vain jompaakumpaa, ykköstä tai kakkosta (joiden rakenne ja toiminta poikkeavat joissain yksityiskohdissaan kasvien FS ykkösestä ja kakkosesta). Niissä elektronien lähteenä käytetään veden sijasta esim. rikkivetyä (H<sub>2</sub>S) alkuainerikkiä (S<sup>0</sup>) tai ferrorautaa (Fe<sup>2+</sup>). (Heinon ja Vuennon mukaan tällaisten bakteerien fotosysteemit ovat ”suhteellisen yksinkertaisia”, s.123. Katsomme tuonempana, miten monimutkaista tuollainen suhteellinen yksinkertaisuus on.)

Hyötysuhteiltaan maailman parhaat voimalaitokset toimivat vesikäyttöisellä kaksinkertaisella fotosynteesillä. Puun lehti on melkoinen tehdasrypäs. Se koostuu noin 70 miljoonasta solusta, joissa jokaisessa on noin 30–40 viherhiukkasta eli kloroplastia ja jokaisessa kloroplastissa on noin 600 miljoonaa klorofylli- eli lehtivihreämolekyyliä. Jo tuon tehdasryppään yksittäinen liukuhihna, viherhiukkanen on palautumattoman monimutkainen kokonaisuus (kaikki tai ei mitään -systeemi). Tämä tarkoittaa sitä, että sen evoluutiota ei voida johtaa sen komponenttien fysiikasta ja kemiasta eikä vetoamalla johonkin aikaisempaan ja mukamas yksinkertaisempaan.

Michael Polanyi, aikansa tunnetuimpia kemistejä ja filosofejä on todennut:<sup>34</sup>

”Tiettyjen periaatteellisen tason mahdottomuuksien<sup>[35]</sup> tunnustaminen loi perustan erälle fysiikan ja kemian pääperiaatteille. Samoin sen tunnustaminen, että eläviä olentoja ei voida ymmärtää fysiikan ja kemian perustalta ei suinkaan rajoita ymmärrystämme elämästä vaan ohjaa sitä oikeaan suuntaan.”


Fotosynteesi, yhteyttäminen, jossa vedestä ja hiilidioksidista valmistetaan ”perussokeria” koostuu kahdesta osasta, valo- ja pimeäreaktioista. [Yksinkertaistettuna perusreaktio menee:  $n\text{H}_2\text{O} + n\text{CO}_2 + \text{valo} \rightarrow (\text{CH}_2\text{O})n + n\text{O}_2$ .] Käsittelen ensin lyhyesti valoreaktioita:

Vettä elektronien lähteenä käytävissä syanobakteereissa, levissä ja kasveissa toimii siis kaksi sarjaan kytkettyä järjestelmää: FS 1 ja FS 2. Molempien piti olla täsmällisesti paikoilleen asennettuina ja toimintavalmiina heti alussa. Valokvanttien energialla niiden reaktiokeskukset tuottavat sähköä (elektroneja ja protoneja) hajottamalla vettä (jolloin syntyy myös happea). Vedestä saadulla sähköllä tuotetaan suurienergisää, viritettyjä NADPH- ja ATP-molekyyliä. Niiden energialla hiilidioksidi liitetään 5-hiiliseen (5C), ribuloosi-1,5-bifosfaatti-nimiseen ”alkusokeriin”. Syntyneet 6-hiiliset (6C) sokerit hajotetaan heti kahdeksi kolmihiiliseksi ”perussokeriksi” (trioosi). Osasta jatkojalostetaan mm. sakkaroosia, tärkkelystä sekä rasva- ja aminohappoja, osasta uutta ribuloosi 1,5-bifostaattia seuraavaa kierrosta varten.

33 Siis *heliobakteerit* – ei *helikobakteerit*.


34 Polanyi, M., Life's irreducible structure. Live mechanisms and information in DNA are boundary conditions with a sequence of boundaries above them, *Science* **160**(3834):1308–12, 1968.

35 Tällä Polanyi tarkoitti ikiliikkujaa ja alkemiaa, sitä että lyijystä voitaisiin valmistaa kultaa.



Wikimedia, Someric, CCBY-SA 4.0

**Viherhiukkasen tylakoidikalvoon upotetut kaksi fotosysteemiä, FS1 ja FS2 (PSI ja PSII) sekä niiden tuottamia elektroneja ja protoneja käyttävät sytokromi ja ATP-syntaasi.**



Wikimedia, Mike Jones, Adenosine, CCBY-SA 3.0

Sähkön eli elektronien ja protonien tuotanto alkaa FS 2:lla (2 siksi, että se löydettiin ja nimettiin vasta ykkösen jälkeen): Kun sopivan aallonpituuden (noin 680 nm) omaava fotonin iskeytyy johonkin sen monista klorofyllimolekyyleistä, yksi sen elektroneista virittyy korkeammalle tasolle. Elektroni kuitenkin lähes saman tien ”putoaa” takaisin omalle kehälleen luovuttaen saamansa energian viereiselle klorofyllille ja tämä taas seuraavalle ns. Försterin resonanssilla kunnes energia tunneloidaan *reaktiokeskukseen*, jossa vesimolekyyli hajotetaan. FS 2:n reaktiokeskuksen paikka, mitat, asento ja arkkitehtuuri ovat tarkoin määrätty; kyseessä on *täsmennetyin monimutkainen rakenne*. [Tämä rakenne sisältää ns. paikan informaatiota (engl. *position information*), jota DNA ei koodaa, vaan se tulee ”jostain muualta”.] Yhden valofotonin energia ei kuitenkaan riitä lujan vesimolekyylin hajotukseen. (Jos riittäisi, eihän täällä vettä olisikaan.) Reaktiokeskuksen ydintä, ”energian keskittämää” kutsutaan myös *katalyyttiseksi keskukseksi* (ks. kuva s. 43) ja se koostuu erikoisesta mangaani-, kalsium-, happi- ja vesimolekyylien ryppäästä. Sinne keskitetään neljän fotonin energia. Tämä antaa keskukseksi niin suuren hapetuspotentiaalilin, että vesi alkaa hajota neljässä vaiheessa hapeksi, protoneiksi ja elektroneiksi. Jotta H<sub>2</sub>O alkaisi hajota, sen on oltava katalyyttikeskuksessa täsmälleen määrättyssä paikassa ja määrättyssä asennossa. Vain katalyyttisen keskuksen täsmällisen pikkutarkka rakenne mahdollistaa tämän. Rakenne ei voi syntyä ”vähitellen”, pienin askelin; se joko toimii tai ei toimi.

FS 2<sup>36</sup> (ks. kuva s. 43) käsittää 16 proteiiniyksikköä, 36 klorofylliä, kaksi feofytiiniä, kaksi hemiä ja useita suojaavia väripigmentejä (karotenoideja). Yksikkö ja kukin sen komponentti on upotettu täsmälleen määrättyyn paikkaan, asentoon ja määrättyyn syvyyteen viherhiukkasan tylakoidikalvolla. Alberts'n<sup>37</sup> mukaan tämä rakenne on säilynyt periaatteessa muuttumattomana ”miljardeja vuosia”. (Eikä se voikaan muuttua, koska sen jälkeen se tuskin toimisi.)

Tämän systeemin (FS 2) täytyy kuitenkin toimia yhteistyössä ja synkronoidusti FS 1:n kanssa. FS 1 on hieman erilainen (ks. kuva sivulta 44), jo siitäkin syystä, että sen ei enää tarvitse hajottaa vettä. Mutta se kykenee hyödyntämään FS 2:sta saamansa ”jännössähkön”<sup>38</sup>. Tämän jännössähkön potentiaalia nostetaan sen omassa reaktiokeskuksessa uuden valokvantin avulla niin korkealle, että ferredoksiini-niminen elektronin siirtäjä saadaan viritettyä. Virittynyt ferredoksiini pystyy sitten ”energisoimaan” tärkeän NADP<sup>+</sup>-nimisen molekyylin suurenergiseksi NADPH:ksi, jolla hiilidioksidi saadaan liitettyä ”alkusokeriin” (joka on tuo yllämainittu 5-hiilinen ribuloosi-1,5-bifosfaatti). Tätä hiilidioksidin liittämistä ”alkusokeriin”, kutsutaan assimilaatio- eli yhteyttämisreaktioksi. Se aloittaa Calvinin syklin. Calvin tuottaa 3-hiilisen ”perussokerin” (joka on siis muiden sokereiden sekä rasva- ja aminohappojen raaka-ainetta).

36 Alberts ym., s.791, jossa kuvataan syanobakteerin fotosysteemiä, joka on ”hieman yksinkertaisempi” kuin kasvien ja levien. (Älä tulkitse tätä siten, että syanobakteerin fotosysteemi olisi alkeellinen.)

37 Ibid. (Alberts ym., s.791)

38 Sytokromi-b6f-niminen elektronin siirtäjä kuljettaa FS 2:n synnyttämän korkeaenergisien elektronin fotosysteemi ykköseen. Mutta matkalla sinne se käyttää osan energiasta ATP-molekyylin tuottamiseen. Tällöin elektronin energiataso laskee, josta syystä nimitys ”jännössähkö”.



## Fotosynteesin kehittyminen olisi ollut tulella leikkimistä

Valoa keräävän, hemoglobiinia muistuttavan klorofylli-molekyylin rakentaminen vaatii 17 erilaista entsyymiä, 17 vaihetta. Kaiken täytyy tapahtua sarjassa, nopeasti ja suojausti. Miksi? Siksi, että klorofylli ja osa sen esiasteista ovat suojaamattomina vaarallisia; puhutaan *fototoksisuudesta* eli valon aikaansaamasta myrkyllisyydestä. Klorofylli, niin kuin sen esiasteetkin, ovat siis *väripigmenttejä* eli ne ”imevät” itseensä valoa, energiaa aivan kuten musta auton konepelti auringonpahteessa. Klorofylli tai sen esiasteet voivat voimakkaan valosäteilyn johdosta joutua jatkuvaan ja liian korkeaan viritystilaan, jos ne eivät pääse eroon liioista fotoneistaan. Tästä käytetään englanninkielistä termiä *triplet state chlorophyll*, mikä tarkoittaa tiettyä kvanttitilaa. Tällöin ne reagoivat veden tai hapen kanssa synnyttäen reaktiivisia ja myrkyllisiä happiyhdisteitä (engl. *reactive oxygen species*, ROS). [Erityisen myrkyllinen on ns. ”singletti-happi” (engl. *singlet oxygen*, joka ei kuulu ROS-ryhmään, vaan on molekyylisestä hapesta, O<sub>2</sub>:sta poikkeava kvanttitila.]

Evolutionistit ovat koettaneet torjua tätä argumenttia esittämällä, että koska alkui-makehässä ei ollut happea, siitä ei ollut vaaraa silloin kun klorofylli syntyi. Selitys on kuitenkin ontuva, koska jo ilman happeakin osa klorofyllin esiasteista on fototoksisia.<sup>39</sup> (Hapettomasta ilmakehästä tuonnempana.) Lisäksi vapaa (karkuun päässyt) triplet state -klorofylli on jo itsessään myrkyllinen vaikkei se reagoisikaan hapen kanssa.

Mutta valmis fotosysteemi on täydellinen järjestelmä, jossa klorofyllit on siis ”upotettu” tarkkaan järjestykseen ja asentoon suojaavien kalvoproteiinien ja karotenoidien lomaan. Puhutaan antenniyhdistymästä, koska antennien tavoin tämä monimutkainen yhtymä sieppaa ja välittää fotoneja. (Ne siis sisältävät ns. paikan informaatiota, joka ei tule DNA:sta.) Jäähdyttimen tavoin tämä yhdistymä pystyy tavallisesti siirtämään liian energian muualle. (Ennen kuin tiesin tämän, ihmettelin usein, että vaikka oma nahkani palaa keskikesän auringossa alle tunnissa, miksi puiden lehdet eivät kärvenny.) Evoluution kannalta tähän liittyy sellainenkin ongelma, että antenniproteiinien (ja karotenoidien) olisi pitänyt syntyä *ennen klorofylliä*. Ilman antenniproteiineja ja suojaavia apupigmenttejä klorofyllit ja niiden palovaaralliset esiasteet kärventäisivät itsensä ja koko viherhiukkasan keskipäivän pahteessa – ilman happeakin. Mutta mitä solu olisi tehnyt antenniproteiineilla ja karotenoideilla ennen kuin klorofylli kehittyi? Tarpeettomat proteiinit olisivat luultavasti takertuneet toisiinsa, sakkautuneet ja myrkyttäneet koko solun.

Koska suojaamattomat klorofyllit ja niiden esiasteet saattavat liian voimakkaan valon vaikutuksesta joutua yllä mainittuun palovaaralliseen triplet-tilaan, ne vaativat täysaikaista suojausta, biologista palomuuria heti niiden synteesin alusta alkaen. Tämän tehtävän suorittavat nuo 17 yllä mainittua entsyymiä, jotka rakentavat klorofyllin sen esiasteista: heti kun entsyymi 1 on tehnyt työnsä, paikalla pitää olla entsyymi 2, joka ottaa substraatin haltuunsa ja jatkomuokkaa sitä. Jos seuraavan vaiheen entsyymiä ei ole paikalla, suojaaton substraatti ”palaa”. Miten kaikki 17 entsyymiä sattuivat syntymään yhtä aikaa, vaikka teorian mukaan ensin piti tapahtua jonkin aikaisemman geenin kahdentuminen ja sitä seuraavat, kenties miljoonia vuosia vaatineet mutaatiot ja valintakierrokset, jotta olisi saatu aikaan seuraavan vaiheen entsyymin geeni?

39 Sandmann, Scheer: Chloroplast pigments; chlorophylls and carotenoids in: Raghavendra A.S.: Photosynthesis: A comprehensive Treatise, Cambridge University Press, pp. 44–57, 1998.

Valoreaktioissa vesi siis hajotetaan. Myös tällöin syntyy myrkyllisiä happiyhdisteitä: Vesimolekyyleistä ( $H_2O$ ) ei näet synny heti tavallista molekylaarista happea ( $O_2$ ), vaan erittäin reaktioherkkää atomista happea ja yhtä myrkyllistä vapaata OH-radikaalia. Happiradikaalien takia erityisesti FS 2:ssa pitää olla valmiit järjestelmät, jotta vesimolekyylien hajotus tapahtuu pareittain, lähellä toisiaan. Näin syntyneet atomiset hapet voivat reagoida toistensa kanssa ja muodostaa myrkytöntä molekylaarista happea.

Jo yllä mainitun singletti-hapen lisäksi ainakin FS 1:n reaktiokeskuksessa syntyy myös ns. superhappea (engl. *superoxide*, kemiallinen symboli  $O_2^-$ ). Väärässä paikassa, väärään aikaan ja väärinä pitoisuuksina superhappi on erittäin myrkyllistä ja siksi pitää olla olemassa systeemi, joka neutraloi sen. Tehtävän hoitavat superoksididismutaasi-nimiset monimutkaiset entsyymit, joita on suuri ja monipuolinen joukko. Ne tekevät superhapestä vetyperoksidia ( $H_2O_2$ ). Mutta väärässä paikassa sekin on myrkky, joka pitää neutraloida. Sitä varten on olemassa peroksidaasi- ja katalaasi-nimisiä entsyymejä. Esimerkiksi katalaasi koostuu yli 500 aminohaposta ja jo sen geenin emäsjärjestyksen löytymiseen satunnaishaulla tarvittaisiin monen universumin resurssit. (Jo sadan aminohapon suuruisen proteiinin oikean aminohappojärjestyksen sattumalta löytymisen todennäköisyys on  $1/10^{130}$  eli mahdoton tässä universumissa, jossa oletetaan olevan korkeintaan  $10^{90}$  vetyatomia.<sup>40</sup>

Myös superoksididismutaasien, peroksidaasien ja katalaasien piti olla paikalla heti alussa, muuten solu olisi myrkyttynyt. Mutta ennen fotosynteesiä niitä ei voinut olla, sillä niitä ei tarvittu ja niistä olisi ollut pelkkää haittaa, merkittävää haittaa (eli kilpailuedun, fitnessin menetystä).

Mitä vapaisiin happiradikaaleihin tulee, huomautan, että pieninä pitoisuuksina ja oikeissa paikoissa ne toimivat välttämättöminä solujen välisen viestinnän molekyyleinä. Niitä syntyy myös mitokondrioissa sokerin palaessa vedeksi ja hiilidioksidiksi ja ne täytyy eliminoida sieltäkin. Pitemmittä puheita totean vain, että puheet fotosynteesin kehittymisestä ovat osa materialistista luomiskertomusta, joka on ristiriidassa nykyisin voimassaolevien fysiikan ja kemian lainalaisuuksien kanssa.

Fotosynteesin valoreaktioihin liittyy siis välttämättömänä jatkotoimintona hiilen talteenotto ja Calvinin sykli. Valoreaktiot tuottavat siis pelkkiä ”energiamolekyylejä”, ATP:tä ja NADPH:ta, ”nalleja”, jotka pian räjäyttäisivät solun, ellei niitä kulutettaisi kontrolloidusti Calvinin syklissä. Tämä sykli vaatii 11 entsyymiä (9 tai 10 ei riitä). Suurin (noin 68 000 daltonia<sup>41</sup>) ja monimutkaisin niistä on *rubisco*, joka aloittaa syklin liittämällä hiilidioksidin 5-hiiliseen ”alkusokeriin”, ribuloosi-1,5-bifosfaattiin. Rubisco lienee massayksikköinä mitattuna koko biosfäärin yleisin entsyymi, joka täyttää puolet viherhiukkasesta. Näiden kaikkien 11 entsyymien piti syntyä samanaikaisesti valoreaktioiden kanssa, sillä niiden on toimittava synkronoidusti.

---

40 Tästä enemmän mm. Andreas Wagnerin kirjassa Kelpoisimman synty sekä siitä tekemässäni analyysissa, joka on vapaasti luettavissa osoitteessa [luominen.fi/wagner](http://luominen.fi/wagner).

41 Dalton on massayksikön mitta, 1/12 osa hiili-12 molekyylin massasta.

## Miten oppikirjat selittävät fotosynteesin kehittymistä?


Evoluutioteoreetikkojen vakioselitys minkä tahansa systeemin tai eliön alkuperälle on jokin ”aikaisempi ja yksinkertaisempi”. Miten siis kasvien, levien ja syanobakteerien kaksivaiheinen, vettä käyttävä fotosynteesi kehittyi? Tietysti yksinkertaisemmista eli ”vanhojen bakteerien” yksivaiheisista systeemeistä, jotka eivät perustu vedenkäyttöön. Ne siis käyttävät elektronien lähteenä jotain helpommin käsiteltävää ainetta kuten rikkivetyä, joka hajoaa paljon herkemmin kuin vesi. Kun rikkivety hajotetaan, siitä saadaan alkuainerikkiä + protoneja ja elektroneja kuten vedestäkin. Koska rikkivety hajoaa helposti, ei fotosysteemi 2:n (FS 2) erikoisrakenteista katalyysikeskusta tarvita. Jotkut bakteerit, kuten purppurabakteerit käyttävät kakkostyyppin kaltaista systeemiä, vihreät rikkibakteerit ykköstyyppistä. Nykyinen kaksivaiheinen fotosynteesi siis oletetusti kehittyi näiden yhteensulautumisesta pienin muunnoksien. Niistä ehkä tärkein on FS 2:n katalyyttisen keskuksen veden hajotuksen mahdollistava täsmärakenteinen mangaani–kalsium–happi-rypäs. Se ei kuitenkaan ole voinut kehittyä joidenkin aikaisempien ”reaktiokeskusgeenien” mutaatioista, koska se sisältää paikan (ja asennon) informaatiota, jota geenit eivät koodaa. Huomaa siis, että kaikki soluelimet, kuten viherhiukkanen, ovat syntyneet ja syntyvät vain ja ainoastaan aikaisempien soluelinten klooneina: viherhiukkasen syntyvät viherhiukkasista, geenien kautta tuotetaan vain kloonien kasvuun tarvittavat raaka-aineet.

Kasvien, levien ja syanobakteerien vedenkäyttöön perustuva kaksivaiheinen fotosynteesi kehittyi siis bakteerien ”suhteellisen yksinkertaisesta” järjestelmästä. Mutta: jos tarkemmin tutustuu esimerkiksi purppurabakteerin antennikompleksien ja reaktiokeskuksen rakenteeseen ja toimintaan, ei se vaikuta yhtään sen vähemmän monimutkaiselta kuin kasvien käyttämä fotosysteemi 2; se on vain hieman erilainen. Jos siihen sitten lisätään esimerkiksi vihreiden rikkibakteerien käyttämä tyyppin 1 kaltainen fotosysteemi, on yhteenliittymä tietysti ”kehittyneempi” kuin 1 ja 2 erikseen. Joidenkin mielestä tämä riittää kasvien fotosynteesin evoluution selitykseksi. Esimerkiksi Madiganilla<sup>42</sup> ei ole tarjota mitään kelvollisempaa: Kirja toteaa ensin, että purppurabakteerien fotosynteesin reaktiokeskus muistuttaa syanobakteerien FS 2:ta, vihreiden rikkibakteerien ja heliobakteerien FS 1:tä. Kirjan mukaan on viitteitä siitä, että nämä bakteerit syntyivät jopa 500 miljoonaa vuotta ennen syanobakteereja. On siis ilmeistä, että muuhun kuin veden hajotukseen perustuvat, happea tuottamattomat fotosynteesit kehittyivät jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Syanobakteerit sitten lainasivat ne edeltäjiltään ja kehittivät niistä veden hajotukseen perustuvan, happea tuottavan modernin fotosynteesin.

Tämä ei ole muuta kuin lyhyen peiton jatkamista ompelemalla siihen toisesta päästä leikattu pala, vaikka pala pitäisi saada jostain muualta. Evoluutioteoreetikkojen, säilyttääkseen uskottavuutensa, pitäisi pystyä selittämään mekanismi, jolla purppura- ja rikkibakteerien monimutkaiset fotosysteemit alunperin kehittyivät; **todistamisen taakka on väitteen esittäjällä.**


---

42 Madigan ym., s.590.



Wikimedia, Neveu, Curtis, CC BY-SA 3.0

Syanobakteerin vettä neljän fotonin energialla hajottava fotosysteemi 2. Se on hieman "yksinkertaisempi" kuin kasvien FS2 ja niinpä uskotaan, että kasvien FS2 kehittyi tästä "yksinkertaisesta" systeemistä. Reaktiokeskusta, jossa vesi hajotetaan, ei ole tähän kuvattu, mutta se sijaitsee systeemin keskusalueella. "Kiehkurat" kuvaavat proteiinien alfa-kierteitä, nauhat beetta-levyjä, rihmat laskostumatonta polypeptidiketjua.



Wikimedia, Yikrazuul, CC BY-SA 3.0

Mangaani-kalsium-happi -ryppään muodostama "vedenhajottamo".



Wikimedia, Curtis Neveu, CC BY-SA 3.0

**Syanobakteerin fotosysteemi I.** Sen on siis teorian mukaan täytynyt kehittyä jostain ”yksinkertaisemmasta”, todennäköisesti rikkiä elektronien lähteenä käyttävästä purppurabakteerien systeemistä, koska niiden oletetaan olleen ensimmäisiä fotosynteesiin kykeneviä eliöitä. (Purppurabakteerin systeemistä on kuvat mm. Madiganin kirjassa sivulla 587 eikä se mielestäni ole yhtään sen ”yksinkertaisempi” kuin syanobakteerin FS1.)

## ***Hapen lisääntyminen johti soluhengityksen kehittymiseen (s.104)***

Oliko ”alkuilmakehä” siis hapeton?

*”Ennen hapen lisääntymistä tumattomat eliöt olivat saaneet elintoimintoihinsa vaadittavan energian **käymisreaktioista**, joissa happea ei tarvita. Kaikki tumattomat eliöt olivat toisin sanoen **anaerobisia** eli hapettomissa olosuhteissa eläviä, ja happi oli niille myrkyä. Hapen vapautuminen veteen ja vähitellen ilmaan toimi uudenlaisena valintatekijänä evoluutiossa: tumattomien eliöiden piti joko sopeutua uuteen ympäristöön tai siirtyä hapettomiin olosuhteisiin. Hapellisiin olosuhteisiin sopeutuville kehittyi **soluhengitys**, uusi tapa vapauttaa energiaa. Siinä energiaa vapautuu enemmän solun ja eliön käyttöön kuin ilman happea tapahtuvassa käymisreaktiossa” (s.104).*

Hapen oletetusta ilmaantumisesta alkuilmakehään käytetään komealta kalskahtavaa nimeä ”Suuri Hapetustapahtuma” (GEO: *The Great Oxidation Event*).<sup>43</sup> Sen pitäisi näkyä mm. karbonaattia sisältävissä sedimenteissä, joita evoluution aika-asteikon mukaan syntyi sekä ennen että jälkeen tuon ”tapahtuman”. Näin siksi, että fotosynteesiin perustuvat prosessit sitovat ilman hiilidioksidista enemmän hiilen kevyempää, <sup>12</sup>C-isotooppia kuin raskaampaa <sup>13</sup>C-muotoa: Siksi orgaanisen karbonaatin pitäisi sisältää enemmän hiili-12-isotooppia kuin epäorgaanisen. Fotosynteesin ilmaantumisen jälkeen syntyneiden karbonaattien pitäisi siis sisältää enemmän hiilen kevyttä isotooppia kuin ennen fotosynteesiä. Näin ei kuitenkaan vaikuta olevan, seikka, joka tekee koko ”Suuren Hapetustapahtuman” epäuskottavaksi. Ilmiön selittäminen vaatiikin ”luovaa ajattelua”(kuten muuan *Nature*’n artikkeli toteaa<sup>44</sup>).

43 Madiganin mukaan tämä tapahtui 2,4 miljardia vuotta sitten.

44 Kasting J.F. Ups and downs of ancient oxygen. *Nature* 2006; 443:643-5.

”**Raitaiset** rautamalmit (ikä jopa 3800 miljoonaa vuotta): Piipitoisia raitaisia rautamalmeja (BIF, Banded-Iron Formations) esiintyy laajasti prekambriassa kivilajeissa. Niihin kuuluu erityyppisiä kivilajeja, joissa kaikissa on rautaa ja sertiä. Joissain raitaisissa rautamalmeissa on mikro-organismeja. Niitä löytyy säännöllisin väliajoin kerrostuneista serttijuovista, jotka sisältävät runsaasti rautaoksidia. Tarkkaan katsottaessa näkyy vielä ohuita rautapitoisia ja vähärautaisia mikrojuovia. Niitä sai aikaan leväkukinta rautapitoisessa vedessä, jota aika ajoin pulppusi esiin maan uumenista.

- Vanhimmat tiedossa olevat raitaiset rautamalmit on tunnustettu Länsi-Grönlannin kerroksista, jotka ovat noin 3800 miljoonan vuoden ikäisiä.
- Arkeisen kallioperän raitaiset rautamalmit osoittivat, että varhaisella prekambrialla kaudella oli aktiivisesti toimivia mikro-organismeja. Tämä tukee käsitystä kasvien varhaisesta evoluutiosta” (Brooks, s.110).

Näiden punaraitaisten sedimenttien rautaoksidit ovat yleensä hematiittia ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), joka tunnetaan mm. verikivenä ja punamultana. Jotkut geologit ovat arvioineet, että näihin rautasedimentteihin olisi sitoutunut happea jopa 20 kertaa enemmän kun mitä sitä on nykyilmakehässä.<sup>45</sup> Vanhimmat niistä on siis määritetty 3,8 miljardin vuoden ikäisiksi. Hiljattain (2009) erään Luoteis-Australiasta (Hammersley) löytyneen raitasedimentin iäksi määritettiin 3,46 miljardia vuotta.<sup>46</sup> Jotkut ovat esittäneet, että sen happi olisi peräisin maan pinnan rautapitoisista hydroksidimineraaleista, joita hapettoman ilmakehän voimakas UV-säteily hajotti ajaen vettä pois ja synnyttäen hematiittia. Tämä hematiitti esiintyy kuitenkin yksittäisinä kiteinä, joita ei voi syntyä UV-valon vaikutuksesta. Mutta sitä syntyy helposti, kun merenalaisen purkauksen rautapitoinen aines reagoi kylmän ja happirikkaan veden kanssa. Nämä purkaukset ovat tapahtuneet vähintään 200 metrin syvyydessä, riittävässä paineessa, sillä niissä ei ole merkkejä kaasukuplista. Niissä ei myöskään ole viitteitä maanpäällisestä tulivuoren purkauksesta (tuhkaa, aerosoleja, hienontunutta kiviainesta ym.)<sup>47</sup>

Madigan esittelee ym. Hammersleyn rautasedimenttiä ja selittää, että sen happi on peräisin varhaisten syanobakteerien fotosynteesistä. Kirjan mukaan merissä oli tuolloin paljon raudan ja rikin yhdisteitä ( $\text{FeS}$  ja  $\text{FeS}_2$ ). Fotosynteesillä tuotettu happi reagoi näiden yhdisteiden kanssa ja niistä syntyneet sedimentit ovat näitä raitaisia rautapitoisia sedimenttejä. Ilmakehän happipitoisuus alkoi nousta vasta kun kaikki merien rauta oli hapetettu, eli evoluution aikajaksoissa mitaten n. 2,4 miljardia vuotta sitten. Madiganin mukaan syanobakteerit ilmestyivät meriin vasta 2,7 miljardia vuotta sitten.

45 Oard M: Did the early Earth's atmosphere contain oxygen? *Journal of Creation* 24(1):13-14, 2010, (Oard on meteorologi).

46 Hoashi ym. Primary hematite formation in an oxygenated sea 3.46 billion years ago. *Nature Geoscience* 2(4):301-6, 2009.

47 *Ibid.* (Hoashi 2009).

Tämä siis tarkoittaa sitä, että kaikkien valtamerien vesi kaikkialla oli rautapitoista. Silloin myös raitaisia rautasedimenttejä pitäisi löytyä kaikkien merien pohjilta tasaisina kerrostumina. Näin ei kuitenkaan ole. Jokin tässä siis mättää: Madigan ilmeisesti olettaa, että esimerkiksi yllä mainittu Hammersleyn esiintymän ikä on korkeintaan tuo 2,7 miljardia vuotta. Kuitenkin, kirjan ilmestymisvuonna 2009, esiintymän iäksi oli määritetty ym. 3,46 miljardia vuotta. Grönlannin esiintymät oli jo aikaisemmin määritetty 3,8 miljardin vuoden ikäisiksi. Ja geologien mielestä maan pinnan kivilajit olivat alkaneet jäähmettyä nykyiseen muotoonsa ja oloonsa vasta 3,9–4 miljardia vuotta sitten. Ja jos näihin rautasedimentteihin on sitoutunut happea jopa 20 kertaa enemmän kuin mitä sitä on nykyisessä ilmakehässä, en lainkaan ymmärrä evoluutioteoreetikkojen väitteitä hapettomasta ”alkuilmakehästä”. Jos happea oli merivedessä runsaasti jo 3,8–3,5 miljardia vuotta sitten, miten sitä alkoi päästä ilmakehään vasta yli tuhat miljoonaa vuotta myöhemmin?

Parempi selitys taitaa olla, että merenalaisten purkausten rautapitoinen aines reagoi kylmän ja happirikkaan veden kanssa synnyttäen raitaisia sedimenttikerrostumia sinne tänne eikä siis tasaisesti kaikkien ”muinaisten merien pohjiin”. Happi tietysti on voinut olla ainakin osittain peräisin syanobakteerien fotosynteesistä.

Geologia ei siis tue oppikirjojen väitteitä hapettomasta alkuilmakehästä. Ajatus lienee syntynyt joskus 1900-luvun alkupuolella niiden mielessä, jotka alkoivat spekuloida jostain alkuliemestä ja kemiallisesta evoluutiosta. He tiesivät, että ilmakehän tai ”alkuliemen” happi olisi hapettanut eli pilannut mahdollisen salamoinnin ja UV-säteilyn synnyttämät pienet orgaaniset molekyylit. Tämä on siis naturalistisen maailmankatsomuksen pohjalta syntynyt hypoteesi. Mitään tieteen havaintoihin perustuvia syitä hapettomuudelle ei näyttäisi olevan.

## **Aerobisen, happeen perustuvan soluhengityksen evoluutio?**

Toistan yllä mainitun väitteen:

} *Hapellisiin olosuhteisiin sopeutuville kehittyi soluhengitys (s.104).* }

Miten ”kehittyi”? Kukaan ei tiedä; todistamisen taakka olisi taas väitteen esittäjällä. Happeen perustuva soluhengitys, jossa sokeri hajoaa takaisin vedeksi ja hiilidioksidiksi, on paljon vaikeampi kuin hapeton käyminen. (Happeen perustuvasta soluhengityksestä muutama sana sivulla 50.)

**Soluhengitys on erittäin monimutkainen prosessi. Kukaan ei tiedä miten se olisi ”kehittynyt”.**

## ***Tumallinen solu syntyi tumattomien solujen sulautuessa yhteen (s.104)***

*”Tumallinen solu on paljon suurempi kuin tumaton solu, ja sen sisällä on enemmän erilaisia soluelimiä. Tumallisen solun arvellaan kehittyneen siten, että jotkin pehmytseinäiset arkeonit ja bakteerit sulautuivat yhteen. Näin perintöaineksen, DNA:n määrä kasvoi suureksi, ja sen ympärille muodostui suojaava rakenne eli **tumakotelo**. Sitten tämä kookas isäntäsolu nielaisi pieniä kovaseinäisiä bakteerisoluja, jotka eivät hajoneetkaan sen sisällä, vaan kehittyivät soluelimiksi.*

*Tätä **endosymbioosiksi** kutsuttua teoriaa perustellaan sillä, että kaksi nykyisten tumallisten solujen soluelintä, **mitokondriot** ja **viherhiukkaset**, muistuttavat monin tavoin bakteereita. Ne muun muassa pystyvät lisääntymään itsenäisesti jakautumalla, ja niissä on omia geenejä” (s.104).*

[Noiden pehmytseinäisten arkeonien ja bakteerien piti siis molempien olla anaerobisia. Myös niiden liitosta syntyneen suurikokoisen ”isäntäsolun” (”esiaitotumainen”) piti olla anaerobinen. Mutta ”pienien kovakuoristen bakteerien”, jotka nieltiin, piti olla aerobisia.]

Samalla sivulla kerrotaan vielä selvennykseksi kuvin ja sanoin, miten tuohon kuvitteelliseen anaerobiseen, ”esiaitotumaiseen” isäntäsoluun tunkeutui aerobiseen soluhengitykseen kykenevä bakteeri, josta kehittyi mitokondrio. Viherhiukkanen syntyi kun tähän hybridisoluun tunkeutui vielä fotosynteesiin kykeneviä syanobakteerejakin. Siitä kehittyi viher-, rusko- ja punaleviä ja niistä edelleen kasveja. Ilman viherhiukkasia jääneistä soluista kehittyivät sienet ja eläimet. (Jo lähtökohtahypoteesi vaikuttaa ristiriitaiselta: Anaerobisen ja aerobisen bakteerin liitto?)

Oppikirjan sivulla 110 on tähän liittyvä pohdiskelutehtävä:

*”Mikä seikat puoltavat teoriaa, jonka mukaan mitokondriot ja viherhiukkaset ovat kehittyneet itsenäisinä elävistä bakteereista?”*

Mutta: Onko poliittisesti epäkorrektia esittää myös päinvastainen kysymys:

**”Mikä seikat puhuvat sitä vastaan, että mitokondriot ja viherhiukkaset olisivat kehittyneet itsenäisinä elävistä bakteereista?”**

Niin tai näin, seikkoja, jotka eivät puolla sitä, että mitokondriot ja viherhiukkaset olisivat kehittyneet bakteereista, on enemmän kuin niitä, jotka puoltavat.

Ensin tärkeimmät seikat, jotka näyttäisivät puoltavan endosymbioosihypoteesia:

1. Mitokondriot ja viherhiukkaset (kuten bakteeritkin) syntyvät vain kaltaistensa jakautumisen tuloksena. Huomaa, että **solu ei pysty rakentamaan uusia soluelimiä kuten mitokondrioita, jos ne katoavat**. (Pelkkä DNA ei siis pysty rakentamaan soluelimiä; väite DNA:sta ”elämän piirustuksina” on harhaanjohtava – ”piirustukset” ovat siis muualla – mutta missä?)



2. Mitokondrion ja viherhiukkasen kaksoiskalvo synnyttää *vaikutelman* solun sisään tunkeutuneesta pienemmästä solusta. Tällöin ulkokalvo olisi syntynyt vastaanottavan solun plasmamembraanin invaginaatiosta (sisään kuroutumisesta).
3. Mitokondrion ja viherhiukkasen, kuten bakteerinkin DNA on rengasmainen ja paljas, eikä siis ole proteiineihin kuten histoneihin sidottua (kuten aiotumaisten kromosomeissa).
4. Mitokondrioilla ja viherhiukkasilla on jonkin verran omaa proteiinisynteesikoneistoa, jonka osat kuten ribosomit, tRNA ja RNA-polymeraasit muistuttavat bakteerien vastaavia.
5. Mitokondrioiden ja viherhiukkasten ribosomaalinen RNA muistuttaa bakteerien vastaavaa.
6. Mitokondriot reagoivat muutamiin antibiootteihin.
7. Bakteereja elää symbioosissa monien aiotumaisten eliöiden solujen sisällä (esimerkiksi termiitit ja hernekasvit). (Ei ole kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että jotkut niistä olisivat kehittyneinä mitokondrioiksi; niillä on muita tehtäviä.)

Mitokondrioilla ja viherhiukkasilla on omia geenejä monestakin syystä. Mitä mitokondrioihin tulee, yksi syy on se, että ne käyttävät osittain erilaista geneettistä koodia (aminohappokodonia) kuin tuman geenit. Esimerkiksi ihmisellä neljällä aminohapolla (20:stä) on mitokondrioissaan eri koodi kuin tumassa. (Eri lajeilla on erilaisia koodin muunnelmia.) Siksi tarvitaan myös erilaiset siirtäjä-RNAt. Miksi koodi on erilainen? Siihenkin näyttää löytyneen syy, mutta en käsittele sitä tässä.

Muuttunut koodi aiheuttaa endosymbioosihypoteesille melkoisen ongelman, sillä koodin muutos on periaatteessa tulella leikkimistä. Toinen syy vaikuttaisi olevan se, että sekä mitokondrion että viherhiukkasten erikoisrakenteiset kalvot tarvitsevat muutamia erittäin hydrofobisia eli vettä hylkiviä proteiineja. Niiden synteesi ja siirto vetisestä sytoplasmasta saattaisi olla vaikeaa.

Eläinten mitokondrioiden DNA:t sisältävät melko tarkkaan 16 600 emäsparia, joidenkin kasvien jopa 300 000. Maakasvien viherhiukkasten DNAt ovat 70 000–200 000 emäsparin suuruisia. Mutta: ”vapaiden” bakteerien, joista niiden piti syntyä, genomit ovat paljon, erittäin paljon suurempia, tavallisesti 3–7 miljoonaa emäsparia (Mb) ja sisältävät useamman tuhat geeniä. Esim. *E. colilla* DNA:ta on noin 4,5–5,5 Mb ja geenejä noin 4500. (Solun sisäisillä parasiiteilla, kuten riketsioilla on pienemmät genomit, noin 1 Mb, mutta ne ovat tässä tapauksessa poissuljetut.) Miksi, miten ja mihin nämä bakteereista kehittyneet soluelimet hävittivät lähes kaiken geneettisen materiaalin?


Hypoteesin mukaan ne siirsivät geeninsä tumaan. Jos, niin mitkä geenit? Kukaan ei tiennyt, mutta niin vain väitettiin. Ja myöhemmin hypoteesi saikin pientä tukea havainnoista, joiden mukaan sekä bakteereilla että aiotumaisilla on joitain yhteisiä geenejä. Tässä ei kuitenkaan ollut mitään kovin mullistavaa; totta kai niitä on – jonkin verran: noin 500 geeniä vaikuttaisi olevan universaalisia, ”kuolemattomia” syystä, että *kaikki*, sekä esi- että aiotumaiset tarvitsevat niitä. Mutta mihin ne muut tuhannet geenit noin vain häipyivät?

Huomaa, että endosymbioosihypoteesi syntyi yli 50 vuotta sitten (1967), aikana jolloin geenitutkimus oli lapsenkengissään. Silloin, kun juuri mitään ei tiedetty, oli helppoa esittää kaikenlaisia kuvitteellisia skenaarioita uskossa, että siirtogeenit löytyvät. Näin ei kuitenkaan ole käynyt: Hypoteesin suosituimman version mukaan nuo niellyiksi joutu- neet ”pienet kovaseinäiset bakteerisolut”, joista piti tulla mitokondrioita, olisivat olleet proteobakteereja<sup>48</sup>. Mutta nyt kun genomien tutkimuksista (DNA-sekvensointi) on tullut halpaa ja nopeaa, proteobakteerien geenejä ei juurikaan ole löytynyt sen kummemmin mitokondrioista kuin tuma-DNA:sta: Esimerkiksi erään v. 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan mitokondrioiden tarvitsemat proteiinit eivät juurikaan muistuta proteobakteerin proteiineja (ja geenejä).<sup>49</sup> Korkeintaan 10–20% mitokondrioiden geneeistä muistutti edes jollain tavalla proteobakteerien geenejä. Samalla tutkija totesi, että mitokondriot eivät vaikuta juurikaan kehittyneen: yksisoluisilla aiotumaisilla, kuten hiivalla, mitokondriot ovat yhtä ”kehittyneitä” kuin monisoluisilla.

Jos yksityiskohdat jätetään huomiotta, tai jos niitä ei juurikaan tunneta (kuten hypo- teesin syntyäikoihin), voi endosymbioosi ”suurissa ja suurpiirteisissä puitteissa” joidenkin mielestä vaikuttaa uskottavalta. Näin mm. siksi, että kaukaa ja hämärässä katsottuna mitokondriot ja viherhiukkaset ovat ehkä suurin piirtein samannäköisiä kuin jotkut bakteerit. Kuitenkin, jos mentäisiin yksityiskohtiin, aiheesta voitaisiin tehdä kokonainen kirja: Samankaltaisuuksiakin toki on, mutta eroavaisuuksia on paljon enemmän. Alla pari esimerkkiä:

Kaikkien kolmen eliöryhmän (bakteerit, arkeonit ja aiotumaiset) solukalvot (ulko- ja sisäkalvot) ovat *rakenteeltaan* samankaltaisia, mutta *kemialtaan* hyvin erilaisia. Esitu- maisten kalvoista puuttuu aiotumaisille ominainen ja tärkeä kolesteroli. Esitumaiset eivät kykene monimutkaiseen kolesterolisynteesiin. Niiltä puuttuvat myös glykoproteiinit ja proteoglykaanit eli kalvomolekyylit, joissa on proteiini- ja sokeriosia, jotka ovat vält- tämättömiä monisoluisien eliöiden solujen välisessä viestinnässä. Mitä tumakoteloon tulee, se koostuu *kahdesta päällekkäisestä*

lipidikaksoiskalvosta ja sitä pitää koossa sisemmän kalvon sisäpintaa ver- hoava lamiiniproteiinien verkko. Verkko toimii mm. kromatiinin kiinnittymisalustana silloin kun DNA:ta transkriptoidaan lähetti-RNA:ksi. (Lähetti-RNA syötetään saman tien ulos kotelossa olevan tumahuoko- sen kautta; transkriptio tapahtuu ”portilla”.) Miten esitumainen solu oppi valmistamaan lamiiniverkkoa?



Wikimedia, National Human Genome Research Institute

**DNA-transkriptio RNA:ksi.**

48 Proteobakteerit ovat suurin aerobisten bakteerien ryhmä.

49 Gray V.M. Mosaic nature of the mitochondrial proteome. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112(33):10133-10138, 2015, doi: 10.1073/pnas.1421379112.

Endosymbioosihypoteesin erään muunnelman mukaan jokin tuntematon (mutta suurikokoiseksi tiedetty) pehmeäseinäinen, anaerobinen arkeoni siis sulautui yhteen ensin anaerobisen bakteerin kanssa, jolloin hybridin genomi kasvoi ja syntyi ”esiaitotumainen” solu. Sitten se nieli ”kovakuorisen” *aerobisen* bakteerin, joka ilmeisesti oli jo ehtinyt kehittää tehokkaan hapella toimivan soluhengityksen (Krebsin syklin?). Sitten jotkut sen jälkeläisistä ”ottivat sisäänsä” syanobakteereja ja niistä kehittyi viherhiukkasia – tai ne *taantuivat* viherhiukkasiksi.

Erään toisen muunnelman mukaan tuo ensimmäinen ”esiaitotumainen” nielikin ensin syanobakteerin ja vasta sitten aerobisen. Kolmannen version mukaan jotkut esiaitotumaiset olisivat nielleet molemmat yhtä aikaa...

Ennen aitojen aitotumaisten syntyä oli siis anaerobisia ”esiaitotumaisia hybridejä”. Mutta piti olla olemassa myös happea ja sokeria tuottavia syanobakteereita, koska muuten ei olisi voinut olla mitokondrioksi muuttuvia, hapelliseen soluhengitykseen (Krebsin sykliin?) kykeneviä aerobisia ”pieniä kovaseinäisiä” bakteereja. Näin olen asian ymmärtänyt.

## Aerobisen ja anaerobisen liitto – mahdoton yhtälö?

Sekä valoon perustuva energian talteenotto (sokereihin) että tallennetun energian happeen perustuva hyödyntäminen, tuottavat siis vaarallisia happiyhdisteitä. Ja erikoisen vaarallisia ne ovat anaeroebeille. Näinhän oppikirjammekin toteaa: ”Kaikki tumattomat eliöt olivat toisin sanoen **anaerobisia** eli hapettomissa olosuhteissa eläviä, ja happi oli niille myrkkä.”<sup>50</sup> Miten siis oletettu anaerobinen ”esiaitotumainen” pystyi ottamaan sisäänsä myrkyllistä happea, jotta sen nielemä aerobinen bakteeri olisi saanut sitä soluhengitystään varten? Miten se neutraloi kaappaamansa aerobisen bakteerin tuottamat happiradikaalit? (Happiradikaalikuonaa karkasi varmasti myös isäntäsolun puolelle?) Sillä tuskin oli varastossa varmuuden vuoksi valmiita antioksidantteja kuten superoksididismutaasia. Niistähän olisi ollut pelkkää haittaa ja eihän evoluutio edes osaa ennakoida. Tähän en ole kenenkään havainnut ottavan kantaa.

Entä happeen perustuva soluhengitys? Miten se kehittyi anaerobisesta systeemistä eli käymisestä, jonka hyötysuhde on alhainen? Soluhengityksen ensimmäisessä (anaerobisessa) vaiheessa sokereja tai rasvahappoja hajotetaan ensin palorypälehapoksi (pyruvaatti), jolloin saadaan hieman energiaa (ATP, NADPH). Mutta jos happi puuttuu, muodostunut NADPH ei voi hapettua takaisin NADP:ksi muuta kuin pelkistämällä syntyneen palorypälehapon maitohapoksi eli puolittain palaneeksi yhdisteeksi, jonka solu joutuu erittämään ulos, jottei se myrkyttyisi.

Mutta jos käytössä on happeen perustuva hengitys (Krebsin sykli), palorypälehapo ohjataan eteenpäin ja ”poltetaan” monimutkaisessa, ATP:tä tuottavassa molekyylikoneistossa, jossa vapautuneet elektronit siirretään lopuksi hapelle, joka palaa vedeksi. Mistä syklissä tarvittavat kahdeksan entsyymiä kuten monimutkainen isositraattidehydrogenaasi tulivat?

50 Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät olleet ns. fakultatiivisesti eli vaihtoehtoisesti, vaan välttämättömästi anaeroebeja (pakollinen anaerobia). Happi siis oli niille todellista myrkkä. Pelätty kaasukuoliobakteeri, *Clostridium perfringens* on pakollinen anaerobi. Kaasukuolion hoidon kulmakivi onkin ylipainehappihoito (kirurgisen revisiion ohella).


## Mitokondriolla on muutakin tekemistä kuin energian tuotanto

Bakteerista kehittyneen mitokondrion piti oppia tekemään paljon muutakin kuin polttamaan sokeria: Sen piti oppia muuntamaan aminohappojen hajotessa syntyvä myrkyllinen ammoniakki ureaksi. Mitokondrion piti oppia ottamaan osaa rasvahappojen ja steroidien (kuten kolesterolin) synteesiin<sup>51</sup> sekä oppia säätelemään solun kalsiumtasapainoa. Mitokondrion pitää osata valmistaa myös tärkeitä rauta-rikkiryppäitä, jotka pitävät yllä kromosomien vakautta. Jos mitokondrio toimii tässä suhteessa huonosti, sen isäntä voi muuttua syöpäsoluksi. Ja sitä paitsi mitokondrio ei vaikutakaan olevan mikään yksittäinen soluelin, vaan se on fyysisesti linkittynyt/kanavoitunut endoplasmiseen kalvostoon, jonka kanssa se toimii yhteistyössä. Puheet mitokondriosta ”kehittyneenä bakteerina” ovat pötyä.

Entä viherhiukkanen, kloroplasti? Se tuskin ”kehittyi” syanobakteerista. Molemmat tosin pystyvät fotosynteesiin, mutta ovat sekä rakenteeltaan, kemialtaan että geeneiltään kovin erilaisia. Kalvot tosin, kuten jo totesin, ovat perusrakenteeltaan samankaltaisia, mutta kemialtaan kovin erilaisia: Syanobakteereilla on gram-negatiivisten bakteerien tapaan aitotumaisista *merkittävästi poikkeava* ulkokalvo. Ulkokalvon ja varsinaisen plasmamembraanin välissä sijaitsee soluseinä, peptidoglykaanikerros, joka on jäykkää ja tiheäsilmäistä polymeeriverkkoa. Monien bakteerien sisällä vallitsee korkea osmoottinen paine, joka voi vastata jopa autonrenkaan ilmanpainetta. Ilman soluseinää bakteeri saataisi räjähtää. Miten syanobakteerin soluseinä/kalvo-rakenne muuttui viherhiukkasen kolesterolia sisältäväksi pehmeäksi, kaksinkertaiseksi solukalvoksi?

Viherhiukkasista puuttuu syanobakteereille ominaiset ikosaedrin<sup>52</sup> muotoiset partikkelit, *karboksosomit*, joiden pinnalle hiilidioksidia ilmasta sitovat rubiscoentsyymit on sijoitettu. Tämä tehostaa niiden fotosynteesiä. Miksi viherhiukkanen luopui niistä? Niitä onkin yritetty siirtää kasveihin, jotta ne saataisiin kasvamaan nopeammin. Tämän alan hyvin hallitseva voisi varmaan laatia kokonaisen kirjan syanobakteerien ja viherhiukkasten eroista?


**Mitokondrion yksityiskohdat paljastavat, että sillä ja bakteereilla on paljon eroavaisuuksia kuin yhtäläisyyksiä.**



Wikimedia, Mariana Ruiz, B. Nuhnen.


51 Bakteerit, joista mitokondrion piti kehittyä, eivät siis taida kolesterolisynteesiä.

52 Ikosaedri on rakenne, jossa on 12 kulmaa ja 20 identtistä, tasasivuista kolmiota.



Wikimedia, Kelvinsong, CC BY-SA 3.0

Syanobakteeri (kansankielellä "sinilevä"), josta viherhiukkasen piti endosymbioositeorian mukaan "kehittyä". Erot niiden välillä ovat kuitenkin "huolestuttavat" ainakin siinä mielessä, että teoria ei kykene selittämään niiden syntyä; todetaan ainoastaan, että "evoluutio sen teki" (=evoluution aukkojen jumala). Syanobakteeria ympäröi ensin limakerros (slime coat), sitten kapseli, sitten toisenlainen limakerros (mucoid sheat). Viherhiukkasella ei ole mitään näistä. Kaksinkertaisen solukalvon (joka ei sisällä aiotumaisille tärkeää kolesterolia) välissä on luja sokereiden ja aminohappojen muodostama polymeeri, peptidoglykaaniverkko, jota sitäkin viherhiukkasella ei ole. Näin siksi, että solun sisäisen viherhiukkasen pitää olla "avoimempi" eli jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa emosolunsa kanssa kun taas syanobakteerin seinämien ja kalvojen täytyy suojata isäntäänsä ulkomaailman vaaroilta. Kuvan vasemmassa ylänurkassa oleva phycobilisome (suom. fykobilisomi) on tylakoidien lamelleilla sijaitseva puolipallomainen, valoenergiaa keräävä rakenne, jota sitäkin ei kasvien viherhiukkasista löydy. Niin kuin ei myöskään ikosaedrin muotoisia karboksosomeja, joiden pinnalla sijaitsevat rubiskot eli entsyymit, jotka liittävät ilman hiilidioksidin 5-hiiliseen alkusokeriin.



Wikimedia, SuperManu, CC BY-SA 3.0

Kasvin viherhiukkanen

- 1: Ulkokalvo  
2: Kalvojen välinen tila  
3: Sisäkalvo  
4: Strooma

- 5: Tylakoiditaskun sisätila  
6: Tylakoidikalvo  
7: Tylakoiditaskujen "pinoja"  
8: Tylakoidilamelleja

- 9: Tärkkelyshiukkasia  
10: Ribosomeja  
11: Rengasmaista "kromosomia"  
12: Rasvapisara

## Kromosomit ja ”kromosomit”

Esitumaisten ”kromosomit” koostuvat *rengasmaisesta, yksinkertaisesta* DNA-kaksoiskierreestä. Aitotumaisten kromosomit ovat lineaarisia, monimutkaisia rakenteita. Vaikka bakteeri ja arkeoni olisivatkin sulautuneet yhteen ja niiden rengasmaisen DNA olisi katkennut muutamaksi lineaariseksi rihmaksi, olisi se vielä kaukana aitotumaisten kromosomeista: Aitotumaisten perimä koostuu *parillisista* DNA-kaksoiskierre-rihmoista, jotka yhdessä histonien ja muiden proteiinien kanssa muodostavat kromosomeja. Kromosomeissa DNA-rihmat on kelattu proteiinien ympärille erittäin tiiviisiin rakennelmiin. Tiiviimmillään DNA on pakattu 10 000-kertaisesti, jolloin sentti DNA-nauhaa lyhenee yhteen mikrometriin. Esitumaisilla yksinkertaisen DNA-rihman kelaus on paljon löysempi (noin 500-kertainen) ja siitä vastaa mm. gyraasi-niminen entsyymi<sup>53</sup>, jota aitotumaisilla ei ole.

Esitumaisilla ei myöskään ole *telomeereja*, koska niiden DNA on rengasmaisen.<sup>54</sup> Telomeerit ovat *kaikkien* aitotumaisten kromosomien päissä esiintyviä, useita satoja tai tuhansia kertoja toistuvia DNA-jaksoja (lähes aina TTAGGG) *sekä niihin liittyviä erikoisproteiineja*. Telomeerit suojaavat ja vakauttavat kromosomien päitä siten, että toistuvat DNA-jaksot yhdessä erään monimutkaisen proteiinikompleksin kanssa muodostavat telomeerin terminaaliosaan *yksisäikeisen* ns. D-silmukan. Se estää kromosomeja liimaantumasta toisiinsa erityisesti solun jakaantumisen aikana (mikä voisi johtaa solun kuolemaan).

Esitumaisilla ei myöskään ole aitotumaisten kaltaista monimutkaista solutukiranjärjestelmää (engl. *cytoskeleton*), mikä muodostuu mikrotubuluksista, mikrosäikeistä ja välimuotoisista säikeistä. Tukiranka pitää yllä solun muotoa sekä toimii viesti- ja tieverkostona, jota pitkin ”trukit”, kuten kinesiini- ja dyneiini-nimiset molekyylikoneet kuljettavat aineenvaihduntatuotteita.

Toisaalta jotkut esitumaiset saattavat joissain suhteissa olla aineenvaihduntansa puolesta ylivoimaisia aitotumaisiin verrattuina. Esimerkkinä vitamiineista monimutkaisin, B12, jota aitotumaiset eivät pysty syntetisoimaan. B12:n puute aiheuttaa mm. anemiam ja hermoston toimintahäiriöitä.

Kaikki aitotumaiset ovat riippuvaisia esitumaisista, mutta sama pätee myös päinvastoin – tai ainakin melkein – esitumaiset ovat riippuvaisia aitotumaisista. Syanobakteerit saattaisivat pärjätä omillaankin (?), mutta monet muut eivät – eivät ainakaan ilman viruksia. Viruksia en tässä aio käsitellä; totean vain, että elämä on niistä täysin riippuvaista. Ne mm. ylläpitävät bakteereille tärkeää horisontaalista geenisiirtoa ja pitävät huolen siitä, että vesistöjen bakteerit eivät saa ylivaltaa, jotta järvien ja merien pinnat eivät muuttuisi pelkäksi sinileväpuuroksi. Mutta mistä virukset tulivat? Niitä ei voi olla olemassa ilman soluja. Mutta jos oli soluja, kuten bakteereja ennen viruksia, mikä sääteli niiden populaatioiden kokoa?

Yli 50 vuotta sitten keksitty endosymbioosi taitaa olla aikansa elänyt.

53 DNA-gyraasi on kinoloni-antibioottien vaikutuskohde. Jos sen geeniin tulee sopiva pistemutaatio, antibiootti ei enää voi kiinnittyä gyraasiin. Tällöin bakteeri tulee ko. antibiootille resistentiksi.

54 Tästä on muutamia poikkeuksia, kuten *Streptomyces* ja *Borrelia*. Niiden telomeerit ovat aitotumaisiin verrattuina kuitenkin hyvin erilaisia muodostuen joko proteiineista tai hiuspinnan kaltaisesta yksijuosteisesta DNA:sta.

## Monisoluisten eliöiden alkuperän mysteeri

Sivun 105 kuvassa esittäytyy viherlevien muodostama *Volvox*-yhdyskunta, joka koostuu itsenäisistä soluista, mutta joiden välillä on jonkin verran työnjakoa. Tarinan mukaan työnjako kehittyi myöhemmin niin pitkälle, että solut eivät enää selviytyneet ilman toisiaan. Näin oli kehittynyt **alkeellinen monisoluinen eliö**:


*”Ensimmäiset todisteet monisoluisuudesta ovat 700 miljoonan vuoden takaa. Monisoluisia eliöitä oli ilmeisesti ollut aikaisemminkin, mutta ne eivät vielä olleet menestyneet kilpailussa yksisoluisien kanssa. Monisoluisilla eliöillä oli useita tärkeitä kilpailuetuja yksisoluisiin nähden. Koska monisoluisten eliöiden solut kykenivät **erikoistumaan** ja toimimaan eri tavoin, niiden elintoiminnot olivat tehokkaampia kuin yksisoluisien.”*

*Volvox* on sopiva aasinsilta yksisoluisista ”alkeellisiin” monisoluisiin; se on kuin Darwinin havaitsema lajien sopeutumismuuntelu: Jotkut Darwinin ajan luonnonfilosofit väittivät kivenkovaan (mukamas luomiskertomukseen vedoten), että lajit on luotu *muuttumattomiksi*. Darwin kuitenkin teki aivan oikean havainnon: lajit (kuten koirat ja Galápagosin sirkut) eivät olekaan pysyviä, vaan muuntelevat. Tästä hän kuitenkin teki perusteettoman ekstrapoloinnin eli laajennuksen: jos jokin muutos on mahdollinen, silloin mikä tahansa muutos on mahdollinen – kunhan aikaa on riittävästi. Samoin tekee BIOS 1: se ekstrapoloi *Volvoxin* kasviin ja eläimiin. Oletettu ”kehitys” vain todetaan ikään kuin tapahtuneena tosiasiana ilman minkäänlaisia varauksia. Näin siksi, että hypoteesin kriittinen arviointi kaataisi sen jo alkumetreilleen:

Miten saada solut pysymään yhdessä, jotta ne voisivat muodostaa kudoksia ja elimiä? Kasvisoluja liimaa yhteen mm. ligniini, joka on mutkikas fenoliyhdiste ja muodostaa yhdessä selluloosan kanssa suurimman osan puiden massasta. Kun bakteerit ja arkeonit eivät kumpikaan pysty ligniinisynteesiin, miten niiden fuusioista syntynyt ”esiaitomainen” olisi siihen pystynyt? Ligniinisynteesikoneiston piti kuitenkin olla valmiina jo silloin, kun jotkin endosymbioosista syntyneet yksisoluiset alkoivat ”suunnitella” yhteenliittymistä. Entä kollageeni, joka soluväliaineen tukiverkkona pitää eläinten kudokset ja elimet koossa? Kollageenisynteesi on monimutkainen prosessi, joka puuttui monisoluisten esi-isiltä.

Ligniini- ja kollageenisynteesi vaativat rutkasti uusia geenejä. Mistä ne tulivat? Evoluutionistien mukaan ne syntyivät aikaisempien geenien kahdentumina. Albertsin mukaan geenit ovat kuitenkin aina syntyneet aikaisemmista geeneistä: ”*Ei ole olemassa minkäänlaisia luonnollista keinoa valmistaa [tyhjästä] täysin uusia ja pitkiä, emäsjärjestykseltään vapaita, sattumanvaraisia sekvenssejä. Siinä mielessä mikään geeni ei ole täysin uusi*” (s.16). Uudet geenit (tai geeniyhdistelmät) saadaan joko 1) jakamalla vanhoja geeniyhdistelmiä uudella tavalla (suvullinen lisääntyminen), 2) lainaamalla niitä muilta (horisontaalinen geenisiirto, jota tapahtuu lähinnä vain esitumaisten kesken), 3) mutatoimalla vanhoja geenejä uuteen asuun tai 4) geenien tai niiden osien kahdentumisien kautta, jolloin mutaatioiden uskotaan muuntavan kopiot vähitellen uudennlaisiksi, *toiminnallisiksi* geeneiksi. Kaksi ensin mainittua eivät kuitenkaan toimi ”kehittävinä” mekanismeina, sellaisina, jotka luovat *uutta informaatiota* ja saisivat siten aikaan uudennlaisia rakenteita ja ominaisuuksia. Mitä geenien kahdentumiin tulee, totean vain, että sekä alkuperäinen

että kopiogeeni mutatoituvat samaan tahtiin ja nopeammin kuin yksittäinen geeni. Näin siksi, että ne toimivat toistensa ”varmuuskopioina”, jolloin luonnonvalinnan ote löystyy eivätkä haitalliset mutanttialleelit karsiudu entiseen tapaan. Mitä taas vanhojen geenien mutatoitumiseen tulee, muistutan, että käytännössä kaikki mutaatiot ovat joko haitallisia tai neutraaleja, ehkä yksi sadasta tuhannesta tai miljoonasta saattaa olla jollain tavalla hyödyllinen joissain erikoisolosuhteissa. Eikä sekään auta evoluutiota, koska kaikkia eliöitä koskee geneettisen informaation rappeutuminen – geneettinen entropia.



Wikimedia, Karol Glab, Karol007, (CC BY-SA 3.0)

**Esimerkki ligniinistä, joka on kasvisoluja yhteen liimaava mutkikas fenoliyhdiste. Fenoli on 6-hiilinen bentseeni-rengas, aromaattinen alkoholi, jonka yhdisteitä kasvit tuottavat myös mm. torjuakseen tuholaisia.**



## **”Elämän piirustukset” on taltioitu jättikokoiseen munasoluun, geenien ulkopuolelle. Geenikeskeinen ”moderni” synteesi/evoluutioteoria on kuollut.**

Ihmisellä on noin 300 erilaista, toisistaan merkittävästikin poikkeavaa solutyyppeä. Jokainen niistä tarvitsee omanlaisiaan raaka-aineita ja niitä varten pitää olla reseptit eli geenit. Geeneistä ei kuitenkaan löydy monisoluisten eliöiden ruumiinkaavaa eikä anatomiaa, vaan ne on koodattu geenien ulkopuolelle *munasoluun*, sen soluelimiin ja mikroarkkitehtuuriin. Kolmen ruokalajin illallisen valmistamiseksi ei riitä luettelo tarvittavista elintarvikkeista. Eikä lihassolun valmistamiseksi riitä pelkkä aktiini- ja myosiinimolekyylien DNA:han koodatut aminohappojärjestykset. – Elämän piirustukset löytyvät siis munasolusta, ei DNA:sta:

”Monilla on yhä se virheellinen usko, että DNA:ssa on kielellinen kuvaus, täydelliset ’Elämän kirjan piirustukset’, jotka yksityiskohtaisesti määrittävät eliön kehityksen. Kuten Woodward ja Gills hiljattain kirjoittivat: ’Tämä on shokkien shokki: DNA yksin ei näyttele pääosaa--- on väärin ajatella, että DNA tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten eliö kootaan.’ Oyama (2002) totesi, että ’geeni aloittaa jonkun tapahtumasarjan vasta, jos jossain muualla on niin päätetty: geenillä ei ole mitään energeettistä erikoisasetmaa fyysisten interaktioiden virran ulkopuolella’ ja että ’geenin transkriptio ja translaatio eivät millään tavalla sisällä ohjeita toiminnallisen ruumiin rakentamiseksi’ (s.69). Hän mainitsi – aivan oikein – että organisin määrittävät ohjeet peritään jo valmiiksi toiminnallisina soluina ja ’samanlaisessa ympäristöviitekehityksessä kuin sen vanhemmat’ (in a similar environmental context as the parent)”<sup>55,56,57</sup>

Johnson, *The Living World* toteaa mm.:

”Tsygootti (hedelmöittynyt munasolu) jakaantuu ensin nopeasti moneksi soluksi ilman että sen koko kasvaa. Nämä solunjakautumiset vaikuttavat tulevaan kehitykseen, sillä kukin solu saa munasolun sytoplasmasta erilaiset osat ja täten erilaiset säätelysignaalit” (s.667, McGraw Hill, 2006).

55 Truman R.: Cells as Information Processors, Part I: *Formal Software Principles*, *Creation Research Society Quarterly* 52:275–308, 2016.


56 Woodward, T.E., and J.P. Gills, *The Mysterious Epigenome: What Lies Beyond DNA*, 2012, Kregel Publications, Grand Rapids, MI. Viitattu lähteessä: Truman R, 2016.

57 Oyama, S. *The Ontogeny of Information: Developmental Systems and Evolution*, 2<sup>nd</sup> ed., 2002, Duke University Press, Durham, NC. Viitattu lähteessä: Truman R, 2016.


Ihmisruumiin arvellaan koostuvan noin 37 biljoonasta solusta ja 300 solutyypistä. Kun hedelmöittynyt munasolu alkaa kehittyä, se jakaantuu ensin noin 300 pienemmäksi soluksi ilman että tsygootin koko juurikaan kasvaa (morula- ja blastula-vaihe). Jokainen näistä soluista vastaa jotain tulevan aikuisyksilön 300 erilaisesta solutyypistä. Aluksi tsygootin kaikki omat geenit on kytketty pois päältä ja vasta muutaman solunjakaantumisen jälkeen niitä ruvetaan ottamaan vähitellen käyttöön. Tänä aikana toimintaa ohjaavat mm. munasolun sytoplasman tuhannet RNA-molekyylit ja solutukiranka kuten mikrotubulukset. Sen jälkeen jokaisessa osastossa kytketään päälle erilainen geneettinen ohjelma, siten, että yksi osasto kasvattaa luusolut, toiset lihassolut, hermosolut, ihosolut jne. Näiden solujen soluelimet, kuten mitokondriot, Golgin laite ja endoplasmainen kalvosto peritään kloonamalla ne äidin munasolun soluelimistä. DNA:n kautta tuotetaan vain uusien kloonien kasvuun tarvittavat raaka-aineet: Mitokondriot syntyvät vain mitokondriosta, Golgin laitteet Golgin laitteesta jne.

Entä kokonaisuutta pyörittävä ja säätelevä informaatio ja metainformaatio (eli informaatio informaation käytöstä)? Miten solu tietää, koska jakaantua ja koska ei? Monisoluisen eliön kehitys hedelmöittyneestä munasolusta aikuisyksilöksi on aivan oma lukunsa ja menee toistaiseksi ymmärryksemme yli. Miten munasta kasvaa toukka, toukasta kotelo ja kotelosta perhonen? Miten nutipää muuttuu sammakoksi? Toukka, nutipää ja aikuisyksilö ovat täysin erilaisia eliöitä.

### Täydellinen muodonvaihdos



### Osittainen muodonvaihdos



Wikimedia, User:ame1927, CC BY-SA 4.0

**Muodonvaihdos on monimutkainen, tarkasti säädelty prosessi, joka vaatii spesifistä geneettistä ja epigeneettistä informaatiota. Miten tällainen (tai mikä tahansa muu täsmennetty informaatio) voisi syntyä satunnaiselta, ohjaamattomalta evoluutio-prosessilta?**

## Suvullisen lisääntymisen mysteeri

*Toinen tärkeä muutos oli 'seksin vallankumous': osa eliöiden soluista erikoistui **sukusoluiksi**, minkä seurauksena syntyi uudenlainen tapa lisääntyä. Eliöiden evoluutio nopeutui, koska sukusolujen avulla tapahtuvan **suvullisen lisääntymisen** tuloksena syntyi enemmän perinnöllistä muuntelua ja siten materiaalia luonnonvalinnalle" (s.105).*

Myös suvullinen lisääntyminen ohitetaan vähin äänin, aina, koska sen evoluutiota ei voi edes kuvitella – saati että siitä olisi jotain todisteita. (Todisteeksi ei riitä, että monet kasvit ja myös jotkut eläimet lisääntyvät sekä suvuttomasti että suvullisesti.) Koiras ja naaras, mies ja nainen ovat monien ominaisuuksiensa puolesta aivan ”eri lajia”. (On naiivia puhua ”sukupuolettomuudesta”, ”sukupuolineutraliteetista”, viitataan sillä sitten biologiaan tai psykologiaan.<sup>58</sup>) Heteet ja emit, pimpsat ja pippelit, kivekset, munasarjat, kohtu, rinnat ja hormonit tarvittiin heti alusta alkaen – piste. Vai osaako joku kuvitella makromutaation: Muinaisessa sukupuolettomassa populaatiossa syntyi samalla paikkakunnalla samaan aikaan munia, joista yhdestä kehittyi koiras ja toisesta naaras. Ne alkoivat tuottaa diploidin sijasta haploideja siittiöitä ja munasoluja, jotka yhteen liityttyään kasvattivat yksilön, jolla oli taas diploidi kromosomisto. Miten sukusolujen vähennysjakaantuminen ”kehittyi”? Miten hedelmöitys tapahtui? Luepa kerran tai pari sukusolujen *koko* kehitystarina, gametogeneesi<sup>59</sup>, hedelmöittymisen mekanismit ja vaatimukset ja epäilen, ettet vielä parin lukukerran jälkeen ymmärrä/muista niistä paljoakaan. Voihan ne oppia (sen mitä tiedetään), miten ne tapahtuivat, mutta miten ne kehittyivät, se on jo eri juttu. Nelitahtimoottorin toiminnan voi ymmärtää, mutta siitä ei voi päätellä mitään sen keksimisestä. (Voi tietysti vedota höyrykoneeseen, mutta se ei ole juuri sen yksinkertaisempi.) Mutta BIOS 1:ssä kaikki vaikuttaa niin yksinkertaiselta; se vain ”tapahtui”. (Vedotaanko tässä evoluution aukkojen jumalaan?<sup>60</sup>)

58 Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja kirjailija Jari Sinkkonen on kritisoinut nykyään esitettyä näkemystä, jonka mukaan sukupuolia olisi periaatteessa loputon määrä: ”Minä en tällaista moninaisuuspuhetta ymmärrä alkuunkaan. Pojalla on munat ja tytöllä pimppi ja sillä selvä.” (Jari Sinkkonen, Tamperelainen 1/2018)

59 ”Gametogeneesi on sikiönkehityksen varhaisessa vaiheessa alkava tapahtuma, jossa sukusolut muodostuvat, erilaistuvat ja lopulta aikuisella yksilöllä kypsyvät hedelmöitykseen valmiiksi pitkälle erilaistuneiksi soluiksi” (Sariola ym., s.132).

60 Evolutionistit ovat joskus syyttäneet luomiseen uskovia siitä, että he ”vain täyttävät Jumalalla tieteen aukot” ja kutsuvat tätä ”aukkojen jumalaksi”. Todellisuudessa asia ei ole näin (ks. esim. *Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta* -kirja, [luominen.fi/KJVL](http://luominen.fi/KJVL)) ja evolutionistit itse vetoavat ”evoluutio sen teki” -tyyppisiin selityksiin kun mitään järkevää selitystä ei ole olemassa.

## Evoluutio tapahtui väärässä järjestyksessä

*”Elämän esihistoriallisen kauden lopulla, noin 550 miljoonaa vuotta sitten, tapahtui evoluutiossa nopeaa lajiutumista, minkä seurauksena tuon ajan sedimenttikerrostumista löytyy runsaasti erilaisten eläinryhmien fossiileja. Eläinten moninaisuus lisääntyi merissä niin valtavasti, että puhutaan **kambriikauden räjähdyksestä**. Fossiilien perusteella lähes kaikki nykyiset eläinkunnan pääjaksot olivat jo olemassa, mutta mukana oli myös lukuisia sellaisia, joita ei nykyisin enää ole” (s.106).*

Teorian mukaan ensin piti ilmaantua ”yksinkertaisia” monisoluisia, joiden jälkeläiset mutaatioiden johdosta ja valinnan suuntaamina kehittyivät pikkuhiljaa toisistaan hieman poikkeaviksi yksilöiksi ja populaatioiksi. Piti syntyä toisistaan lievästi poikkeavia ”alkulajeja”. Kun aikaa kului, eliöiden piti muuntua niin paljon, että jossain vaiheessa olisi ollut vaikeaa enää kuvitella, että niillä on joskus ollut lähes samanlaiset isovanhemmat. Tällaisesta ”kehityksestä” pitäisi fossiiliaineistossa olla näkyvissä edes jotain merkkejä.

Mutta ensin ilmaantuikin kutakin pääjaksoa edustava, pitkälle kehittynyt ”peruseliö” monimutkaisine ruumiinrakenteineen. Pääjakson A edustaja poikkesi merkittävällä tavalla samaan aikaan syntyneiden pääjaksojen B, C, D jne. edustajista. Tällaisia olivat mm. oudot ja mielikuvituksen rajoja hipovat kummajaiset kuten kookas *Anomalocaris*, *Ottoia* ja *Hallucigenia*. Näin siis ”erilaisuus” (engl. *disparity*) syntyiikin ennen moninaisuutta (engl. *diversity*). Tämä on siis täysin päinvastainen ilmiö kuin mitä Darwinin teoria edellytti: Alussa piti olla vain yksi ja yksinkertainen kantamuoto (LUCA). Siitä piti kasvaa vain ei-symmetrisiä perusmuotoja, sitten säteittäissymmetrisiä ja sitten kaksikylyksiä, vain vähän toisistaan poikkeavia eliöitä. Suurten, toisistaan merkittävästi poikkeavien konstruktoiden ja ruumiinrakenteiden eli pääjaksojen piti syntyä kaikkein viimeisinä. Mutta heti alussa paikalla olikin toisistaan täysin poikkeavia eliöitä. Ja vasta myöhemmin nämä perusryhmät alkoivat jakaantua heimoihin, sukuihin, lajeihin ja alalajeihin – ja tämä ”kehitys” näyttää jatkuvan vieläkin. Joidenkin mielestä se on ”evoluutiota silmiemme edessä”. – Kuten syksyn 2017 kohu-uutinen: evoluutiota silmiemme edessä, tällä kertaa Galápagossaarilla: 1980-luvulla muuan kaktussirkku oli muuttanut toiselle saarelle ja risteytynyt sikäläisen maasirkun kanssa. Tulos: lintu, jonka nokka ja väritys ehkä hivenen poikkesivat sen vanhemmista – sama kuin jos risteyttäisi oman koiransa naapurikylän Mustin kanssa. Tämä oli kuitenkin (paremman puutteessa) vuoden 2017 merkittävä evoluutiouutinen.

Ensimmäisten eliöiden ja niiden rakenteiden piti teorian mukaan olla ”alkeellisia”. Esi-merkiksi silmän kehityksen piti alkaa jostain ”alkeellisesta valoa aistivasta solusta”. Mutta todellisuudessa ensimmäiset silmät olivat kaikkein kehittyneimmät: trilobiitin silmät.

## Trilobiitin mykistävän nerokkaat silmät

Trilobiiteilla oli kolmenlaisia silmiä. Ensimmäinen oli *holokroaalinen*. Siinä oli yli 10 000 yhteen sulautunutta kaksoislinssiä. Näkö oli erittäin tarkka ja pienenkin liikkeen havaitseminen helppoa. Näkökyky sekä maalla että vedessä oli hyvä. Toinen tyyppi oli *skitsokroaalinen*. Siinä oli muutama sata erillistä isoa linssiä. Kolmas oli *abathokroaalinen*, jossa oli muutamia kymmeniä pieniä kalsiittilinssejä.

Trilobiitit olivat jo ratkaisseet yksikerroksiseen linssiin liittyvän pallopoikkeaman ongelman kahdella eri tavalla. Mitä taas tulee lajiin *Homo sapiens*, heistä vasta René Descartes ja Christian Huygens pystyivät samaan. Trilobiitit näkivät maailman kolmiulotteisena – jopa yhdellä silmällä, tavalla, mihin muunlaiset silmät eivät kykene. Millään muulla eliöllä ei ole näin nerokkaita optisia järjestelmiä.<sup>61</sup>

Trilobiittin silmä. Wikimedia / Moussa Direct Ltd., CC BY-SA 3.0



**Trilobiittien silmät olivat mykistävän nerokkaita järjestelmiä.**

61 Ks. esim. Reinikainen P., *Eläimet opettavat*, TV7 kustannus 2016 tai [www.trilobites.info/eyes.htm](http://www.trilobites.info/eyes.htm).

## BIOS 1 / Luku 10: Kasvit kehittyivät levistä

”Kivihiihikauden jälkeen, noin 250<sup>[62]</sup> miljoonaa vuotta sitten, maapallon ilmasto muuttui kuivemmaksi ja viileämmäksi. Sen seurauksena laajat sanikkaismetsät hävisivät. Niiden tilalle kehittyivät **siemenkasvit**, jotka sopeutuivat muuttuneisiin olosuhteisiin paremmin, sillä niiden lisääntyminen onnistui kuivemmissä olosuhteissa” (s.115).

”Ensimmäiset **koppisiemeniset** kasvit kehittyivät rinnakkain paljassiemienisten kanssa, mutta ne alkoivat yleistyä nopeasti vasta 100 miljoonaa vuotta sitten. -- Koppisiemenisten kasvien menestyminen perustui paljassiemensia kasveja tehokkaampaan lisääntymiseen”.

”Koppisiemenisten kasvien alkio kehittyi emin sisällä ikään kuin kohdussa, kun taas paljassiemienisten kasvien siemenaiheet olivat suojaamattomina emilehden pinnalla. – Tuulipölytyksen rinnalla koppisiemenisillä kasveilla yleistyi myös eläinpölytyks. Koppisiemenisten kasvien evoluutio onkin ollut tiiviissä yhteydessä hyönteisten evoluutioon, koska hyönteiset ovat niiden tärkeimpiä pölyttäjiä. Tällaista rinnakkain kehittymistä kutsutaan **koevoluutioksi**” (s.116).

Kukaan ei tiedä mistä koppisiemeniset tulivat. Darwin piti kukkakasvien (koppisiemenisten) alkuperää ”hirveänä mysteerinä” ja sellaisena se on pysynyt. Kukkakasvien siitepölyä löytyi mm. jo 1960-luvulla kambrikautta edeltävistä kerrostumista Etelä-Amerikasta (Roraima-vuori). Siitä oli mm. tiedelehti *Nature* useita kirjoituksia.<sup>63,64,65</sup> Mutta koska löytö jäi selittämättä, se unohdettiin.

Kun jotain, kuten eläinpölytystä, ei voida selittää tai ymmärtää, selitykseksi keksitään peitetermi, kuten ”koevoluutio”. Sillä tarkoitetaan sitä, että ”lajit voivat vaikuttaa toistensa evoluutioon”. Terminä lähes mitään sanomaton koevoluutio saattaa silti kuulostaa sen verran tieteelliseltä, että monille asiaa sen kummemmin ihmetteleville se riittää.

BIOS 1:n sivulla 87 on yksinkertainen (ja tosi) esimerkki koevoluutiosta: Kasvissa tapahtuva mutaatio voi muuntaa jotkut ravinteet haitallisiksi ja tällöin luonnonvalinta suosii niitä kasvissyöjiä, jotka sietävät paremmin ko. haitta-aineita. Tästä on kuitenkin valovuoden matka pölyttävien hyönteisten, lepakkojen ja kolibrin kehitykseen: eläinpölytystä tarvitsevat kukkakasvit eivät voineet odotella hyönteisten suosien tai kolibrin nolan evoluutiota: sopivia mutaatioita odotellessa kukat olisivat kuihtuneet. Kyseessä on *pakollinen mutualismi* eli molempien osapuolten on oltava läsnä heti ja täysin toimintavalmiina.

62 Geologisen aikataulun mukaan kivihiihikausi oli 355–290 miljoonaa vuotta sitten. BIOS 1 viittaa ilmeisesti permiikauteen, joka päättyi 250 miljoonaa vuotta sitten ja jonka jälkeen alkoi triaskausi.

63 Bailey P.B.H. Possible Microfossils found in the Roraima Formation in British Guyana, *Nature* **202**, 384, 1964, doi:10.1038/202384a0.

64 Stainforth R.M. Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guyana. *Nature* **210**:292–294, 1966, doi:10.1038/210292a0.

65 Bernard S. *et al.* Exceptional preservation of fossil plant spores in high-pressure metamorphic rocks, *Earth and Planetary Science Letters* **262**:1-2:257-72, 2007, doi.org/10.1016/j.epsl.2007.07.041.

Kirjamme opettaa, että evoluutiolla ei ole suuntaa/päämäärää/tarkoitusta. Mutta silti monien lajien evoluutio eteni täsmälleen samaan suuntaan:

”Kolibrit ovat erikoistuneet pitkäteriöisiin kukkiin, koska hyönteiset eivät yleensä ylety niin syvällä oleviin mesivaroihin” (s.116).

## ***Kasvien ja sienten evoluutio on kulkenut rinnakkain (s.118)***

”Sienet sopeutuivat elämään maaympäristössä ja levittäytyivät mantereille rinnakkain kasvien kanssa. Sienet hajottivat kuolleita eliöitä ja vapauttivat näin ravinteita kasvien käyttöön. Sienten ja levien välille, kuten myös sienten ja kasvien välille kehittyi molempia osapuolia hyödyttäviä yhteiselämän muotoja. – Sienten ja monien kasvien yhteiselämän muodoksi kehittyi **sienijuuri** eli mykoritsa, joka muodostui sienirihmastosta ja kasvin juurien solukoista” (s.118).

Kuvatekstin mukaan sienijuuri tehostaa kasvien veden ja ravinteiden ottoa, ja sieni saa kasveilta fotosynteesissä valmistunutta sokeria. Sienijuuret ovat elintärkeitä suurimmalle osalle kasveista. Pohjoiset havumetsät ovat täysin riippuvaisia sienistä. Miten tämä pakollinen mutualismi kehittyi? Koevoluutiollako? Voisitteko selittää tarkemmin?



**Lisätietoja ihmeellisestä kolibrista, ks. Luominen-tiedelehden numero 26.**

## BIOS 1 / Luku 11: Eläimet sopeutuivat elämään maalla

”*Kasvien kehittyminen maalle johti suhteellisen nopeasti myös maaeläinten evoluutioon. Noin 400 miljoonaa vuotta sitten maaympäristöön alkoi sopeutua selkärangattomia niveljalkaisia, joista kehittyi juoksujalkaisia, hämähäkkieläimiä ja hyönteisiä*” (s.121).

Tietääkseni ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että meren selkärangattomista, kuten äyriäisistä olisi kehittynyt maaympäristöön sopeutuneita niveljalkaisia. [Kuten tämän kirjan aikaisemmat laitokset yrittivät väittää, vedoten ns. isäntägeenien mutaatioihin: ”Esimerkiksi noin 400 miljoonaa vuotta sitten äyriäismäisessä eläimessä tapahtunut geenimutaatio johti jalkojen vähenemiseen ja hyönteisten syntymiseen” (BIOS 1, 5. Painos, 2008, s.110). Nyt kirja ei puhu siitä enää mitään.]

Jalkaluvun väheneminen (tai maakasvien ilmestyminen) ei tee kiduksilla hengittävää äyriäistä ilmaputkistolla hengittäväksi torakaksi. Kaikki meren selkärangattomat hengittävät joko passiivisesti siten, että happea imeytyy suoraan kudoksiin (esim. sieni- ja polttiaiseläimet) tai sitten kiduksilla (kuten äyriäiset). Maaniveljalkaisilla, kuten hyönteisillä ruumis on täynnä ilmaputkia ja pienemmiksi haarautuvia putkiloita, joiden ulkoaukkoja ruumiin sivuilla kutsutaan spiraakkeleiksi. Väite ”Noin 400 miljoonaa vuotta sitten maaympäristöön alkoi sopeutua selkärangattomia niveljalkaisia, joista kehittyi juoksu-jalkaisia jne.”, on tarinaa.

”*Vanhimmat maalla eläneiden selkärankaisten fossiilit ovat noin 395 miljoonaa vuotta vanhoja sammakkoeläinten fossiileja. Sammakkoeläimet kehittyivät ilmeisesti joissa ja jokisuistoissa eläineistä varsieväkalosta*” (s.121).

”*Sammakkoeläinten kehitys alkoi, kun vuorovesirannoilla elävistä kaloista kilpailussa pärjäsi-vät parhaiten sellaiset lajit, joilla oli voimakkaat, pohjalla liikkumiseen soveltuvat evät. Evistä kehittyivät vähitellen raajat, jotka sopivat maalla liikkumiseen.*”

”*Maaselkärankaisten keuhkot ovat peräisin varhaisilta varsieväkaloilta. – Myös verenkiertoeli-mistö kehittyi aikaisempaa tehokkaammaksi, ja sen avulla happi pystyttiin kuljettamaan eri puolille elimistöä soluhengitystä varten*” (s.122).

Sivulla 123 on taiteilijan piirros mm. suurta kohua herättäneestä varsieväiskala *Tiktaalikista*, jonka etukropan löytyminen herätti suurta huomiota vuonna 2006. Se kuulemma pystyi käyttämään eviään myös maalla ryömimiseen. Oppikirjamme kuitenkin tunnustaa, että:

”*Ruumiinrakenteestaan huolimatta se oli kala, joka lisääntyi, saalisti ja hengitti<sup>166l</sup> vedessä. Tiktaalik eli noin 375 miljoonaa vuotta sitten.*”





Tiktaalik roseae, Wikimedia Commons

**Evoluutioon uskovat pitivät *Tiktaalik roseae* -olentoa vedessä ja maalla elävien olentojen välimuotona. Välimuoto lensi (monen muun evoluutio-olettamuksen ikonin) tavoin romukoppaan viimeistään vuonna 2010 Puolasta löydettyjen jalanjälkien myötä.**

Alkuinnostuksen huumassa, reilut kymmenen vuotta sitten Tiktaalikille sävellettiin jopa laulu ja sille perustettiin oma internetsivusto! Näin siksi, että tuolloin (2006) monet pitivät sitä ilmiselvänä välittävänä muotona vesi- ja maaselkärankaisten välillä. Esimerkiksi tiedelehti *Naturen* Tiktaalik-artikkelin (6.4.2006) otsikko oli komea: ”A firm step from water to land” eli ”tukeva askel vedestä maalle”:

”Pitkään on ollut selviö, että raajalliset selkärankaisten kehittyivät varsieväkalosta. Kuitenkin, aivan viime aikoihin saakka morfologinen aukko näiden kahden ryhmän välillä on pysynyt **turhauttavan suurena** [*a major gap*]. Aukon yläpuolelta löytyivät sellaiset devonikauden primitiiviset nelijalkaiset kuten Grönlannin *Ichthyostega* ja *Acanthostega*, alapuolelta Latviasta löytynyt keskidevonikauden neliraajaista muistuttava petokala *Panderichthys*...”

Huomaa evoluutioteoreetikoille tyypillinen ”jälkitunnustus”: Morfologinen aukko varsieväkalojen ja neliraajaisten maaselkärankaisten välillä oli ollut turhauttavan suuri, mutta siitä vaiettiin. Mutta nyt kun luultiin, että aukko on täytetty, sen olemassaolo oli pakko tunnistaa – eihän uudella löydöllä, aukon täyttäjällä olisi muuten ollut mitään julkisuusarvoa.

Kohu kuitenkin laimeni, kun Puolasta löydettiin pari vuotta myöhemmin kookkaan salamanterin tai liskon jalanjälkiä, joiden ikä määritettiin Tiktaalikia 18 miljoonaa vuotta vanhemmaksi.<sup>67</sup> Sitten (2014) Tiktaalikista löytyi myös takaruumis, jossa oli melko tavanomaiset varsieväkalon raajan luut ilman selkärankaan kiinteästi liittyvää lantiota.

67 Byrne, J., Four-legged creature’s footprints force evolution rethink, LiveScience.com, [www.livescience.com/animals/100106-tetrapod-footprints.html](http://www.livescience.com/animals/100106-tetrapod-footprints.html), 6 January 2010

Selkärankaan (ristiluuhun) tukevasti kiinnittyvä lantio on välttämätön rakenne, jota ilman maaeläin ei voi kunnolla ponnistaa eikä kannatella ruumiinpainoaan. Ja oppikirjammekin toteaa, että ”Vanhimmat maalla eläneiden selkärankaisten fossiilit ovat noin 395 miljoonaa vuotta vanhoja sammakkoeläinten fossiileja” eli Tiktaalikia 20 miljoonaa vuotta vanhempia.

Oppirjamme Tiktaalik-kuvan alla esiintyy *Aganthostega*, joka tekstin mukaan ”kuului kalasammakkoihin, jotka sijoittuvat evoluutiossa kalojen ja sammakkoeläinten väliin. *Aganthostegaa* on pidetty ensimmäisenä maaselkärankaisena.” Mutta Bentonin (s.96) mukaan *Aganthostega* ei ollut maa- vaan vesieläin, jolla oli kidukset – aikuisenakin, ja jonka raajat eivät kyenneet kannattelemaan sitä kuivalla maalla. Hän viittaa ns. ”Romerin aukkoon”, jolla tarkoitetaan devoni- ja hiilikauden välisen ajanjakson selkärankaisfossiilien niukkuutta. Kukaan ei vaikuta tietävän, mikä *Aganthostega* oli ja Benton tyytyy toteamaan, että ”ehkä maaselkärankaiset kehittyivät vasta hiilikaudella 25 miljoonaa vuotta myöhemmin”. Ensimmäisinä todellisina maaselkärankaisina hän pitää varhaisen hiilikauden temnospondyleja, sammakkoeläimiä, joista hän mainitsee sellaiset kuin *Balanerpeton* ja *Dendrerpeton*. Kalojen ja maaselkärankaisten väliin jää siis edelleenkin ”a major gap” eli suuri aukko, jonka olemassaolon huhtikuun 2006 tiedelehti *Nature* tunnusti silloin kun uuden löydön, Tiktaalikin luultiin täyttäneen sen. Mutta entä selvät nelijalkaisen eläimen fossiiliset jalan jäljet devonikautisessa kalkkikivikerrostumassa Puolassa, joiden iäksi arvioitiin 395 miljoonaa vuotta. Niiden pitäisi olla ainakin 40 miljoonaa vuotta Bentonin *Balanerpetonia* ja *Dedrepetonia* vanhempia?

Jos fossiilin pehmytkudokset ovat huonosti säilyneet, tai ei ollenkaan, on pelkkien luiden perusteella vaikea tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä eläimen anatomia, fysiologiasta ja polveutumissuhteista. Eläin on muutakin kuin luuranko: Kaloilla on yksinkertainen verenkierto: Neliosainen putkisydän pumpkaa veren kiduksiin, jotka toimivat erittäin tehokkaasti *vastavirtausperiaatteella* pystyen suodattamaan 85% kidusten läpi virtaavan veden hapestä. Kiduksista veri ohjautuu suoraan kudoksiin, joista se palaa sydämeen uudelleen kiduksiin pumpattavaksi. Muistutan vielä, että jos kala joutuu maalle, ohuet kiduslehdykät liimantuvat toisiinsa kiinni ja kala tukehtuu. Miten kalan yksinkertainen verenkierto muuntui sammakkoeläimen kaksinkertaiseksi verenkierroksi (pieni ja suuri verenkierto)? Miten suomut muuntuivat rauhasihoksi, jolla sammakko hengittää (ja erittää myrkkyjä)? Kaloilla ei ole muodonmuutosta, sammakoilla on. Muodonmuutos, metamorfoosi on niin monimutkainen tapahtuma, että mielikuvitus ei riitä uskottavan tarinan keksimiseen. Muodonmuutoksen kaikki mekanismit ehkä saadaan joskus selville. Mutta mistä muodonmuutos tuli, miten se kehittyi, on paljon vaikeampi kysymys. Niinpä kirjammekin vain toteaa muodonmuutoksen tapahtuneeksi, noin vain, ihan itsestään.

{ *Sammakkoeläinten lisääntyminen tapahtui kuitenkin edelleen ulkoisesti kuten kalojenkin, ja poikaset kehittyivät vedessä aikuisiksi yksilöiksi muodonvaihdoksen kautta. Täysikasvuistenkaan sammakoiden iho ei kestänyt kunnolla kuivuutta, koska osa hengityksestä tapahtui kostean ihon kautta*” (s.122). }

Ja kaiken lisäksi: Monet eliöt ovat mosaiikkeja. *Mosaiikiksi* sanotaan eliötä, kuten keuhkokalaa tai vesinokkaeläintä, joka omaa piirteitä kahdesta tai useammasta eliöryhmästä. Mosaiikismi onkin yksi niistä tekijöistä, jotka vaikeuttavat eliöiden oletetun polveutumishistorian selvittämistä. Elävissä lajeissa, kuin myös sukupuuttoon kuolleissa (*Archaeopteryx*), on paljon mosaiikkeja. Joidenkin ominaisuuksiensa perusteella joku voitaisiin luokitella kalaksi ja joidenkin toisten perusteella sammakkoeläimeksi. Etelä-Euroopan kalkkikivivuoristojen maanalaisissa joissa ja järvissä elävä olmi luokitellaan sammakkoeläimeksi, vaikka sillä on kidukset myös aikuisena. Keuhkokaloilla on keuhkot, mutta silti niitä ei luokitella sammakkoeläimiksi. Nykyinen Afrikan keuhkokala pystyy matelemaan maalla ilman varsieviäkin löytääkseen uuden lammen, jos oma kuivuu. Pitkien kuivuuskausien aikana se voi kaivautua lampensa pohjamutaan ja säilyä siellä hengissä jopa vuosia. Liejuryömijää pidetään kalana, vaikka sillä onkin eturaajat, joiden avulla se voi kiivetä jopa puuhun. Se voi hengittää ihollaan ja suunsa limakalvolla. Siitä huolimatta se on vedestä riippuvainen eikä siinä ole havaittavissa merkkejä evoluutiosta kohti maaselkärankaisia.

”*Matelijat erosivat sammakkoeläimistä useilla eri tavoilla. Niiden raajat ja tukiranka olivat sopeutuneet sammakkoeläinten rakenteita paremmin maalla liikkumiseen. Matelijoiden sarveissuomuinen iho kesti paremmin kuivuuutta ja verenkierto- ja hengityselimistö oli kehittyneet tehokkaammaksi kuin sammakoilla. Myös matelijoiden hermosto ja aistit olivat monipuolisempia... Tärkeimpiä uusia avainsopeutumia olivat kuitenkin sisäinen siitos ja munan kehittyminen...*” (s.124).

Näin on – paitsi että kukaan ei tiedä, miten nämä valtavat eroavaisuudet ”kehittyivät”. Niistä voitaisiin kirjoittaa kirja, tai kirjoja. Matelijat ovat laaja ja monimuotoinen eläinryhmä, joista kukin on omalla tavallaan pitkälle erikoistunut (liskot, raajattomat matolisot, käärmeet, kilpikonnat ja krokotiilieläimet). Mistä kilpikonnat tulivat? Kukaan ei tiedä.

Sammakkoeläinten munat kehittyvät vedessä. Aineenvaihdunnan tuloksena syntävä myrkyllinen ammoniakki eritetään suoraan veteen. Matelijoiden alkiokehitys kehittyvät kuorellisessa munassa, josta ammoniakkaa ei voi erittää ulos. Niinpä alkion elimistö muuntaa sen virtsahapoksi, joka on lähes veteen liukenematonta. Virtsahapon synteesi ammoniakista on kuitenkin mutkikas ja runsaasti energiaa (ATP:tä) kuluttava prosessi. Miten se kehittyi?

Kirjan kuvassa sivulla 124 komeilee erittäin erikoistunut matelija, pantterikameleontti. Sillä on täsmäase: sinkokieli ja teleskooppihäki. Molemmat silmät kääntyvät itsenäisesti 180 astetta. Mistä ja miten se kehittyi? Kielensä puolesta kameleonttikin on mosaiikki. Kameleontin lisäksi sinkokielen omistavat ainakin tikka, muurahaiskarhu, muurahaiskäpy ja maasika. Nisäkkäillä on yleensä karvat, mutta vyötiäisellä ja muurahaiskävyllä on suomet. Kehittyivätkö matelijat nisäkkäistä, vai päinvastoin, kuten kirjamme opettaa:

## Liskoista nisäkkäiksi?

”Elämän keskiaika 250–65 miljoonaa vuotta sitten tunnetaan dinosaurusten ja muiden matelijoiden valtakautena” (s.125).

Termi ”matelijoiden aikakausi” on harhaanjohtava: Sellaista ei ollut, sillä samaan aikaan eli mm. yli 400 nisäkäslajia. On jopa löydetty muutama koiran kokoinen nisäkäsfossiili, joiden vatsalaukusta on löytynyt ateriaksi nautittuja pieniä dinosauruksia. (Myös Bentonin kirjassa on kuva Kiinasta löytyneestä majavan fossiilista, jonka arvioidaan eläneen keskisellä jurakaudella – siis *Jurassic Parkissa*.) Lisäksi dinosauruserostumista väitetään löytyneen ainakin seuraavien nykylintujen fossiileja: papukaijoja, pöllöjä, pingviinejä, ankoja, kuikkia, albatrosseja, merimetsoja, kurppia ja avosetteja (ks. seuraava kappale ”dinosauruksista linnuiksi”).

”Dinosaurusten aikakaudella eli monia nisäkäsliskoja, joista suurin osa ei pärjännyt kilpailussa muille matelijoille. Yhdestä ryhmästä kehittyi kuitenkin pieniä karvapeitteisiä nisäkkäitä, jotka liikkuvat hämärän tullen aluskasvillisuuden seassa saalistaen hyönteisiä ja muita selkärangattomia” (s.126).

Siis ”liikkuvat hämärän tullen aluskasvillisuuden seassa”? Mistäköhän he sen tietävät?

”Nisäkäslisko” oli aikoinaan yleisnimi joukolle fossiileja, jotka kuuluivat luultavasti joko matelijoille tai nisäkkäille. Nimitys tuli englanninkielisestä termistä *mammal-like reptiles* eli nisäkkään kaltaiset liskot. Nyt se on hylätty. Benton kirjoittaa:

”Modernit nisäkkäät on helppo identifioida. Niillä on turkki, yleensä kookkaat aivot, ne imettävät jälkeläisiään maidolla ja pitävät niistä huolta pitkän aikaa. Mutta myöhäisellä triaskaudella, jolloin nisäkkäät ilmaantuivat, raja nisäkkäiden ja ei-nisäkkäiden välillä oli paljon epämääräisempi. Triaskauden lihansyöjät, synapsidit ja cynodontit omaksuivat vaihteittain ’nisäkäsmäisiä’ piirteitä 30–40 miljoonan vuoden aikana ja rajan veto ei-nisäkkäiden, synapsidien ja nisäkkäiden välille on mielivaltaista” (s.319).

Sitten hän jatkaa toteamalla, että vaikeudet alkavat jo siitä, mitä nisäkkäällä tarkoitetaan. Hänen mukaansa ensimmäiset varsinaiset nisäkkäät ilmestyivät fossiilistoon myöhäisellä triaskaudella, mutta ne olivat ”kovin epätäydellisiä”.

Nisäkkäiden linja on joidenkin mielestä alkanut kehittyä jo permikaudella jostain ns. amniota-ryhmästä (sikiökalvoisista), munivista ”varhaisista matelijamaisista” eläimistä, joista myös varsinaiset matelijat kehittyivät erillisenä ryhmänä. Matelijat ja nisäkkäät olisivat siis ”sisarlajeja”. Näistä ”amnioteista” *synapsideja* on pidetty nisäkkäiden edeltäjinä. Niihin kuuluvista *peycosauruksista* voitaisiin johtaa muotosarja varhaisiin nisäkkäisiin. Ajan myötä sarjan yksilöt vaikuttaisivat erityisesti *leukansa* ja *keskikorvansa* puolesta kehittyvän yhä enemmän nisäkkään kaltaiseksi. (Ongelma on kuitenkin siinä, että tuohon mennessä ”normaalikorvaisia” nisäkkäitä oli jo olemassa.) Silti jotkut ovat pitäneet tätä ylimenoa (leuka/keskikorva) *parhaiten dokumentoituna* uuden suuren eläinryhmän syntymisenä.

Kriitikkojen mukaan matelija-nisäkässarjan yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa kuitenkin suuria morfologisia aukkoja oletettujen yhdistävien lenkkien välillä. Myöhäisillä nisäkäsmäisillä liskoilla, kuten cynodonteilla ja varhaisnisäkkäillä oli tiettyjä yhtäläisyyksiä kuten monilla muillakin eläinryhmillä. Mutta niiden välillä oli myös niin selviä eroja, että teoriaa on pitänyt täydentää mielikuvituksella. Jo kallon seudusta löytyy merkittäviä poikkeamia kuten poskihampaat sekä sisäkorvan ja silmäkuopan rakenne. Biologi ja geologi John Woodmorappe käsitteli matelija-nisäkäsmuotosarjaa v. 2001 julkaistussa meta-analyysissä ”Mammal-like reptiles: major trait reversals and discontinuities”.<sup>68</sup> Hänen mukaansa väitettyä katkeamatonta matelija-nisäkäsmuotosarjaa ei *sellaisenaan* löydy mistään maailmankolkasta. (Eikä asetelma liene sen jälkeen juurikaan muuttunut ainakaan hypoteesin eduksi, pikemminkin päinvastoin uusien nisäkäslöytöjen myötä.) Sukupuut onkin laadittu samaa kaavaa noudattaen kuin hevosten: monilta eri mantereilta tehtyjä *yksittäislöydöksiä* on soviteltu teorian edellyttämään järjestykseen välittämättä siitä, että kaikkien luiden omistajat eivät kuulu edes samaan sukuun.

Kuitenkin, esim. Bentonin teoksen osa 10.1 (Cynodonts and the acquisition of mammalian characters) on mielenkiintoista luettavaa (jo kuvituksensakin puolesta): Mennyttä maailmaa asutti monipuolinen ja monimuotoinen maaselkärankaisten joukko, jonka jäsenistä moni on kuollut sukupuuttoon emmekä siis voi varmasti tietää, mitä ne olivat; pelkkä luuranko – tai vain muutama kallonpalanen ja hammas eivät kerro niiden omistajista kovinkaan paljoa. Jotta sukupuuttoon kuolleen fossiilisen lajin voisi osoittaa nisäkkääksi, pitäisi löytää nisät, mutta niitä ei tietääkseni ole löydetty. Se, että joidenkin uskotaan olleen karvapeitteisiä, johtuu siitä, että niiden kuonoissa on havaittu pieniä luukanavia. Niiden uskotaan olleen kanavia, joita myöden tuli tuntohermoja viiksiin. Jos otuksella oli viikset, sillä oli myös karvapeite. Jos sillä oli karvapeite, sillä oli myös nisät.

Joidenkin liskojen ja nisäkkäiden (kuin myös pienten kaksijalkaisten petodinosaurusten ja lintujen) luustoista saattaa löytyä yllättävän paljon samankaltaisia piirteitä. Mutta kun eläin itsessään puuttuu, ”luovalla ajattelulla” on taipumusta täyttää puuttuvia osia. Paleontologiasta leipänsä repivien voi joskus olla vaikeaa myöntää, että he eivät tiedä, tai ovat epävarmoja – varsinkin kun heillä on usein keskenään kova kisa löytää uusia fossiileja ja keksiä niille jokin oksa elämänpuussa. (Ja ehkä päästä julkisuuteen ”puuttuvan renkaan löytäjänä”.)

Joka tapauksessa sopivista fossiileista konstruoitu sarja vakuuttaa ainakin ne, jotka jo lähtökohtaisesti uskovat makroevoluutioon. Ne, jotka siihen uskovat, saattavat toisaalla sanoa, että eliöistä löydetyt monimutkaisen täsmälliset rakenteet, kuten bakteerin siimamoottori, eivät ole todiste suunnittelusta; ihmismielessä ainoastaan syntyy *vaikutelma* suunnittelusta, mutta vaikutelma ei ole todellinen. Todellisuudessa nuo rakenteet ovat vain kehittyneet. Samaa filosofiaa voitaneen soveltaa myös matelija-nisäkäs -sarjaan: kyseessä on pelkkä vaikutelma evoluutiosta, jota ei koskaan ole tapahtunut?

---

68 Mammal-like reptiles: major trait reversals and discontinuities, *Journal of Creation* 15(1):44–52, 2001.

Mutta mitä tulee anatomiaan, fysiologiaan, alkionkehitykseen ja genetiikkaan, jos rehellisiä halutaan olla, ei voida väittää, että ”matelija muuttui pikkuhiljaa nisäkkääksi monien pienten, toisiaan seuraavien vaiheiden (ja mutaatioiden) kautta.” Nämä eläimet ovat (nykyään) niin perustavanlaatuisesti erilaisia, että muutos ei ole edes kuviteltavissa. Millainen olisi ollut se ”kantamuoto” (joka vasta hiljattain oli muuntunut kalasta maaeläimeksi), josta kehitys alkoi? Kysymys on nyt paljon vaikeampi kuin silloin, kun tiedettiin vähemmän ja luultiin enemmän. Nyt siis tiedämme, että geenit (ja mutaatiot, evoluution ”raaka-aineet”) eivät juurikaan määrää eliön fenotyypin<sup>69</sup> keskeisiä ominaisuuksia (ruumiinkaavaa, morfologiaa ja anatomiaa). Geenien kautta tuotetaan siis vain solujen tarvitsemat raaka-aineet (rakenneproteiinit ja metaboliemolekyylit); ruumiinkaavat, anatomia ja morfologia on koodattu geenien ulkopuolelle, munasoluun, josta myös soluelimet, kuten mitokondriot kloonataan suoraan seuraavaan solusukupolveen. Miten ”alkumatelija” siis kehitti nisäkkään vastavirtausperiaatteella toimivan munuaisen? Miten nisäkkään lisääntymiselimet ja lisääntymisfysiologia kehittyivät? Entä vilkas aineenvaihdunta ja lämmön säätely? Miten suomut muuntuivat turkiksi? Kysymyksiä on paljon, vastauksia ei.

Entä ”aikajana”? Kukaan ei tiedä (vaikka toisin väitetään), miten vanhoja ne sedimenttikerrostumat ovat, joista fossiilit ovat löytyneet; absoluuttista ikää ei voida määrittää; on vain epäsuoraa kehäpäätelyä, jonka lähtökohtana ovat itse fossiilit, usko siihen, että hidas, asteittainen evoluutio on totta. Radiometrinen iänmääritys antaa pelkkiä suhdelukuja, lähtöaineiden ja tytäraineiden suhteita, joista ikä täytyy päätellä. Jos suhdeluvusta johdettu ikä ei sovi oletusikä, se hylätään (ja koetetaan ehkä jotain toista menetelmää toivoen, että saataisiin ”parempi ikä”). (Tästä myös sivuilla 87–89 ja enemmän Koulubiologian analyysin kakkososassa tai englanniksi netissä [creation.com/age](http://creation.com/age).)

---

69 Fenotyyppi tarkoittaa eliön ilmiä, yksilön ominaisuuksien kokonaisuutta, biologisesti toiminnallisen yksilön ilmenemismuotoa. Fenotyyppiin vaikuttavat sekä genotyyppi, että ympäristötekijät.

## Dinosauruksista linnuiksi – vai linnuista dinosauruksiksi?

”Linnut polveutuvat noin 170 miljoonaa vuotta sitten puissa eläneistä höyhenpeitteisistä pienistä dinosauruksista. Aikojen kuluessa näissä lintujen esi-isissä tapahtui rakenteellisia muutoksia: eturaajat kehittyivät sulkapeitteisiksi **siiviksi** ja luusto keveni ” (s. 128).

Ajatuksen lintujen polveutumisesta dinosauruksista esitti Darwinin ”bulldoggi” Thomas Huxley 1860-luvulla. Hänen hypoteesinsa perustui siihen, että theropodi-heimon (esim. *Tyrannosaurus* ja *Velociraptor*) eli petodinosaurusten ja lintujen luustoissa oli joitain samankaltaisuuksia. (Samoihin aikoihin Saksasta oli myös löytynyt ensimmäinen liskolinnun, *Archaeopteryxin* fossiili.) Myöhemmin hypoteesi tuli kuitenkin hylätyksi. Mutta se heräsi uudelleen eloon sen jälkeen kun Kiinasta alkoi 1980–90 -lukujen taitteessa löytyä ”höyhenpeitteisiä dinosauruksia”.



Thomas Huxley

Archaeopteryx lithographica (Eichstätter-Specimen), Wikimedia, Vesta, CC BY-SA 3.0



Aiemmin evoluution todisteena rummutettu *Archaeopteryx* oli sukupuuttoon kuollut lintu, ei mikään välimuoto lintujen ja dinosaurusten välillä. Nykylinnuilla on vain muutama pyrstönikama, tai ei ollenkaan.

BIOS 1:n vuoden 2016 painos enää ainoastaan kuin ohimennen (tosin kuvan kera) mainitsee evoluutioteorian ennen niin kuuluisan ikonin, *Archaeopteryxin* eikä puhu siitä enää dinosauruksia ja lintuja yhdistävänä ”puuttavana renkaana”. Näin siksi, että tämä jopa evoluution Rosettan kivenä pidetty fossiili ei enää ”sovi kuvioihin”; se onkin aito lentokykyinen lintu, ei mikään välimuoto. Sen sijaan mainitaan lyhyesti ”pienet puissa eläneet höyhenpeitteiset petodinosaurukset”.

Liskolinnusta on kiistelty – totta kai. Mutta käsittääkseni nykyään oikeastaan kaikki paleontologit myöntävät, että se oli aito, lentokykyinen lintu, joskin kieltämättä hieman omituinen mosaiikki hampaineen, siipikynsineen ja pyrstöruotoineen. Liskolinnulla oli mm. lentäville linnuille tyypilliset epäsymmetriset lentosulat, ellipsin muotoinen siipi ja ns. ”oksakoipi” (perching foot) eli jalka/varpaat, jotka mahdollistivat laskeutumisen puun oksalle. Oksalle laskeutuminen vaatii kehittyneitä lentokyvyn hallintaa ja siipien aerodynamiikkaa, koska sulkien täytyy synnyttää juuri oikeat ilmanpyörteet, jotta oksalle telakoituminen onnistuisi.

Artikkelissaan ”Dino-bird theory – a flight of fancy”<sup>70</sup> Bergman ja Snow, josta vm. on lintutieteilijä, toteavat, että kaikki ”höyhenpukuiset dinosaurukset” (ne, joista on löytynyt oikeita höyheniä) ovat joko liskolintu *Archaeopteryxin* kaltaisia sukupuuttoon kuolleita lintumosaiikkeja, kookkaita strutsin ja emun kaltaisia lentokyvyyttömiä lajeja<sup>71</sup> tai taantuneita lintuja (kuten lentokykynsä menettänyt kormorantti eli mutantti-merimetso ja siivetön ruokki). (Myös Kelju K. Kojootin ainainen kiusankappale, maantiekittäjä eli maakäki on lentokyvytön lintu, joka voi saavuttaa jopa 42 km/h kiitonopeuden.)

Paleontologi Stephen Brusatte kirjoitti höyhenpukuisista dinosauruksista vuonna 2015 *Scientific Reports'ssa* (5:11775) ja vielä uudelleen tiedelehti *Science'ssa* (tammikuu 2017). Hän pitää Kiinasta löytynyttä varhaisen liitukauden kookasta, noin aasin kokoista fossiilia höyhenpukuisena dinosauruksena, jolle annettiin nimi *Zhenyuanlong suni*. Sen pitäisi hänen mielestään kuulua ns. dromeosaurideihin (maniraptora-heimon dinosauruksiin, kuten *Jurassic Parkin* velociraptor). Fossiililla on sulkien lisäksi pyrstöruoto ja pitkät takaraajat, joissa on *lyhyt reisiluu* sekä pitkä sääri/nilkka, kuten linnuilla. Outoa Brusatten artikkeleissa on se, että hän koko ajan korostaa fossiilin lintumaisia piirteitä, sitä miten se poikkeaa dromeosaurideista, joihin sen pitäisi kuulua: ”Kuitenkin tämä kiinalainen yksilö poikkeaa näistä tavanomaisista dinosauruksista monella tapaa. Sen luut olivat kevyitä ja onttoja, säätet pitkät ja sirot kuten heeroksella [– –] Tämä dinosaurus on silmiinpistävästi linnun kaltainen.” Eli: Jos se kävelee kuin ankka ja kaakattaa kuin ankka, se on ankka. Kaakattaa tai ei, perinteisen ikämäärityksen mukaan tämä fossiili on kuitenkin aitona lintuna pidettyä *Archaeopteryxiä* melkein 30 miljoonaa vuotta nuorempi.

Mainittakoon vielä pari muutakin ensin höyhenpukuiseksi dinosaurukseksi väitettyä lintufossiilia. Ensin *Scansoriopteryx*. Se löytyi 2000-luvun alussa. Kyseessä on varpusen kokoinen keskenkasvuinen yksilö. Fossiilin löytäjä Czerkas piti sitä höyhenpukuisena dinosauruksena ja julkaisi sen kunniaksi kirjan *Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight*. Vuonna 2014 Czerkas kuitenkin tutki fossiilin uudelleen yhdessä alan ekspertin Alan Feducian kanssa ja he tulivat siihen tulokseen, että kyseessä onkin lintu.<sup>72</sup>

70 *Journal of Creation* 29(1):17-24, 2015.

71 Suurin tunnettu lentokyvytön lintu lienee ollut Madagassarilla elänyt ”elefanttilintu”, jonka painoksi on arvioitu 350 kiloa ja joka kuoli sukupuuttoon noin vuonna 1000 jKr.

72 Czerkas S, Feducia A. 2014: Jurassic archosaur is a non-dinosaurian bird, *Journal of Ornithology* 155(4):841-851, 2014.



Myös *Microraptor*- ja *Caudipteryx*-nimisiä fossiileja väitettiin ensin höyhenpukuisiksi dinosauruksiksi. Kuitenkin, monet evolutionistit, kuten puolalaiset dinosauruseksperitit Maryńska, Osmólska ja Wolsan ovat sitä mieltä, että *Caudipteryx* on kormorantin kaltainen lentokykynsä menettänyt lintu.<sup>73</sup> He luettelevat fossiilista useita selviä linnulle kuuluvia piirteitä. Siitä huolimatta jotkut ovat sitä mieltä, että se on linnuksi kehittymässä ollut välimuoto. Tähän taas ym. fossiilisten lintujen ekstperitti Alan Feduccia on todennut, että se synnyttää ”isoisäparadoksin” eli et voi olla isoisääsi vanhempi: *Archaeopteryxin* iäksi on arvioitu 153 miljoonaa vuotta. Ja toinenkin selvä lintufossiili, *Confuciusornis* on määritetty 135 miljoonaa vuoden ikäiseksi, mutta *Caudipteryx* vain noin 125 miljoonaa vuotta vanhaksi. Mitä taas *Microraptorin* tulee, kyseessä vaikuttaa olevan lentokykyinen tai ainakin liitämään kyennyt lintu, jonka siivissä on selvät epäsymmetriset lentosulat. Sitä mainostettiin jopa ”nelisiipisenä dinosauruksena”. Otuksesta on kuva mm. Donald Protheron kirjassa *Evolution – What Fossils Say and Why It Matters* (Columbia University Press 2007). Oma tulkintani kuvasta on, että osa vasemman siiven sulista on ilmeisen äkillisen ja väkivaltaisen hautautumisen aikana irronut ja joutunut jalkojen taakse. Kirjan samalla sivulla (color plate 6B) on kuva *Sinosauropteryxin* fossiilista, jossa höyheniä ei todellakaan näy. Siitä huolimatta fossiililla on Protheron mielestä erityisesti niskan seudessa ”kauniisti säilyneitä karvamaisia höyheniä”!<sup>74</sup>

Ja mitä tulee muutamisiin muihin suurikokoisiin, höyhenpeitteisiksi väitettyihin dinosaurusfossiileihin (kuten vuonna 2012 kuvattu ”höyhenpeitteinen *Tyrannosaurus*”), ns. ”esihöhentien” painaumien fossiilien pinnalla ovat, päinvastoin kuin höyhenet, haaraantumattomia kuvioita (”jouhia”), eivätkä vaikuta olevan muuta kuin eläimen nahan lujaa ja kestäväää kollageeniverkostoa, jota on jäänyt jäljelle muun osan nahkaa mädännytystä pois ennen fossilisoitumista. Tällaiseksi ”esihöhentienillä” varustetuksi dinosaurukseksi väitettiin mm. yllämainittua, vuonna 1996 löytynyttä noin metrin mittaista fossiilia, joka sai nimen *Sinosauropteryx*. Höyhendinosaurusten epäilijän Lingham-Soliarin mukaan fossiilin hännän rakenne viittaa siihen, että kyseessä on vedessä elänyt lisko, joka krokotiilien tapaan käytti häntäänsä uimiseen.<sup>75</sup> Samanlaisia ”esihöhentien”, ”jouhien” kuvioita on löydetty mm. delfiiniä sekä lento- ja kalaliskojen fossiileista. Lisäksi on löytynyt *Sinosauropteryxin* ja ”höyhen-tyrannosauruksen” kaltaisia fossiileja ilman ”esihöhentien”.

Vuonna 2017 kiinalaisesta varhaisliitukautisesta (131–120 miljoonaa vuotta) Jehol-muodostumasta löytyi modernin linnun fossiili, jonka luut eivät olleet mineralisoituneet: Histologisissa värjäyksissä näkyi normaalia luukudosta kuten avoimia haversin kanavia, jotka eivät olleet ehtineet täyttyä mineraaliaineksella.<sup>76</sup> Tämä oli ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun lintufossiilista (jotka ovat melko harvinaisia) löytyi sulkien lisäksi muutakin orgaanista, siis ei-kivettynyttä/mineralisoitunutta kudosta. Näitä ns. orgaanisia fossiililöytöjä on tehty jo vuosikymmenet, mutta niistä ei jostain syystä juurikaan puhuttu ennen 1990-lukua. Dinosaurus-fossiilien hyvin säilyneet verisuonet, verisolut, nahka, lihakset

73 Avian status for *Oviraptorosauria*, *Acta Palaeontologica Polonica* 47(1): 97–116, 2002.

74 Vaikutelma syntyy osittain siitä syystä, että *Microraptor* on liskolinnun tapaan fossilisoitunut ns. kuolinkouristus- eli opistotonus-asentoon, jolloin niskaan muodostuu ihopoimuja: ks. liskolinnun kuva yllä.

75 Lingham-Soliar T., The evolution of the feather: *Sinosauropteryx*, life, death and preservation of an alleged feathered dinosaur, *J. Ornithology* 153 3):699–711, 2012.

76 Vang M., Li Z., and Zhou Z., Insight into the growth pattern and bone fusion of basal birds from an Early Cretaceous enanthiomithine bird, *Proc Natl Acad Sci U S A* 114(43):11470–11475, 2017, doi: 10.1073/pnas.1707237114.

– tai jopa suolisto<sup>77</sup> – eivät pysy aikajanalla: Kylmä, kuiva, hapeton tai pH-arvoltaan neutraali ympäristökään ei voi estää taustasäteilyn ja molekyylien lämpöliikkeen aiheuttamaa rakenteiden vähittäistä hajoamista silloin kun puhutaan kymmenistä miljoonista vuosista – puhumattakaan lihaa rakastavista mikrobeista, joita on kaikkialla. Esimerkiksi [creation.com](http://creation.com)-sivustolta löytyy tästä paljon esimerkkejä hakusanalla *soft tissue* (ja myös suomeksi Luominen ry:n kotisivuilta).<sup>78</sup>

Bergman ja Snow toteavat ym. artikkelissaan, että evoluutioteorian kannalta on ongelmallista, että usein dinosauruksia ja lintuja sekä niiden jalanjälkiä löytyy samoista kerrostumista. Esimerkiksi vuonna 2002 Melchor ym. raportoivat tiedelehti *Naturessa* eräästä myöhäisen triaskauden (noin 210 miljoonaa vuotta) kerrostumasta löytyneistä *lintumaisista* jalanjäljistä (Argentiina).<sup>79</sup> Jäljet, joista itsekkin olen nähnyt valokuvan, vaikuttavat selviltä linnun jäljiltä, asiantuntijoiden mukaan kahlaajan, jolla isovarvas sijaitsee tarkalleen muita varpaita vastapäätä, piirre, jota dinosaurusten jalanjälissä ei ole koskaan havaittavissa. Kerrostuman ikä oli aikaisemmin varmistettu jo kahteen kertaan, joten tällä kertaa ei voitu vedota väärään ajoitukseen. Evoluutiouskomuksen mukaan ei kuitenkaan ole mahdollista, että tuolloin olisi ollut lintuja. Tutkijoiden mielestä näissä jäljissä on nykyisten kahlaajien jälkiin verrattuna ”lieviä poikkeavuuksia”. Siksi niiden väitetään kuuluvan ”tuntemattomalle theropodi-ryhmän dinosaurukselle, joka oli kehittänyt joitain lintumaisia piirteitä”. Tällaiset löydöt ovat melko yleisiä: usein jälkiä ja mikrofossiileja löytyy paljon vanhemmista kerrostumista kuin makrofossiileja.

{ Aikojen kuluessa näissä lintujen esi-isissä tapahtui rakenteellisia muutoksia: eturaajat kehittyivät }  
 { sulkapeitteisiksi **siiviksi** ja luusto keveni ” (s.128). }

Mennyttä maailmaa on asuttanut monipuolinen selkärankaisten joukko, joista osa oli nykyisistä melkoisesti poikkeavia; osalla oli mosaiikkimaisia piirteitä (kuten vesinokkaeläimellä, olmilla tai liejuryömijällä). Pienillä petodinosauruksilla ja lentokyvottomilla linnuilla (niin kuin joillain liskoilla ja nisäkkäilläkin) oli luustoissaan joitain samankaltaisuuksia. Esim. Kiinasta on löytynyt pieniä kaksijalkaisia theropodeja, jotka luustonsa puolesta muistuttavat Saksasta löytyneitä liskolintuja (*Archaeopteryx*).

Linnut (ja nisäkkäät) olivat dinosaurusten aikalaisia. Linnut tuskin kehittyivät puissa kiipeileistä dinosauruksista: Oppikirjamme väite ”Aikojen kuluessa näissä lintujen esi-isissä tapahtui rakenteellisia muutoksia: eturaajat kehittyivät sulkapeitteisiksi siiviksi”, viittaa siihen, että evolutionistit eivät halua olla tietoisia theropodien ja lentävien lintujen monen monista rakenteellisista (ja fysiologisista) eroavaisuuksista ja siitä, mitä valtavia haasteita niistä seuraa, kuten:

Lentävien lintujen ruumiin painopiste on edessä siipien tasolla, mutta kaksijalkaisten petosaurusten lantiossa. Lisäksi niillä, päinvastoin kuin lentokyvottomilla linnuilla, on pienet eturaajat. Miten painopiste siirtyi lantiosta siipien tasolle? Jossain vaiheessa, ennen lentokyvyn kehittymistä, eläin olisi juoksuun lähtiessään tussahtanut turvalleen. Vai tapahtuiko painopisteen siirtyminen yhden sukupolven vaihdoksen aikana?

77 Kellmer A., Fossilized theropod tissue, *Nature* 379:32, 1996. Kyseessä on Italiasta löytynyt noin 24-senttinen dinosauruksen poikanen, jonka ohut- ja paksusuoli, kuin myös hännän tyven lihakset olivat säilyneet.

78 [luominen.fi](http://luominen.fi)

79 Melchor R.N. et al. Bird-like fossil footprints from the late Triassic, *Nature* 417(6892):963–8, 2002.


Toinen merkittävä rakenteellinen ongelma on lintujen *lyhyt reisiluu*, joka sijaitsee kokonaan *vatsanpeitteiden sisällä*. Lisäksi lonkkanivel on jäykkä. Näin siksi, että reisiluiden pitää tukea vatsapuolen ilmapusseja. Ilman niitä hengityksen aikana syntyvä alipaine painaisi pussit kasaan ja lintu tukehtuisi. Siksi linnun sääri- ja nilkkaluut ovat pitkät ”kuten Heeroksella”, kuten Brusatte yllä totesi. Se, mitä me pidämme linnun polvena, onkin nilkka!

Dinosauruksilla oli matelijoiden ja nisäkkäiden tapaan paljekeuhkot ja pallea. Mutta linnuilla on vastavirtausperiaatteella toimivat tehokkaat läpivirtauskeuhkot ilmapusseineen (ilma virtaa vain yhteen suuntaan). Tämän systeemin kehittyminen vaatisi erikoisen reisiluun/lonkkanivelen lisäksi myös pallean vähittäistä häviämistä. Mutta tällöin eläin saisi jossain vaiheessa vaarallisen palleatyrän suolen mutkan kuroutuessa tyräporttiin. Vai tapahtuiko tämäkin muutos yhden sukupolven vaihdoksen aikana, jolloin dinosauruksen munasta kuoriutuikin lintu? Onko lintu ehkä sittenkin jonkinlaisen megamutaation tulos, ”toivottu hirviö” (hopeful monster), jota paleontologi

G. Simpson esitti 1950-luvulla, mutta joka lähes samantien tyrmättiin täydellisenä mahdottomuutena (ja hölynpölynä).

Entä takavuosina pilkan kohteena olleet olemattoman pienet ”linnunaivot”? Mitä mieltä olette hippiaisen nuppineulan pään kokoisista aivoista, joissa on paitsi kello, kompanssi ja allakka, myös maailmankartta? Kenties ”lisätoimintoina” myös ilmapuntari sekä ultraviolettivalo- ja infraääniaistit ja muutamia sävellyksiä keväisiä kosinta-aikoja varten.

Niinpä jotkut ovat esittäneet, että kehitys tapahtuikin päinvastoin: jotkut lentokykyiset linnut taantuivat pieniksi oksilta oksille liiteleviksi petodinosauruksiksi! Ja muut dinosaurukset kehittyivät jostain kauan sitten eläneestä liskon kaltaisesta eläimestä. Dinosaurusten suku on kuitenkin niin laaja joukko mitä erilaisimpia eläimiä, että niille on ollut vaikea löytää mitään yhteistä kantamuotoa, sellaista, jonka paleontologien enemmistö hyväksyisi. Jos myös lentoliskot ja joutsenliskot (ja ehkä myös kalaliskot) luetaan dinosauruksiin, niitä on ollut noin 50 mitä erilaisinta ja eri kokoisinta perustyyppiä, jolloin yhteisen kantamuodon kuvittelemiseen vaatii luovaa ajattelua.



**Linnun ”polvena” pitämämme nivel on todellisuudessa sen nilkka. (Lyhyt reisiluu muodostaa kylkiluiden tapaan osan ruuminontelon seinämää.)**

## Dinosaurusten aikakausi?

Yhdysvaltalainen lääkäri Carl Werner, josta enemmän Koulubiologian analyysissa, teki 14 vuotta kestäneen tutkimusmatkan 60 luonnontieteelliseen museoon ympäri maailman ja valokuvasi ja haastatteli alan asiantuntijoita. Hän keskittyi ”dinosaurusten valtakautteen” eli ”elämän keskiaikaan” (trias- jura- ja liitukausi 250–65 miljoonaa vuotta sitten). Hän päätti testata uusdarwinistista teoriaa epäsuorasti: jos teoria on totta, miljoonien vuosien aikana on tapahtunut niin paljon mutaatioita, muuntelua ja luonnonvalintaa, että dinosaurusten ajan eliöillä ei pitäisi olla elossa olevia, kaltaisiaan lajitovereita. Mutta jos eliöt on luotu ei-kovin-kaukaisessa menneisyydessä, evoluution geologiset aikakaudet ovat illuusio ja dinosaurusten ajan fossiileilla on elossa olevia, korkeintaan vähän muuntuneita jälkeläisiä.

Werner tutustui paleontologiseen ammattikirjallisuuteen ja otti museoista 60 000 valokuvaa. Hän siis keskittyi vain niihin fossiileihin, jotka oli kaivettu esiin samoista kerrostumista, joissa esiintyy myös dinosaurusfossiileja. Sitten hän vertasi museoista ja alan ammattikirjallisuudesta löytämiään tuhansia fossiileja nykyisin eläviin lajeihin sekä haastatteli useita paleontologeja ja muita alan asiantuntijoita. Tulos oli, että museoista ja paleontologisesta kirjallisuudesta löytyi *kaikkien nykyisin elävien eliöryhmien fossiileja*: löytyi selkärangattomien pääjakson kaikkien elossa olevien ryhmien edustajia (hyönteisiä, äyriäisiä, simpukoita, meritähtiä, koralleja, sienieläimiä, matoja jne.) siten, että nämä fossiiliset lajit muistuttavat elossa olevia lajeja niin selkeästi, että niitä on pidettävä samana lajina. Selkärankaisten pääryhmästä löytyi kaloja, sammakkoeläimiä, matelijoita, nisäkkäitä ja lintuja. Hait, rauskut, sammet, kampelat, lohet, sillit, nahkiaiset, sammakot, salamannerit, kuristajakäärmeet, maaliskot, liitävät liskot, kilpikonnat, krokotiilit, alligaattorit ja kaimaanit olivat samanlaisia kuin tänäänkin.

”Tietyissä mielessä ‘Dinosaurusten aikakausi’ -- on harhaanjohtava nimitys --. Nisäkkäät ovat juuri yksi sellainen tärkeä ryhmä, joka eli dinosaurusten kanssa, oli olemassa samaan aikaan dinosaurusten kanssa ja jäi eloon dinosaurusten jälkeen.”

Dr Carl Wernerin keskustelu Dr Zhe-Xi Luon, Pittsburghin Carnegie Museum of Natural Historyn selkärankaisten patologian intendentin ja tutkimuksen ja kokoelmien apulaisjohtajan kanssa, 17.5.2004 (*Living Fossils—Evolution: The Grand Experiment*, Vol. 2, New Leaf Press, 2009.)

Löytyi myös seuraavien **nykylintujen fossiileja**: papukaijoja, pöllöjä, pingviinejä, ankoja, kuikkia, albatrosseja, merimetsoja, kurppia ja avosetteja. Wernerin kirjassa on valokuva Milwaukeeen Public Museumista (2002): Kuvassa on rekonstruktio lintufossiilista, jonka museon työntekijät löysivät Montanan Hell Creekistä samasta paikasta, josta löytyi *Tyrannosaurus* ja sarvinaama-dinosaurius (*Triceratops*). Lintu on avosetti, pitkäkoipinen kahlaaja. Kirjassa on myös valokuva Wisconsinin yliopiston geologisessa museossa olevasta seinätaulusta, jossa esiintyy kaksi lentoliskoja ja kolme lorkkia. Mihin kuva perustuu, sitä ei kerrota. Lienevätkö lentoliskojen ja lorkkien fossiilit löytyneet samasta paikasta?

Tyrannosaurus rex, Palais de la Découverte, Paris. Copyright © 2005 David Monniaux, Wikimedia



Lintujen kuvat, Wikimedia Commons




**14 vuotta maailman luonnonhistorian museoita kiertäneelle Carl Wernerille selvisi, että valtava määrä nykyään elävien eliöiden fossiileja on löytynyt samoista kerroksista dinosaurusten fossiilien kanssa. Juuri missään museossa fossiileita ei kuitenkaan ollut näytteillä dinosaurusten fossiilien kanssa. Onko tämä vahinko, vai johtavatko museot tarkoituksella ihmisiä harhaan?**

Entä mitä Benton sanoo tästä? Luku 9.4.1: Cretaceous neornithines: ”Vuoteen 2000 mennessä on rekisteröity yli sata liitukautista<sup>[80]</sup> nykylinnun fossiilia. Kuitenkin, suurin osa vanhemmista löydöistä, joihin kuuluu lentokyvyttömiä lajeja, ankkvoja, flamingoja, pelikaaneja, kuikkia ja tikkoja, on hylätty joko siksi, että fossiilit ovat olleet liian puutteellisia, että olisi varmasti voitu päätellä, mikä lintu on kyseessä, tai sitten ajoitus on ollut väärä.” (Mutta jos lajit on fossiilien perusteella voitu määrittää, miten ne ovat voineet olla ”liian puutteellisia”? Ja onko ajoituskaan niin väärä, jos kuitenkin tiedetään, että kyseessä on ”vanhempi löytö”?) Benton kuitenkin myöntää, että on löytynyt muutamia hyväksyttävii fossiileja (kuikkia, ankkvoja, hanhia ja pelikaaneja). Werner taitaa olla oikeassa?

80 Paleontologien liitukausi oli siis 145–65 miljoonaa vuotta sitten.

”Me löydämme nisäkkäitä melkein kaikista [dinosaurusten kaivaus-] kohteistamme. Niitä ei huomioitu vuosia sitten [– –] Meillä on noin 9 000 kg nisäkkäiden fossiileja sisältävää bentoniittisavea, jota olemme yrittäneet antaa pois jollekin tutkijalle. Ei sillä, että ne eivät olisi tärkeitä. Asia on vain niin, että elät vain kerran, ja minä erikoistuinkin johonkin muuhun kuin nisäkkäisiin. Erikoistuinkin matelijoihin ja dinosauruksiin.”

Dr Carl Wernerin keskustelu College of Eastern Utah Prehistoric Museumien selkärankaisten paleontologian intendentin Dr Donald Burgen kanssa, 13.2.2001, kirjassa *Living Fossils—Evolution: The Grand Experiment*, Vol. 2, New Leaf Press, 2009, s. 173.



**Löydöt on dokumentoitu kuvineen päivineen englanninkielisessä kirjassa *Living Fossils –Evolution: The Grand Experiment Vol 2.***

## BIOS 1 / Luku 12: Ihmisen evoluutio alkoi kädellisistä nisäkkäistä

} ”Ihmisen evoluution kaikkia vaiheita ei vielä tiedetä, mutta tiedot tarkentuvat jatkuvasti” (s.133). }

”Mutta tiedot tarkentuvat jatkuvasti.” Tämä kuulostaa omituiselta: Pikemminkin vaikuttaa siltä, että mitä pidemmälle aika kuluu, sen lahonneemmalta fossiilien mukaan laadittu sukupuumme näyttää: huominen voi taas jälleen kerran muuttaa kaiken, totesi Juha Valste kirjassaan *Apinasta ihmiseksi*.<sup>81</sup> On kuitenkin olemassa tieteen ala, jossa tiedot ihmisen polveutumisesta ”tarkentuvat jatkuvasti”. Tarkoitin genetiikkaa, perinnöllisyystiedettä: Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä suuremmaksi käyvät geneettiset erot ihmisen ja simpanssin välillä ja sitä kauemmaksi ajaudumme toisistamme Darwinin elämänpuun oksilla. Siitä lisää alkaen sivulta 97.

} ”Noin 12 miljoonaa vuotta sitten Afrikassa käynnistyi valtava geologinen mullistus: Afrikan mannerlaatta alkoi hajota kahteen osaan ja syntyi suuri Itä-Afrikan hautavajoama. – Idän puoleisella alueella sateet vähenivät ja ilmasto muuttui kuivemmaksi, minkä seurauksena sademetsät joutuivat väistymään metsäsavannien tieltä. – Hautavajoama toimi **isolaatiotekijänä**, ja populaatiot kehittyivät erilaisiksi” (s. 134). }

Seuraavan sivun tarina esitellään ikään kuin luonnontieteellisenä tietona:

} ”Ensimmäiset ihmisen kehityslinjan edustajat olivat **metsäsavanneilla** eläviä **apinaihmissiä**, jotka kävelivät pystyasennossa ja osasivat käyttää alkeellisia työkaluja. Niiden aivojen koko oli kuitenkin edelleen sama kuin simpansseilla, noin 500 cm<sup>3</sup>. Apinaihmissiin kuuluivat muun muassa *Australopithecus*-suvun edustajat.

} **Pystyasennosta** oli savannilla useita etuja. Seisten oli helpompi havainnoida ympäristöään ja iholle kohdistuva auringonsäteily väheni merkittävästi. Kahdella jalalla liikuttaessa myös nopeus lisääntyi ja energian kulutus väheni. Liikkumistavan muutos vapautti kädet muun muassa ravinnon kuljetukseen sekä työkalujen, kuten oksanpätkien ja kivien käyttöön. Lisääntyvä liikkuminen ja auringon paahde avoimessa ympäristössä lisäsivät elimistön lämpenemistä. Tämän seurauksena karvapeite ei ollut enää kilpailuetu ja karvoitus alkoi vähentyä. Vähäinen karvoitus ja hikirauhaset tehostivat lämmön poistumista elimistöstä. Apinaihminen käytti ravinnokseen raakaa lihaa ja erilaisia kasveja.”

Samalla sivulla on taiteilijan loihtima kuva etelänapinapariskunnasta (*Australopithecus*), joita siis kutsutaan apinaihmisiksi. Loppuliite ”ihminen” lienee lisätty siksi, että oletettu polveutumistemme tästä eläimestä menisi paremmin myös rahvaan kaaliin.

81 Tarkkaa sanamuotoa ja kirjan sivua en muista.

Jo pitkään on kuitenkin ollut selvää, että etelänapinoista ei voida johtaa minkäänlaista kehityslinjaa ihmisen sukuun *Homo*: kaikki sukuun *Homo* kuuluvat, kuten heidelbergin ihminen, ovat olleet oikeita ihmisiä. Uudemmat löydöt, kuten *Australopithecus sediba*, eivät ole tuoneet ongelmaan mitään lisävalaistusta. Siksi paleoantropologit puhuvat ”hyppäyksellisestä” evoluutiosta: kehityso pillisen aukon yli tehdään evoluutioloikka etelänapinasta ihmiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että jossain pienessä, eristäytyneessä populaatiossa tapahtui niin äkillinen evoluutiopyrähdyks, että siitä ei voinut jäädä mitään fossiileja todisteeksi. – Onko tämä tiedettä? Todisteiden puute todistaa ihmisen evoluution?

Silti etelänapinat ovat olleet kiintoisa tutkimuskohde: Kyseessä on melko monimuotoinen, sukupuuttoon kuollut afrikkalainen kädellisryhmä, jonka luuston anatomia viittaa siihen, että niiltä pystykävely on saattanut luonnistua paremmin kuin simpansseilta. Niiden luiden rakenne ja mittasuhteet viittaavat kuitenkin selvästi siihen, että ne olivat kiipeilijöitä ja etenivät pääosiltaan nelivetoisesti: lapaluun nivelpinta, johon olkaluu niveltyy, osoittaa lievästi ylöspäin (esim. *A. sediba*), yläraajat ovat yhtä pitkät kuin alaraajat, sormet ja varpaat ovat pitkät ja käyrät, ranne voidaan lukita ns. rystykävelyasentoon, kaularanka liittyy kallonpohjan takaosaan eikä korvan tasapainoelin viittaa pystyasentoon. Aivot, vaikka niiden koko ei välttämättä korreloi älykkyystasoon, olivat kuitenkin pienet (n. 500 cm<sup>3</sup>, ihmisellä keskimäärin 1350). Eikä pystykävelykään ole ihmisyyden tunnusmerkki: Italiasta löytynyt *Oreopithecus bambolii* vaikuttaa olleen pystyasennossa kulkenut kädellinen, jonka iäksi on arvioitu 7–9 miljoonaa vuotta. Se ei kuitenkaan sovi evoluutiotarinaan, sillä ihmisen piti kehittyä Afrikassa vasta paljon myöhemmin. (Ja pingviinitkin ovat pystyasentoisia.)

Polveutumismme etelänapinoista ei ole uskottavaa senkään valossa, että ne elivät ihmisen kanssa samaan aikaan. Oppikirjammekin mukaan suku *Homo* on lähes kolmen miljoonan (2,8) vuoden ikäinen. *Kaikki* homo-suvun muinaiset edustajat, ”rodut”, ovat olleet oikeita ihmisiä, kuten pystyihmiset, neandertalilaiset, denisovan ihmiset jne. (*H. ergaster*, *H. erectus*, *H. antecessor*, *H. heidelbergensis*, *H. neanderthalensis*, *H. georgicus*, *H. denisovensis* etc.) Ainoastaan muuan 1950–60-lukujen taitteessa löytynyt ”luuläjä” ristittiin hätäisesti ja väärin homo-sukuun kuuluvaksi, ns. ”käteväihmiseksi” (*Homo habilis*). Sen luut löytyivät melko laajalta alueelta ja ne koostuvat ilmeisesti kahden, ellei kolmenkin eri lajin jäänteistä. (Lisäksi 1970-luvulla löytynyt *Homo rudolfensis*, satoihin paloihin pirstoutunut kasvoton kallo KNMER-1470, oli pitkä ja mielenkiintoinen episodi ihmisen oletetussa kehityshistoriassa, ks. sivu 89).



Wikimedia, José-Manuel Benito Álvarez, Locutus Borg

**Kiistanalainen *Homo rudolfensis*, kallo KNMER-1470.**



1990-luvulla löytyneistä ja laajalle alalle levinneistä luun sirpaleista rekonstruoitiin uusi esi-ihmissuku, *Ardipithecus*, jonka piti olla yli viisi miljoonaa vuotta vanha. Vuonna 2001 Tsadista löydettiin rapautumassa olevasta hiekkakivestä pilkistävä lähes täydellinen kallo, kaksi alaleuan palaa ja kolme hammasta. Niistä rekonstruoitiin sahelinapinaihminen<sup>82</sup> (*Sahelantrophus*), jonka piti olla seitsemän miljoonan vuoden ikäinen. Aivotilavuudeksi arvioitiin vaatimattomat 350cm<sup>3</sup>, mutta litteä naama ja paksut luuharjanteet silmien yläpuolella muistuttivat pystyihmistä. Kallon löytäneen ryhmän johtaja, paleontologi Michel Brunet esittikin arvion, että *Sahelantrophus* liikkui pystyasennossa! On mielestäni huolestuttavaa, että tieteen edustajana esiintyvä paleontologi esittää tällaisia käsityksiä pelkästään aivokopan ja naaman luiden perusteella, arvio, jonka populaarimedian toimitajat – tai viimeistään heidän lukijansa, vääntävät faktaksi: *Sahelantrophus* käveli kahdella jalalla ja oli siis esi-ihminen, ihmisen esi-isä on löytynyt! (Vaikka kaksijalkaisuudella ei siis välttämättä ole mitään tekemistä ihmisyyden kanssa.) Pariisin luonnonhistorian museon johtaja, paleontologi Brigitte Senut, oli sitä mieltä, että kallo ei kuulu ihmisen esi-isälle, vaan naarasgorillalle (jonka kallon morfologia käy läpi melkoisia muutoksia lapsuudesta vanhuuteen). Kuitenkin, yhden ainoan kallon perusteella, luotiin kokonainen uusi esi-ihmissuku.

Ja *Ardipithecuksen* piti olla ihmisen kehityksen ”Rosettan kivi” vuonna 2009, ”Darwinin juhluvuonna”, jolloin sitä hehkutettiin lähes kyllästymiseen saakka. Kuitenkin, jopa löydön tehneet tunnustivat, että laajalle alalle levinneet luunsirpaleet olivat kuin ”katujyrän alle jääneitä”.

Löytäjiensä mielestä nämä molemmat ym. fossiilit pudottivat nuoremmat etelänapinat ihmisen sukupuusta. Löytöjä tehneillä (kuten Leakeyn perhe, White, Johanson, Brunet jne.) onkin ollut katkeria keskinäisiä kiistoja ja mediakampanjoita omien fossiiliensa puolesta. Esimerkiksi Richard Leakey oli niin närkästynyt Donald Johansonin vuonna 1974 löytämästä *Lucysta* (etelänapina), että hän väitti sen olevan ”kipsistä loihdittua mielikuvitusta”.

Vuonna 2015 homo-suku vanheni siis puolella miljoonalla vuodella kun Etiopiasta pari vuotta aikaisemmin löytyneen alaleuan varmistettiin kuuluvan homo-suvun edustajalle ja iäksi oli saatu määritettyä 2,8 miljoonaa vuotta (kuva kirjamme sivulla 133). Keväällä 2017 ”moderni ihminen” *Homo sapiens* vanheni puolestaan sadalla tuhannella vuodella, kun Marokosta löydettiin nykyihmisen muotoinen kallo. Saman vuoden syksyllä tiedelehti *Science* julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan Afrikassa syntynyt nykyihminen ei muuttanutkaan sieltä pohjoiseen vasta 60 000 vuotta sitten, vaan ensimmäisen kerran jo 60 000 vuotta tätä aikaisemmin. – No, tätä voi tietysti kutsua ”tietojen tarkentumiseksi”. Jatkuvat päivitykset ja päivityksien päivitykset kuitenkin viittaavat siihen, että ihmisen varmana pidetystä evoluutiosta ei sittenkään taida olla kovin varmaa tietoa: Kaikki tähän mennessä löytyneet fossiilit (usein erittäin pirstoutuneita ja isolle alalle levinneitä) ovat osoittautuneet joko sukupuuttoon kuolleille kädellisille tai aidoille ihmisille kuuluviksi. Monet tutkijat ovat myöntäneet, että jos tavallisesti pukeutunut pystyihminen tai neandertalilainen tulisi meitä kadulla vastaan, kukaan ei kiinnittäisi häneen mitään huomiota.

82 Huomaa: ”ihminen”. Kallorekonstruktio ei kyllä kovin helposti tuo mieleen ihmistä (ks. esim. Wikipedia: *Sahelantrophus tchadensis*).

Jätän käsittelemättä v. 2015 suurta huomiota herättäneen oudon fossiililöydön erästä eteläafrikkalaisesta luolastosta. Kyseessä on noin 1550 luuta tai niiden osaa, joiden on arveltu kuuluvan 15 eri yksilölle. Luiden omistajille annettiin lajinimi *Homo nadeli*. Löytö innostutti, sillä luiden arvioitiin olevan jopa 2,5 miljoonan vuoden ikäisiä. Vuonna 2017 into laantui, kun löydön ”viralliseksi iäksi” vahvistui noin 300 000 vuotta. Joidenkin mielestä luut ovat joutuneet sokkeloiseen luolastoon tulvavesien kuljettamina.

BIOS 1:n sivulla 135 on kuva simpanssin ja ihmisen luurangosta sekä niiden viidestä eroavaisuudesta. Jo ne ovat merkittäviä, monista muista, paljon suuremmista eroista puhumattakaan:


1. *Ihmisen pää on hyvin tasapainossa selkärangan yläpäässä. Ihmisapinoilla vahvat niskalihakset pitävät päätä pystyssä.*
2. *Ihmisen selkärangassa on kaksi mutkaa eteenpäin, kaulan ja alaselän kohdalla. Mutkat auttavat säilyttämään tasapainon pystyasennossa. Simpanssin seisoessa kahdella jalalla sen ruumiin painopiste on jalkojen etupuolella, mikä tekee sen asennosta epävakaan.*
3. *Ihmisen lantio on leveämpi ja matalampi kuin ihmisapinoilla.*
4. *Ihmisen alaraajat ovat pidemmät kuin yläraajat.*
5. *Ihmisen alaraaja ojentuu suoraksi kävellessä.*

Yllämainittuihin lisäksi kuudenneksi merkittäväksi eroavaisuudeksi ihmisen jalan (nilkka, kantapää, jalkaterä ja varpaat) – tosin paljon muutakin lisättävää olisi.

## Nivelten ”4-bar -mechanism” ei voi kehittyä

Käsittelen lyhyesti vain polvea ja jalkaa: Kädellisistä vain ihminen pystyy lukitsemaan polvinivelensä lievään yliojennukseen. Tämä on keskeinen vaatimus pitkään seisomisen ja kestävyysjuoksun kannalta. Ihmisen polvinivel on *uniikki* eli ainutlaatuinen: Vain ihmisen polvinivelessä on mekanismi, josta käytetään englanninkielistä termiä *four-bar-mechanism* eli ”neljän tangon mekanismi”. Se tarkoittaa sitä, että nivel *ei ole kiinteästi saranoitu* kuten esimerkiksi olkaluu-kyynärloo – nivel (tai ovi); kiinteää saranaa ei ole vaan tukipiste muuttuu koko ajan nivelen asennon muuttuessa. Tämän varmistavat etu- ja takaristiteet, jotka muodostavat kaksi ensimmäistä ”tankoa”. 3. ja 4. tangon muodostavat janat, jotka reisi- ja sääriluun nivelpinnoilla yhdistävät toisiinsa ristisiteiden kiinnittymispisteet.

Ihmisen polvessa tapahtuu ainakin neljäsuuntaista liikettä: koukistus, ojennus, kierto sekä nivelpintojen liukuminen toistensa suhteen etu/takasuunnassa (kenties myös sivusuunnassa?). Tärkeitä ovat myös nivelkierukat, sivusiteet ja polvilumpio jänteineen sekä polven seutuun kiinnittyvät lihakset. Ristisiteet on *hermotettu* siten, että ne aistivat asennon ja ennen kaikkea äkillisen asennon muutoksen: Jos meinaamme kaatua eteen polven ollessa koukistettuna, takaristiside antaa varoituksen reisilihakselle, jotta polvi ei koukistuisi liikaa ja emme kaatuisi.



Wikimedia, Cdang, Salix alba, CC BY-SA 3.0.

**Erityyppisiä ”neljän tangon mekanismeja” (s = lyhin linkki, l = pisin lenkki). Se on nerokas, palautumattoman monimutkainen rakenne, joka ei voi kehittyä vähitellen.**

4-bar-mekanismi on palautumattoman monimutkainen rakenne, joka ei voi kehittyä vähitellen: se joko toimii tai ei toimi. Kaikki osat tarvitaan heti ja täydellisen oikein asennettuina. Apinan polvi ei voi muuntua ihmisen polveksi satunnaisten mutaatioiden kautta, eikä geneeissä siis edes ole risticiteiden ”piirustuksia” eikä ohjeita niiden kiinnityspisteistä. Samanlainen mekanismi löytyy luukalojen leuoista sekä sudenkorentojen ja lintujen siivistä. Miten linnuksi muuntuneen dinosauruksen eturaaja sai siipeen tarvittavan 4-bar-mekanismiin?

Ihmisen jalka, kuten polvi, ja koko muu liikuntaelimistö, vaikuttaa olevan suunniteltu sekä seisomista että kestävyysjuoksua varten: Kirurgin pitää pystyä seisomaan leikkauspöydän ääressä tarvittaessa vaikka koko päivän. Keskipäivän kuumuudessa hikoilulla ruumiinlämpönsä kurissa pitävän afrikkalaisen pitää kyetä juoksemaan saaliinsa, kuten antiloopin näännyksiin. Pitkä akillesjänne ja erikoisrakenteinen jalkaterä toimivat hybridimoottorin tavoin: Kun jalkaterä osuu maahan, iskuenergia varastoidaan akillesjänteeseen ja jalkaterään seuraavaa ponnistusta varten. Ihmisen jalan jälki on selvästi erotettavissa muiden kädellisten kuten ”apinaihminen” jäljistä: Ihminen on kanta-astuja, jolla on pitkä jalkaterä ja lyhyet varpaat, iso ja voimakas ukkovarvas on lähes muiden varpaiden suuntainen. Jalkakirurgiaan erikoistunut kollegani kuvasi ihmisen jalkaa (nilkka, kantapää, jalkaterä, varpaat) ”nerokkaasti suunnitelluksi pirunnyrkiksi”.

## Liian vanhoja ihmismäisiä jalanjälkiä

Miljoonien vuosien ikäisiksi arvioituja ihmismäisiä jalanjälkiä on löydetty, mutta ne koetetaan aina selittää apinaihminen jäljiksi (tai niiden ikä virheellisesti määritetyiksi). Viimeisin löytö on Kreetalta, josta *Proceedings of the Geological Society* raportoi elokuussa 2017 (Gerard Gierliński).<sup>83,84</sup> Ne on arvioitu 5,7 miljoonan vuoden ikäisiksi. Tutkijoiden mukaan jälkien tekijä oli kaksijalkainen, viisivarpainen<sup>85</sup> hominini<sup>86</sup>, kanta-astuja, jolla ei ollut kynsiä lyhyissä varpaissaan ja jonka jalka oli ”strongly entaxonic”<sup>87</sup>. Tutkimusraportin mukaan jälkien tulkinta on ”potentiaalisesti ristiriitainen”. Professori Per Ahlbergin mukaan, ristiriitaisen tulkinnasta tekee niiden ikä (liian vanhoja) ja sijainti (väärällä mantereella). Mikä muu ”hominini” kuin ihminen on kaksijalkainen ja lyhytvarpainen kanta-astuja? Muita liian vanhoja jälkiä on löytynyt mm. Tansanian Laetolista ja Kenian Ileretistä (ks. Koulubiologian analyysi I). (Kirjassamme on sivulla 144 valokuva dinosauruksen jalanjäljestä.)

83 Gierliński, G.D., *et al.*, Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete? *Proc Geol Assoc*, August 2017 | <https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2017.07.006>. Julkaisun abstrakti-osiossa sanotaan: Näiden jalanjälkien tulkinta on mahdollisesti kiistanalainen. (Suomennettu englannista, korostus lisätty.)

84 MacDonald, C., The mystery trail of 5.7 million year old fossilised footprints in Greece that could shake up our understanding of human evolution, [dailymail.co.uk](http://dailymail.co.uk), September 2017. Uutisessa lainataan erästä julkaisun kirjoittajaa, professori Per Ahlbergia: ”Kiistanalaisen tästä [löydöstä] tekee jalanjälkien ikä ja sijainti” (Suomennettu englannista, korostus lisätty).

85 Jäljet viittaavat siihen, että niiden tekijä oli lyhytvarpainen (eikä pitkäkyntinen).

86 Hominini tarkoittaa afrikanihmisapinoita (joihin myös ihminen luetaan).


87 Entaxonic on kehitysopillinen käsite, jossa jonkun eläimen sisimpien varpaiden (vastaten ihmisen peukaloa ja isovarvasta) katsotaan kehittyneen pidemmälle kuin ulommat varpaat.

## Kun aivot kasvoivat syömällä

”Vanhimmat varhaisten ihmisten fossiilit on ajoitettu noin 2,8 miljoonan vuoden taakse. Varhaisten ihmisten **aivojen koko** oli kaksi kertaa suurempi kuin apinaihmisillä. Suuremmat aivot muuttivat ihmisen käyttäytymistä, erityisesti ravinnon hankinta tehostui. – Tärkeä ravintoon liittyvä keksintö oli **tulen käyttö**. Kun liha kypsennettiin, sen sisältämät ravintoaineet imeytyivät paremmin suolistosta vereen. Kypsennyksen ansiosta myös suuri osa ravinnon sisältämistä haitallisista mikrobeista kuoli. Ravinnosta saatu lisäproteiini ja -energia edistivät aivojen kasvua” (s.136).

Väite ”ravinnosta saatu lisäproteiini ja -energia edistivät aivojen kasvua”, on naiivi: aivot kasvoivat syömällä, vaikka todellisuudessa se on vyötärön ympärystä, josta saa syömällä lisäsenttejä.

Samalla sivulla on taiteilijan rumentama kuva ”varhaisesta ihmisestä”, 600 000–400 000 vuotta sitten eläneestä heidelbergpariskunnasta (*Homo heidelbergensis*). Taiteilijalle on mitä ilmeisimmin annettu ohjeeksi luoda vaikutelma apinamaisesta puoli-ihmisestä, vaikka heidelbergiläinen oli aito ihminen, jonka aivotilavuudeksi on laskettu keskimäärin 1275 cm<sup>3</sup>. Samalla sivulla kuvassa 2 on ”varhaisen ihmisen” kallo; aivotilavuus 850–1100 cm<sup>3</sup> eli samaa luokkaa kuin monilla nykyihmisillä (kuten Anatoli France’lla, joka voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon v. 1920). Tämä kallo kuulunee pystyihmiselle (*Homo erectus*), jonka uskottiin kuolleen sukupuuttoon noin 400 000–500 000 vuotta sitten. Kuitenkin Kiinasta, ns. punaisen peuran luolasta löytyi jo 1980-luvulla pystyihmisen reisiluu, joka vuonna 2016 ajoitettiin vain 14 000 vuoden ikäiseksi.



**Tiedämme, että ylenpalttinen ravinnonsaanti näkyy vyötärön seudulla. BIOS 1 väittää, että se olisi suurentanut aivojakin.**

”Vanhimmat nykyihmisen fossiilit ovat vain noin 200 000<sup>[88]</sup> vuotta vanhoja, ja ne on löydetty Etiopiasta. Aluksi nykyihmisten määrä kasvoi Afrikassa jopa miljooniin yksilöihin ja he levittyivät eri puolille Afrikkaa ja aina Lähi-itään asti. Noin 70 000 vuotta sitten tapahtui kuitenkin suuri ympäristökatastrofi: ilmasto viileni merkittävästi, ja sen seurauksena ravinto kävi vähiin. Syyksi ilmaston viilenemiseen arvellaan Indonesiassa tapahtunutta valtavaa tulivuorenpurkausta, joka laski maapallon lämpötilaa jopa 12 astetta. Katastrofi aiheutti **pullonkaulailmiön**. Nykyihmisiä kuoli massoittain, ja jäljelle jäi vain noin 10 000 Afrikassa elävää yksilöä, joiden jälkeläisiä kaikki maapallolla nykyisin elävät ihmiset ovat” (s.137).

Kirjamme mukaan ihmissuku olisi lähtenyt 10 000 yksilöstä uuteen kasvuun noin 65 000 vuotta sitten. Mikäli tämä pitäisi paikkansa, 1900-luvun kaltainen väestöräjhdys olisi tapahtunut jo tuhansia vuosia sitten ilman nykylääketiedettä ja nykytekniikkaakin (tosin ehkä hieman hitaammin). Ihmisiä olisi pitänyt elää satoja miljardeja jopa pienen väestökasvun mukaan laskettuna. Jo alle 10 000 vuodessa muutaman yksilön alkupopulaatio kasvaisi helposti nykyiseen 7 miljardiin.

Vaikka väestönkasvu olisi muinaisuudessa ollut kaksi tai jopa neljä kertaa hitaampaa kuin viime vuosisatoina, maailmassa olisi ym. tulivuorikatastrofin jälkeen pitänyt silti elää niin monta miljardia nykyihmistä, että suuria määriä heidän luitaan ja erityisesti *hampaita* pitäisi löytyä melkein mistä vain. Viimeisten vuosisatojen aikana planeettamme pintaa on kaivettu ja tongittu niin paljon, että jotain olisi tähän mennessä pitänyt jo löytyä. Missä he kaikki ovat? – Vai onko niin, että heitä ei sittenkään ole ollut niin paljon? Jos tulivuoriteorian sijasta ottaisimme lähtökohdaksi mytologiana pidetyn kertomuksen Nooan arkista, lähti ihmiskunta sen mukaan uuteen kasvuun kolmesta pariskunnasta noin 4 500 vuotta sitten. Jos oletamme, että heidän jälkeläistensä joukko, ehkä 10–20 henkeä tuplaantui kerran 150 vuodessa, heidän lukumääränsä olisi vuoteen 2 000 mennessä kasvanut muutamaan miljardiin.

Sivuilla 136-7 on kuvasarja: Apinaihmissen kallo 500 cm<sup>3</sup>, varhainen ihminen 850 – 1100, neandertalilainen 1500 ja nykyihminen 1350. Tämä on mielenkiintoinen ”paljastus”: Juuri aikaisemmin oli korostettu sitä, miten aivojen kasvu oli keskeistä tiellä kohti ihmisyttä. Sivulla 137 todetaan myös, että ”Nykyihmisellä oli monia sellaisia ominaisuuksia, jotka tekivät lajista niin kilpailukykyisen, että kaikki muut ihmisen sukuun kuuluvat lajit kuolivat vähitellen sukupuuttoon”. – Siis myös neandertalinihminen, jonka aivot olivat selvästi nykyihmistä kookkaammat?

Ihmisen hämärä kehityshistoria ei ole osoittautunut ainakaan yhtään sen selvemmäksi senkään jälkeen kun alan kotimainen asiantuntija Juha Valste kirjoitti kirjansa *Apinasta ihmiseksi* (2004) ja *Ihmislajin synty* (2012). Kirjat ovat tosin mielenkiintoista luettavaa, mutta niistä ei löydy vastausta siihen, mihin nimet viittaavat: evoluutioon apinasta ihmiseksi. Hänen viimeisin (?) kirjansa *Neandertalinihminen – kadonnut lajitoveri* on siinä mielessä hyvä, että se ”tunnustaa” pystyihmisen ja neandertalinihmisen aidoksi ihmiseksi (homo).

Sivulla 140 on ”vaelluskartta”, nykyihmisen levittäytyminen Afrikasta. Sivulta 142 löytyy ihmisen sukupuu. Nämä siis vuosimallia 2016 ja tarvitsisivat päivytystä. Sukupuun apinaihmissen (kuten etelänapinat) kohdalla on sana ”pystyasento”. Mitähän se tarkoittaa? Eivät ne ainakaan kaksijalkaisia olleet. Ehkä epämääräisellä pystyasennolla halutaankin vain vahvistaa koululaisten uskoa ihmisen evoluutioon?

## BIOS 1 / Luku 13: Evoluutiota tutkitaan monella tavalla

### Fossiilien ikä voidaan määrittää tarkasti (s.144)

} ”Fossiilin suhteellinen ikä saadaan selville **johtofossiilien avulla**” (s.144). }

### Johtofossiiliajoitus on kehäpäätelmä

Johtofossiiliajoitus on kehäpäätelmä. Sen oikeaksi todistamaton premissi, lähtökohta, on, että Darwinin ”perusteoria” vuosimallia 1859 pitää edelleenkin paikkansa. Sen mukaan eliöiden on täytynyt kehittyä teorian mukaisessa järjestyksessä. Ja koska *osa* fossiileista on teorian mukaisessa järjestyksessä, Darwinin teoria on totta: simpukat kehittyivät ennen kädellisiä.<sup>89</sup> Entä mikä määrää kerrostuman iän, josta fossiili X löytyi? Radiometria? Ei, vaan johtofossiili. Entä mikä määrää johtofossiilin iän? Radiometria? Ei, vaan kerrostuma. Entä mistä vuosiluvut on saatu? Uniformitarianismista, 1800-luvun kyseenalaisesta opista, jonka mukaan sedimentit ovat kerrostuneet aina *samalla tasaisella ja hitaalla nopeudella* vuosimiljoonia, noin 0,2 mm. vuodessa.<sup>90</sup> Kun kerrostuman paksuus ja fossiilin syvyys on mitattu, ikä lasketaan siitä, esimerkiksi johtofossiileina pidetyille ammoniiteille 65–400 miljoonaa vuotta. Jos kerrostuman ikä (joka jo ”tiedetään” johtofossiilista), koetetaan kuitenkin määrittää myös radiometrialla (esim. K-Ar), ikä hylätään *aina*, jos se ei osu ”oikeaan haarukkaan” (ks. alle). Tällaisissa tapauksissa voidaan menetellä siten, että koetetaan löytää jokin toinen isotooppi siinä toivossa, että saataisiin ”parempi ikä”. Menetelmät ovat kuitenkin olleet kalliita ja työläitä, joten jos lähistöltä on löytynyt sopiva johtofossiili, ikä on määritetty sen perusteella.

Johtofossiilihypoteesiin ja ikämäärittäykseen liittyy myös se itsestäänselvyys, että syvemmät kerrostumat ovat pinnallisempia vanhempia. Tämän kerrostumislain esitti kreationistinen geologi Nicolaus Steno (1638–1686). Hän uskoi, että geologiset kerrostumat ovat syntyneet *vertikaalisti* (alhaalta ylös) ns. ”rauhallisten merten aikana”. Monet kerrostumat (kuten kuutiokilometrien suuruiset turbidiitit) viittaavat kuitenkin suurten ja nopeasti virranneiden vesimassojen katastrofaalisiin vaikutuksiin: tällöin laajoille, jopa satojen tuhansien neliökilometrien suuruisille alueille levittäytyneet veden kuljettamat kivettyneet sedimenttikerrostumat ovatkin muodostuneet *sekä horisontaalisti että vertikaalisti*. Näitä vesimassojen liikkeitä vaikuttaa tapahtuneen jaksoittain eli välillä on ollut rauhallisempia aikoja. Eroosion synnyttämä maa-aines (hiekkä, sora jne.) käyttäytyy virtauksissa eri tavoin: karkeampi aines sakkautuu ensin eli sitä jää enemmän yläjuoksulle kuin hienojakeista hiekkää. Tällöin useita kerrostumia voi syntyä nopeasti peräkkäin ja jopa samaan aikaan laajalla alueella. Niinpä esimerkiksi virtauksen yläjuoksulla sijaitseva, karkeammasta aineksestä muodostunut toiseksi syvin kerrostuma voi olla saman ikäinen kuin alajuoksulla sijaitseva alin ja hienommasta aineksestä koostuva kerros. [Tämä perustuu Julienin, Lanin ja Berthaultin 1990-luvun alkupuolella tekemiin sedimentaatiokokeisiin: Experiments on Stratification of Heterogenous Sand Mixtures, *Creation ex nihilo Technical Journal* 1994,8;1:p.37-50 (nykyään *Journal of Creation*).]

89 Väärä järjestys selitetään mm. ”kerrosvuodolla”.

90 Tämän luvun (0,2mm/v) määrittä Liverpoolin geologisen seuran presidentti Thomas Reade v. 1879.

Kerrostumien iäkiä arvioitaessa pitäisi siis osata huomioida 3-ulotteisuus: saman neliömetrin alempi kerrostuma on tietysti ylempää vanhempi. Mutta paikassa A sijaitseva syvin kerrostuma voi olla saman ikäinen, tai jopa nuorempi kuin saman muinaisen virtauksen yläjuoksulle paikkaan B kasaama pinnallisempi kerrostuma. Tämä tekee eri paikoissa sijaitsevien kerrostumien keskinäisistä ikävertailuista vaikeita. Pitäisi tietää minkä laatuinen ja minkä suuntainen virtaus sedimentit on synnyttänyt.

## Radioaktiivisen iänmäärittämisen sudenkuoppia

*”Fossiilien tarkassa iänmäärittämisessä käytetään apuna radioaktiivisia aineita. Radioaktiivinen iänmäärittäminen perustuu siihen, että määrittämisessä käytetty radioaktiivinen aine hajoaa tietyllä vakionopeudella. – Eliöihin kertyy niiden elinaikana radioaktiivisia aineita, jotka hajoavat hitaasti niiden kuoleman jälkeen. Maasta kaivetun fossiilin ikä voidaan selvittää kartoittamalla radioaktiivisen aineen ja sen hajoamisen tuloksena syntyneen aineen määrät fossiilista tai sitä ympäröivästä kivikerroksesta” (s.144).*

Huomaa: ”Eliöihin kertyy niiden elinaikana radioaktiivisia aineita, jotka hajoavat hitaasti niiden kuoleman jälkeen.” Minkälaisia muita radioaktiivisia aineita kuin radiohiiltä muinaisiin eliöihin kerääntyi niiden elinaikana (huomaa monikossa: ”aineita”)? Ei muuta kuin radiohiiltä, joka hajoaa nopeasti! (Puoliintumisaika noin 5700 vuotta.) Kirjan mukaan vanhoissa, yli 60 000 vuoden ikäisissä fossiileissa ei pitäisi olla lainkaan radiohiiltä. Näin on – tai ei ainakaan missään tapauksessa yli 90 000 - 100 000 vuoden ikäisissä eloperäisissä näytteissä. Silti sitä löytyy kaikista eloperäisistä, vanhoina pidetyistä näytteistä (kivihiili, öljy, maakaasu, dinosaurusten luut jne.) suurin piirtein samoina pitoisuuksina maailmanlaajuisesti.

CENOZOIC ERA (Age of Recent Life)	Quaternary Period	<i>Pecten gibbus</i>	<i>Neptunea tabulata</i>
	Tertiary Period	<i>Calyptrophorus velatus</i>	<i>Venericardia planicosta</i>
MESOZOIC ERA (Age of Medieval Life)	Cretaceous Period	<i>Scaphites hippocrepis</i>	<i>Inoceramus labiatus</i>
	Jurassic Period	<i>Periaphinctes tiziani</i>	<i>Nerinea trinodosa</i>
	Triassic Period	<i>Trochites subbullatus</i>	<i>Monotis subcircularis</i>
PALEOZOIC ERA (Age of Ancient Life)	Permian Period	<i>Leptodus americanus</i>	<i>Parafusulina bosei</i>
	Pennsylvanian Period	<i>Dictyoclostus americanus</i>	<i>Lophophyllidium proliferum</i>
	Mississippian Period	<i>Cactocrinus multibrachiatus</i>	<i>Protelcanites gurleyi</i>
	Devonian Period	<i>Mucrospirifer mucronatus</i>	<i>Palmatolepus unicornis</i>
	Silurian Period	<i>Cystiphyllum niagarensis</i>	<i>Hexamoceras hertzeri</i>
	Ordovician Period	<i>Bathyrus extans</i>	<i>Tetragnostus fructicosus</i>
	Cambrian Period	<i>Paradoxides pinus</i>	<i>Billingella corrugata</i>
PRECAMBRIAN			

**Johtofossiilijaotus on johdettu Darwinin teoriasta eli eliöiden oletetusta kehitysjärjestyksestä ”yksinkertaisista” monimutkaisiin. Toisaalta, paikkapaikoin havaittua järjestystä pidetään yleispätevänä todisteena Darwinin teoriasta. Eikö tämä ole kehäpäätelyä?**



## Radiohiilen mysteeri

Radiohiilen esiintyminen vanhoissa näytteissä vaatii selitystä. Niinpä on esitetty, että vanhojen fossiilien radiohiili ( $^{14}\text{C}$ ) on syntynyt uraanin hajoamisen sivutuotteena. Normaalisti radiohiiltä syntyy kuitenkin vain yläilmakehän typestä: Ensin kosminen säteily, kuten aurinkotuuli, saa aikaan ns. spallaation, jossa syntyy mm. termisiä neutroneja ja hapen hajoamista radioaktiiviseksi berylliumiksi. Neutronit törmäävät yläilmakehän typpi-atomeihin ( $^{14}\text{N}$ ), joiden ytimissä on 7 protonia ja 7 neutronia. Terminen neutroni ”iskee ulos” yhden protonin ja ottaa sen paikan, jolloin syntyy epävakaa radiohiili ( $^{14}\text{C}$ ), jonka ytimessä on kuusi protonia ja kahdeksan neutronia.

Kosmista säteilyä ei kuitenkaan pääse juurikaan tunkeutumaan maan pinnalle asti, saati sitten fossiileja sisältäviin kerrostumiin. Voisiko radiohiilen selittää uraanin hajoamisen synnyttämät alfa- ja beta-hiukkaset tai gammasäteily? Tuskin. Tähän on monia syitä. Yksi on se, että uraania pitäisi olla paljon, mutta fossiilikerrostumissa, kuten kivihiilessä sen pitoisuudet ovat monta kertaluokkaa liian pieniä, tavallisesti vain noin 1–3 ppm (miljoonasosaa). Miksi 1–3 ppm:n pitoisuus ei riitä? Siksi, että uraani hajoaa radiohiiltä noin miljoona kertaa hitaammin. Silti uraanin pitäisi pystyä ylläpitämään mitattavia radiohiilimääriä kymmeniä, jopa satoja miljoonia vuosia. Jotta tämä olisi mahdollista, lähes jokainen hajoava radiohiiliatomi pitäisi korvata uudella, typpiatomista syntyvällä hiilellä. Uraanin hajoaminen on kuitenkin niin verkkaista, että sen synnyttämät alfa-hiukkaset eivät millään riitä uusien  $^{14}\text{C}$ -atomien synteisiin.

Entä esimerkiksi hiilijuonen vieressä sijaitseva, enemmän uraania sisältävä mineraali kuten maasälpä? Voisiko siinä syntyvä uraanisäteily tunkeutua kivihiileen, josta noin 1,5 % on radiohiilen raaka-ainetta, tyypeä? Tuskin, sillä hajoamisessa syntyvät alfahiukkaset eli heliumytimet (2 neutronia + 2 protonia) pystyvät etenemään maasälvässä vain noin neljä senttiä ja kivihiilessäkin korkeintaan 14 cm. Radiohiili on kuitenkin jakautunut tasaisesti koko kivihiileen. Ja sitä paitsi: fission synnyttämät neutronit ovat aivan liian korkeaenergisiiä (2 MeV), jotta typpiatomien ydin voisi saada niitä kaapattua. Vain jotkin yksittäiset neutronit saattaisivat tulla kaapatuiksi sen jälkeen kun törmäykset muihin atomeihin ovat vähentäneet niiden energiaa. Ja näiden muiden atomien (lähinnä hiili ja vety) joukossa typpiatomit ovat kovin harvinaisia eli harva alfahiukkasesta syntynyt matalampienergiainen neutroni päätyisi typen ytimeen.

Teoriassa radiohiiltä voisi syntyä myös ym. spallaation synnyttämän beryllium-isotoopin kautta ( $^{10}\text{Be}$ ), joka hajoaa vakaaksi isotoopiksi ( $^9\text{Be}$ ) emittoimalla yhden neutronin. Sen olisi kuitenkin pitänyt hautautua yhdessä kivihiilen tuottaneen kasvillisuuden kanssa.  $^{10}\text{Be}$ :n puoliintumisaika on kuitenkin aivan liian lyhyt (n. 1,4 miljoonaa vuotta), jotta se voisi ylläpitää radiohiilimääriä yli geologisten aikakausien. (Kaikkein nuorimpienkin kivihiiliesiintymien pitäisi tietääkseni olla yli 30 miljoonan vuoden ikäisiä).

Radiohiilen esiintymiselle on esitetty muitakin syitä, kuten kontaminaatiota. Ne voidaan kuitenkin perustellusti asettaa kyseenalaisiksi. Looginen johtopäätös tästä siis olisi, että orgaaniset fossiilit eivät ole ainakaan 100 000 vuotta vanhempia.<sup>91</sup>

91 Lisätietoja, ks. *Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta*, luku 4. Entä radiohiiliäjoitus?, [luominen.fi/KJVL](http://luominen.fi/KJVL).

## Kivet eivät ole kelloja (Rocks aren't clocks)

Radiometrinen iänmääritys, kuten jo todettiin, antaa pelkkiä *suhdelukuja* (tarkkoja), lähtöaineiden ja tytäraineiden suhteita. Mutta jos tästä suhdeluvusta suoraan puoliintumisajan perusteella laskettu ikä vuosissa ei sovikaan esimerkiksi tärkeänä pidetyn jolithofossiilin perusteella jo ennalta arvioituun ns. oletusikään, radiometrinen ikä hylätään *aina* (ja koetetaan ehkä jotain toista, ”parempaa isotooppia”). Näytteen ikää ei siis määrää radiometria, vaan yli 150 vuotta vanha Darwinin teoria lajien *hitaasta* ja asteittaisesta evoluutiosta. Tästä hyvä esimerkki on jo mainitsemani rudolfinihminen, kallo KNMER-1470. Kalium-argon -menetelmällä sen iäksi saatiin ensin 212–230 miljoonaa vuotta. Geokronologit kuitenkin säikähtivät, kun he kuulivat, että tuliperäisen kivinäytteen vierestä löydettiin varhaisen ihmisen kallo. He selittivät, että ”ulkopuolinen argon oli kontaminoinut näytteen”. Kallon iästä käytiin kiistoja yli kymmenen vuotta, kunnes iäksi sovittiin 1,9 miljoonaa vuotta. Nykykäsityksen mukaan suku Homo on kuitenkin 2,8 miljoonan vuoden ikäinen, joten rudolfinihminen ei voi olla esi-isämme.

**Menetelmän perustavaa laatua oleva virhe** on sen premissi, lähtökohta, se, että fossiili ja sitä ympäröivä sedimentti muodostavat *suljetun systeemin*: fossiilin synnyn jälkeen systeemiin (fossiili ja sitä ympäröivä kiviaines) ei ole päässyt mitään ulkopuolisia aineita eikä siitä myöskään ole poistunut mitään. Näin ei kuitenkaan ole. Systeemi *ei* ole suljettu; taivaalta tullutta vettä imeytyy näihin sedimentteihin, jotka ovat huokoista ainesta. Pintavedet valuvat niiden läpi kohti pohjavesiä tai alempana sijaitsevia pintavesiä. Vesien mukana huuhtoutuu myös radioaktiivisia aineita ja niiden lopputuotteita. Jotkut, kuten tietyt uraanisuolat, ovat vesiliukoisempia kuin jotkut toiset eli aineita huuhtoutuu eri tahtiin. Jossain kiviaines on tiiviimpää kuin jossain toisessa paikassa. Niinpä radioaktiivisten aineiden ja niiden lopputuotteiden pitoisuudet saattavat olla hyvinkin heterogeenisiä, ”laikukkaita”.<sup>92,93</sup> Niinpä esimerkiksi fossiilin pään vieressä olevalle sedimentin palalle voidaan saada eri ikä kuin sille, joka on otettu fossiilin hännän läheltä.

Kirjan väite ”fossiilien ikä voidaan määrittää tarkasti”, ei pidä paikkaansa. Tarkoitetaanko otsikon sanalla ”tarkasti” siis vain radioaktiivisen aineen ja siitä syntyneen tytäraineen, kuten uraanin ja lyijyn suhteellisia, tarkkaan mitattuja osuuksia tutkitussa näytteessä? Mutta yksi tarkka suhdeluku ei ole sama kuin ikä: Samasta kiviaineksesta voidaan joskus määrittää useiden radioaktiivisten aineiden suhteita ja tavallisesti kaikki antavat erilaiset, toisistaan hyvinkin poikkevat iät.<sup>94</sup>

Paikkaansa ei myöskään pidä BIOS 1:n tieto, että radiometrinen määrittäminen (hitaasti hajoavasta aineesta) tehtäisiin myös itse fossiilista. Jos niitä fossiilissa on, ne ovat kerääntyneet siihen joskus myöhemmin, eivätkä siten kerro mitään sen iästä. Radiometrinen ikä (muu kuin radiohiileen perustuva) määritetään aina fossiilia ympäröivästä kiviaineksesta (jos siitä jotain mitattavaa löytyy). Tässä siis yksi selvä virhe, johon alussa viittasin.

92 Tämä tuli ilmi mm. 2000-luvun taitteen ns. RATE-projektin yhteydessä, josta jnkv. Koulubiologian analyysissa.

93 *Radioisotopes and the Age of the Earth* (RATE), [icr.org/rate](http://icr.org/rate).

94 Ibid (RATE).

## Jotkin lajit ovat säilyneet pitkään samanlaisina (otsikko, s. 145)


Tämä ei pidä aivan paikkaansa. Oikeampi otsikko olisi ”Monet lajit ovat pysyneet samanlaisina kymmeniä, jopa satoja miljoonia vuosia. Suurin osa nykyisin elävistä eliöistä on eläviä fossiileja”. Ks. esim. yllä mainitsemani Carl Wernerin tutkimus.

## Fossiiliarja kertoo jonkin lajin kehityshistorian (sivun 146 ensimmäisen kappaleen otsikko)

”Esimerkiksi hevosesta on löydetty runsaasti fossiileja, joiden perusteella on saatu selville, että hevonen on kehittynyt noin 55 miljoonassa vuodessa ketun kokoisesta viisivarpaisesta nisäkkästä nykyiseksi kookkaaksi, kaviolliseksi eläimeksi.”

Tekstin vieressä on ”sarjakuvaklassikko” 1800-luvulta eli Yalen yliopiston paleontologian professori Othniel Marsh’n laatima hevosen fossiiliarja. Se alkaa piskuisesta kalliomäyrästä eli ”aamuruskon hevosesta” ja päättyy miljoona vuotta sitten syntyneeseen sotarat-suun. Sarjakuvan alla lukee: ”Hevosen fossiiliarja antaa hyvän käsityksen hevosen koon ja rakenteen muuttumisesta 60 miljoonan vuoden aikana.”

Marsh keräsi vaikuttavan kokoelman amerikkalaisia fossiilisia hevosia ja asetti ne tärkeänä pidetyn Copen säännön edellyttämään järjestykseen. Tämän säännön mukaan eläinten koko kasvaa evoluution kuluessa. Kookas eläin oli Edward Copen (1840–1897) mukaan edullisemmassa asemassa sekä energiatalouden että ravintoon ja lisääntymiskumppaniin kohdistuvan kilpailun suhteen kuin pienikokoinen yksilö. Kaksi muuta tärkeää piirrettä olivat alkuhevosten keskivarpaiden kehittyminen kavioiksi ja poskihampaiden kehittyminen kuluttavaa ruuhonsyöntiä kestäviksi korkeakruunuisiksi puruelimiksi.



**Othniel Marsh ja kuuluisa hevosen fossiiliarja. Marsh julkaisi sarjansa vuonna 1874.**

Marsh julkaisi sarjansa vuonna 1874. Ja koska hän uskoi Copen sääntöön, kantamuodoksi piti valita jokin pienikokoinen eläin (jolla ei tietenkään ollut kavioita eikä korkeakruunuisia poskihampaita). Kuuluisan paleontologin, Richard Owenin vuonna 1841 kuvaama ketun kokoinen *Hyracotherium* (kalliotamaani tai kalliomäyrä) vaikutti sopivalta ja Marsh antoi sille uuden nimen *Eohippus*, ”aamuruskon hevonen”. (Paleontologit olivat asettaneet Owenin löydön kalliotamaanien eikä hevosten yhteyteen, josta myös nimi *Hyracotherium*, sillä kreikankielen *hyrax* viittaa tamaaneihin tai päästäisiin. Sillä oli eturaajoissa neljä ja takaraajoissa kolme varvasta kuten nykyisillä kalliomäyrillä.)

Eurooppaan hevosen tarina tuli Thomas Huxleyn mukana hänen käytyään tapaamassa Marshia rapakon takana. Marshin esittämä aamuruskon hevosen suoraviivainen ja vähittäinen evoluutio nykyaikaiseksi hevoseksi teki Huxleyn suuren vaikutuksen. Darwinin mielestä Marshin hevossarja oli paras todiste evoluutiosta sitten *Lajien synnyn* ilmestymisen vuonna 1859. (Toinen oli Ernst Haeckelin samana vuonna, 1874 laatima selkärankaisten varhaisalkioiden kuvasarja, josta lisää alkaen sivulta 95.)

Mitä hampaiden kehitykseen tulee, tuolloin uskottiin, että ruoho ja ruohotasangot alkoivat kehittyä vasta mioseenikaudella joskus 25–20 miljoonaa vuotta sitten. Sitä ennen varhaishevokset kuten ”aamurusko” ja mesohippus elivät metsissä ja söivät lehtiä, joiden mukana suuhun ei joutunut hampaita kuluttavaa hiekkaa. Vasta mioseenikaudella tämä ”hiekkainen ympäristövaikutus” mukamas ohjasi hampaiden kehityksen uusille urille siten, että hevosille kehittyi korkeakruunulliset, purupinnoiltaan erikoisrakenteiset poskihampaat. Samalla ruohotasankojen ilmestyminen ohjasi mukamas varpaiden kehityksen kohti kavioita. Tällaista ympäristövaikutususkkoa kutsutaan *environmentalismiksi*. Se toki pätee tiettyyn rajaan saakka: Ympäristö muovaa fenotyyppiä, mutta ei tietenkään synnytä uusia ominaisuuksia (kuten erikoisrakenteisia hampaita tai kavioita). Ongelma tässä ruohoteoriassa on se, että ajoitus vaikuttaa olevan väärä: ruohoa on ilmeisesti ollut olemassa niin kauan kuin muitakin maakasveja. 1800-luvulla tätä ei kuitenkaan tiedetty. Vuotta en tarkkaan muista, mutta jo ajat sitten, silloin kun dinosaurusten kivettyneitä ulosteita alettiin tutkia, niistä löytyi ruohoa.

Benton (kirjassaan *Vertebrate Palaeontology*) kuittaa hevosen oletetun kehityksen lyhyesti, mutta esittää kuitenkin Savagen ja Longin vuonna 1986 laatiman hevosten sukutaulun, joka on melkein sama kuin BIOS 1:n sivun 146 sarjakuva. Myös Savagen ja Longin sukutaulussa on kantamuotona tuo nelivarpainen aamuruskon varsa eli kalliomäyrä. Sen sijoittamiselle hevosen sukupuuhun ei kuitenkaan ole mitään tieteellisiä perusteita – muuta kuin se, että Darwinin teoria (ja Copen sääntö) edellyttää jotain sellaista. Ja koska pienikokoisia kolmi- tai nelivarpaisia nisäkkäitä on ollut olemassa, voi sellaisen sijoittaa vaikkapa hevosen sarjan ensimmäiseksi eläimeksi. Mutta eikö sen voisi yhtä hyvin sijoittaa vaikkapa lehmän tai virtahevosen kehityssarjan kantamuodoksi?

Benton toteaa, että hevosten kehitys eri mantereilla on ollut erilaista ja että vanhan maailman alkuhevokset kuolivat sukupuuttoon kun ilmasto kuivui ja kylmeni, ja että kehitys jatkui vain Pohjois-Amerikassa. Tämä kuitenkin ihmetyttää, sillä saman muutoksen piti koskea koko pohjoista pallonpuolisko.

”Tutkimusten alkuvaiheessa hevosten evoluutio vaikutti vielä yksiselitteiseltä ja suoraviivaiselta. Fossiiliaineiston lisääntyessä tilanne kuitenkin muuttui monimutkaisemmaksi ja sukupuusta tuli sukupensas, jossa oli paljon sivuoksia ja sukupuuttoon kuolleita kehityslinjoja. Täytyi päätellä, että oletetut esi-isät tekivät monimutkaisia vaelluksia Amerikan ja Euroopan välillä sekä ottaa huomioon sukupuuttoon kuolemisia [– –] Kolmivarpainen muoto *Neohipparion*, jolla oli ruohonsyöjän hampaisto, ilmaantui samanaikaisesti yksivarpaisen ja myös ruohonsyöjähampaisen *Pliohippuksen* kanssa. Miten on mahdollista, että yksikavioisella muodolla olisi ollut huomattava valintaetu arolla kolmivarpaiseen muotoon verrattuna? [– –] Huolimatta kaikista mainituista vastaväitteistä, jotka koskevat nykyhevoseen johtanutta kehityslinjaa, voidaan löydetty fossiilit järjestää evoluution edellyttämäksi sukuuun luonnokseksi. Tässä luonnoksessa on kuitenkin huomattavia aukkoja. Fossiililöydöt eivät mitenkään pakota sellaisen laatimiseen. Näyttää melkein siltä, että teoria on ohjannut fossiililöytöjen tulkintaa”<sup>95</sup>

Artikkelissaan *Conflicts between Darwin and Palaeontology* (1979) Lontoon Natural History Museumin silloinen johtaja David Raup, paleontologi, kirjoitti:

”Darwinin vakiovastaus siihen ongelmaan, että fossiililöydöt eivät sopineet hänen teoriaansa oli se, että fossiileja on niin vähän [– –] Mutta nyt 120 vuotta Darwinin jälkeen tietomme fossiileista on suunnattomasti kasvanut. Meillä on nyt noin neljännesmiljoona fossiilista lajia, mutta tilanne ei ole juurikaan muuttunut [– –] Niiden mukaan näyttää edelleenkin siltä, että evoluutio on ollut yllättävän hyppäyksellistä – ja mikä ironisinta, meillä on nyt vielä vähemmän välimuodoiksi sopivia fossiileja kuin Darwinin päivinä. Tarkoitan tällä sitä, että muutamat klassiset esimerkit kuten hevosten evoluutio Pohjois-Amerikassa, on täytynyt joko hylätä tai niitä on pitänyt muuttaa tiedon määrän kasvaessa – se mikä aikaisemman vähäisen tiedon valossa näytti niin selvältä ja yksinkertaiselta, näyttää nyt paljon monimutkaisemmalta ja vähemmän asteittaiselta kehitykseltä.”<sup>96</sup>

## Onko eläimissä ja ihmisessä evoluutiopolun varrelta jääneitä surkastumia?

”**Anatomisten rakenteiden** vertailu selvittää eliökunnan sukupuuta. Yksi erikoinen todiste evoluutiosta ovat **surkastumat eli tehtävänsä menettäneet elimet tai niiden osat. Sekä käärmeillä että valailla on merkkejä raajoista, jotka ovat surkastuneet tarpeettomina**” (s.147)

95 Scherer & Junker, *Evoluutio – kriittinen analyysi*, Datakirjat, 2000, s. 233-4.

96 *Field Museum of Natural History Bulletin* 50(1):22, Jan 1979.

Käärmeillä tässä tarkoitettaneen boaa ja sen vatsanpohjassa sijaitsevaa kahta ohutta, keihäsmäistä luuta, jotka päättyvät ulkoiisiin kynsiin. Ne eivät ole surkastumia, vaan ovat suureksi avuksi käärmeen liikkussa puissa ja oksistossa. Lisäksi ne toimivat parittelua helpottavina apueliminä.

Mitä valaisiin tulee, huomautan, että aikana, jolloin valaiden ns. vatsaluiden tarkoitusta ei tiedetty, oli helppo väittää niitä kehitysopillisiksi surkastumiksi. Kaskelotilla ja seitivalaalla on ”lantio-surkastuma”, sillivalaalla lisäksi ”reisi-surkastuma”. Ne toimivat sukuelinten ja voimakkaiden peräaukon sulkijalihasten kiinnittymisalustoina: Valtavissa paineissa, jopa kilometrien syvyyksissä valaan suolen sisältö ja kenties koko suolisto pursuaisivat ulos peräaukosta ilman ”surkastumien” sulkijalihaksille antamaa tukea. Valastutkija Arvyn mukaan luuta ei voida pitää surkastumina ja hän nimittääkin niitä abdominaali- eli vatsaluiksi (Scherer, Junker, s. 171). Valaat uivat liikuttamalla horisontaalista pyrstöään ylös-alas. Lantion olemassaolo estäisi tällaisen liikkeen, joten jo niiden esimuotojen olisi pitänyt syntyä ilman lantiota. Mutta koska niiden väitetään olleen maanisäkkäitä, niillä piti olla lantio. Brittiläinen eläintieteilijä Douglas Dewar on toistuvasti vaatinut kehitysteoreetikkoja esittämään jonkinlaisia luonnoksia sellaisen liikkumiskelpoisen eläimen luurangosta, joka sopisi valaiden ja maaselkärankaisten välimuodoksi, mutta kukaan ei ole ottanut haastetta vastaan.

} ”Ihmiselläkin on useita surkastumia, esimerkiksi häntänikamat ja korvanliikuttajalihakset” (s.147). }

Lääkärinä tiedän (vastoin oppikirjojen ”tietoa”), että ihmisellä ei ole kehitysopillisia surkastumia.

1. **Korvanliikuttajalihakset.** Korvan ns. liikuttajalihaksiin (*M. auriculare*) on alettu kiinnittää huomiota vasta 2000-luvulla. Vaikuttaa siltä, että evoluutioteorian pohjalta johdetun häntäluun (*coccyx*) tapaan lihasten suomenkielinen nimi on väärä; oikeampi voisi olla *korvalehden tukilihaksisto*. Vaikka jotkut henkilöt voivatkin hieman liikutella korvalehtiään, sillä ei kuulemisen kannalta taida olla suurtakaan merkitystä. Lihakset (3 kpl.) kiinnittyvät kallon peitinkalvoon ja korvalehden tyveen, missä korvalehtikin kiinnittyy samaan kalvoon. Tästä syystä lihasten supistuminen ei juurikaan saa aikaan korvalehden liikettä (koska vipuvarsi puuttuu päinvastoin kuin esim. jäniksellä). Kehityshäiriöistä johtuen jotkut tai kaikki lihakset saattavat puuttua. Tämä johtaa korvalehden instabiliteettiin, ”löysyyteen”, jolloin korvalehti on ikään kuin puolittain irti, kuin melkein poikki sahattu puun oksa. Taaimmaisen lihaksen puuttuminen saa aikaan ns. hörökorvat, joita korjataan leikkauksella. Lihasten puuttuminen tai kehityshäiriö voi johtaa myös korvalehden ja korvakäytävän epämuodostumiseen. Lihakset ovat hyvin verisuonitettuja ja tukevat helposti paleltuvien korvalehtien verenkiertoa. Melkein koko kallon pinta on lihasten peittämä; lihakset suojaavat kalloa sekä iskuilta että kylmältä. Korvalihakset ovat myös osa kasvojen lihaksistoa: ilman niitä ilmeet, kuten hymyily ja haukotus olisivat ”puoli-ilmeettömiä”. Vaikuttaa siltä, että korvalihakset osallistuvat myös silmien ja silmäluomien liikkeisiin ja toimivat yhteistyössä ohimon purulihaksen (*M. temporalis*) kanssa.
2. **Viisaudenhampaat.** Tämä johtuu leukamme hypoplasiaasta eli alikehittyneisyydestä (surkastumisesta). Se saattaa johtua joko mutaatioista tai siitä, että liian pehmeä ruokavalio ei stimuloi leukaluun kehitystä – tai molemmista.

Kateenkorva, umpilisäke, rinnat ja kohtu surkastuvat vasta sitten kun ne ovat jo tehtävänsä suorittaneet. Häntäluu on tuiki tarpeellinen lantionpohjan tukirakenne, eikä misään nimessä mikään surkastuma, eikä sillä ole mitään tekemistä hännän kanssa, vaikka ns. ”häntäsilmu” ohjaakin sen kehitystä (ks. alle). Lisäksi peräaukon uloin sulkijalihas ankkuroituu häntäluuhun. Ilman sitä housut saattaisivat töhriintyä.

Ihminen ei myöskään ole alaston apina. Ihokarvoja meillä on noin 60–600 per neliö-sentti. Karvatuppien seinämissä, jotka ulottuvat ihonalaiseen rasvakudokseen saakka, on suojassa ainakin kahdenlaisia kantasolupesäkkeitä. Ne ovat tärkeitä ihohaavojen ja toisen asteen palovammojen parantumisen kannalta. Karvankohottajalihas taas on tärkeä talirauhasen toiminnan kannalta: Lihaksen supistuminen tyhjentää rauhasen sisällön iholle, josta se saa suojaa kuivumista ja patogeenisiä bakteereja vastaan.

Ihmisen silmässä ei myöskään ole mitään ”vilkkuluomen jäännettä”. ”Vilkkuluomi” (*plica semilunaris*) ja siihen liittyvä ”pieni lihastappi” (*carunculus*) ovat silmän toiminnan kannalta täysin välttämättömiä. Ne sisältävät mm. suuria määriä ns. Gobletin soluja, jotka tuottavat kyynelnesteelle tärkeitä limamaisia komponentteja, mukopolysakkarideja. Poimuttunut ja joustava ”vilkkuluomi” ankkuroi silmämunan silmän sisänurkkaan sallien samalla suuren liikkuvuuden ja yhdessä ”lihastapin” kanssa se ohjaa kyynelneesten kyynelkanavaan. Ilman vilkkuluomea ihminen todennäköisesti sokeutuisi tai ainakin menettäisi paljon näkökyvystään. Mutta kamelilla on oikea, läpinäkyvä vilkkuluomi, jonka se vetää päälle hiekkamyrskyn alkaessa. Ihmisellä luomien liike ohjaa pölyn silmän sisänurkkaan, jossa se ym. lima-aineen ansiosta paakkuuntuu, jolloin se on helppo pyyhkäistä pois. Ilman vilkkuluomea pölyn poisto olisi hankalaa.

Umpilisäkekään ei ole mikään kehityso pillinen surkastuma ja todiste siitä, että esi-isämme olivat paitsi liskoja ja kaloja, myös märehittäjiä, kuten jotkut aikaisemmat biologian oppikirjat ovat väittäneet. Vastasyntyneen umpilisäke (eri elin kun ns. umpisuoli, *caecum*) on suhteellisen suurikokoinen immunologinen elin, jossa syntyy tärkeitä suoliston vasta-aineita kuten immunoglobuliini A:ta. Suoritettuaan tärkeimmän tehtävänsä se alkaa surkastua muutaman vuoden iässä kuten kateenkorvakin. Silti se saattaa olla hyvä aikuisellakin, sillä osa ns. hyvänlaatuisista suolistobakteereista voi saada sieltä suojan suolistotulehdusten kuten antibioottiripulin aikana. Henkilö, jonka umpilisäketä ei ole tarvinnut tulehduksen takia poistaa, saattaa toipua nopeammin näistä taudeista.


Ehkä kaikkein hupaisin väite löytyy WSOY:n toimittamasta *Elämä*-kirjasta vuodelta 2005, s. 32: ”Suora vatsalihas (’pyykkilautalihas’) on ihmisen ainoa jaokkeinen lihas, kaikki muut lihaksemme ovat jaokkeettomia. Suoran vatsalihaksen jaokkeisuus kertoo yhteisestä alkuperästä kalojen kanssa.” Se, että väitteen esittäjä ei tunne jaokkeiden tärkeää merkitystä, ei mitenkään oikeuta häntä tekemään meistä ahventen jälkeläisiä.

**Ihmisellä ei ole kehityso pillisiä ”surkastumia”. Oppikirjojen laatijoiden olisi syytä päivittää tietojansa.**

## Pikakelaavatko selkärankaisalkiot lajikehitystään? Onko ihmisalkiolla häntä ja kidukset?

”Myös **alkionkehityksen** aikana tapahtuvaa rakenteiden kehitystä käytetään apuna evoluutiotutkimuksessa. Alkionkehityksen alkuvaiheessa eri selkärankaiset muistuttavat toisiaan. Kaikilla selkärankaisilla kehittyvät alkionkehityksen alussa kiduskaaret, joista myöhemmin muodostuvat kaloilla kidukset ja nisäkkäillä muun muassa alaleuan luut ja kuuloluut” (s.147).

Yllä oleva osoittaa, että kirjoittaja ei tiedä paljoakaan alkionkehityksestä, vaan on plagioinut vanhoista kirjoista 1800-luvun ”tietoa”, joka perustuu Ernst Haeckelin (1834–1919) omasta päästään raapimaan ”biogeneettiseen lakiin”. Sen mukaan selkärankaiset ”pikakelaavat kehityshistoriansa” alkion varhaiskehityksen aikana (kidukset, häntä jne.). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kirjoittajat olisivat jo viimeinkin tietoisia Haeckelin väärennöksistä, eivätkä ole enää kehdanneet tähän kirjaan kopioida hänen vuonna 1874 laatimaansa selkärankaisalkioiden kuvasarjaa (joka löytyy vielä WSOY:n vuonna 2005 kustantamasta lukion biologiasta *Elämä*, sivulta 33). Nyt kirjassa on ainoastaan kaksi pientä valokuvaa (s.147) ilman mitään tekstiä (!). Alempi on sama kuin vuoden 2008 painoksessa eli rotan alkio. Toinen on luultavasti ihmisen alkio (kuten 2008). Ja tottahan on, että kaukaa katsottuna ne näyttävät hieman samanlaisilta: Onhan sekä rotalla että ihmisellä esimerkiksi pää, kaksi silmää ja neljä raajaa – ja ihmisalkiollakin jopa ”häntä”.



Kuva: Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, Luku 7, © creation.com

**Ihmisalkioita luokiteltaessa käytetään harhaanjohtavia termejä evoluution juurruttamiseksi opiskelijoihin. Lisätietoja: Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, Luku 7. Entä samankaltaisuudet ja muut vastaavanlaiset argumentit evoluution puolesta?**



Saman sivun teksti kuitenkin viittaa siihen, että nämä kuvat olisivat alkionkehityksen alkuvaiheesta. Sitä ne eivät kuitenkaan ole. Kuvat ovat ns. fylyttypivvaiheesta, joka ei enää edusta alkuvaihetta. Alkuvaiheeseen kuuluvat morula-, blastokysti- ja gastrulaatiovaiheet. Erityisesti tärkeässä gastrulaatioissa selkärankaisalkioiden välillä on suuria eroja. Ihmisen pitäisi Darwinin mukaan olla paljon läheisempää sukua hiirelle kuin kanalle. Kuitenkin, gastrulaatiovaiheen alussa ihmisen ja kanan alkiolevyt muistuttavat melkoisesti toisiaan (”kolmikerroksinen pannukakku”), mutta hiiren gastrula on ”kuppi” (Sariola ym. *Kehitysbiologia*, Duodecim 2015, s.151). Ja jo morula- ja blastokystivaiheessa eri lajien alkiot saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Fylyttypivvaihe, jolloin esimerkiksi silmien, sydämen ja raajojen silmut alkavat ilmestyä, jotkin selkärankaisalkiot muistuttavat hieman toisiaan. Fylyttypivvaiheen jälkeen muistuttavuudet alkavat taas vähentyä. Maaselkärankaisten kaulan alueelle ilmestyvää viittä kudospaksuuntumaa jotkut ovat kutsuneet ”kiduskaariksi” vain sen takia, että niiden välissä on kudosta, jossa on vähemmän solukerroksia. Tällöin kahden paksuuntuman eli plakoidin väliin jää ikään kuin poimu. Kaloilla niistä muodostuu hengityselin verisuonikaarineen eli kidukset, mutta maaselkärankaisten ”kiduksista” ei kehity keuhkoja. [Ensimmäisessä suomenkielisessä yleisbiologian oppikirjassa väitettiin, että ihmisen sikiö hengittää kiduksilla. (Kivirikko 1911)]

Entä ihmisalkion häntä? Totta on, että jopa kehitysbiologian eli embryologian oppikirjat puhuvat häntäsilmusta (engl. *tailbud*). Se ei kuitenkaan tarkoita, että sillä olisi jotain tekemistä hännän kanssa. Häntäsilmu tuottaa kudosta alkion pituuskasvua varten (alkio alkaa kasvaa pituutta päästä kohti ”häntäpäätä”). Pituuskasvun ohella häntäsilmu ohjaa takasuolen loppupään eli kloaakin (ja tärkeän häntäluun) kehitystä (Sariola, s.273).

## Ovatko selkärankaisten eturaajojen luut todiste yhteisestä kantamuodosta?

} *”Eri selkärankaisten eläinten luuston sama perusrakenne kertoo niiden yhteisestä alkuperästä. Vaikka lintu ja lepakko lentävät, sammakko loikkii ja pyöriäinen ui eturaajojensa avulla, kaikkien näiden eturaaja koostuu alun perin samoista luista”* (kuvateksti, s. 147). }

Kuvan pyöriäisellä, sammakolla, lokilla ja lepakolla on sellaiset raajat luineen kuin niillä pitääkin olla, muuten ne eivät toimisi. Tätä ”samankaltaisuutta” (ja siis yhteistä alkuperää) on yritetty selittää mm. siten, että ”samankaltaisuutta on enemmän kuin mitä toiminnallisuus edellyttää”! Tavallisesti kuvataulussa on ollut mukana myös hevosen kavieri<sup>97</sup>, mutta sen sentään ovat nyt pois jättäneet. Kai ovat huomanneet, että ero hevosesta lepakoon on niin suuri, että uskottavuus yhteiseen alkuperään kärsisi?

Eri eliöissä tavattavat samankaltaisuudet on helppo selittää yhteisellä suunnittelulla. Tästä syystä samankaltaisuudet (homologiat) eivät sinällään todista evoluution puolesta.

97 Esim. *Koulun biologia*, Lukio 2, s. 69, Otava 1998,

## Ihmisen ja simpanssin kromosomit ja DNA

Sivulla 148 on epämääräinen, ilmeisesti osittain virheellinen (?) kuvasarja ihmisen ja simpanssin kromosomeista 1, 2, 5 ja X (sukukromosomi). Kuvateksti kertoo, että ”*useissa* niistä on tapahtunut evoluution aikana *kromosomimutaatioita* [– –] kromosomimutaation seurauksena simpanssilla on myös yksi kromosomipari enemmän kuin ihmisellä”. Kirja kuitenkin jättää kertomatta, että käytännössä kaikki *eläinten kromosomimutaatiot* ovat haitallisia, usein jopa letaaleja. Simpanssilla ja gorillalla on 48 kromosomia, ihmisellä 46. Teorian mukaan apinaihmisilläkin oli 48 kromosomia ja ihmisen kromosomi 2 olisi syntynyt apinaihmissen kromosomien 12 ja 13 fuusion eli yhteensulautumisen seurauksena. Näin siksi, että kun simpanssin alkeellisella tekniikalla värjätyt kromosomit 12 ja 13 liitettiin sopivasti yhteen, saatiin kromosomi, jonka raidat (ja koko) muistuttivat ihmisen kromosomia 2. Näin mukamas löydettiin selitys kromosomiluvun vähenemiselle. *Tällainen kromosomimutaatio ei kuitenkaan ole mahdollinen* (ks. Koulubiologian analyysi 1, s. 108–109).

Tarkemmat värjäykset kehittyneimmillä tekniikoilla ovat osoittaneet, että kromosomien raidat eivät olekaan niin samanlaisia kuin miltä näytti. Lisäksi geneetikko Jeffrey Tomkins on osoittanut yksityiskohtaisesti jo vuonna 2011, että ihmisen kromosomi 2 ei ole yhtä kuin simpanssin kromosomit 12 + 13 (nykyään 2A ja 2B).<sup>98</sup> Tästä siis enemmän Koulubiologian analyysissä. Sen verran kuitenkin mainitsen, että oletetulta fuusioalueelta pitäisi löytyä pitkiä, vähintään 10 000 emäsparin mittaisia, ei-koodaavia, toistuvia *telomeerisekvenssejä* eli TTAGGG × n. Sellaista ei kuitenkaan ole löytynyt, vaan keskellä olettua fuusiota onkin erittäin tärkeä RNA-helikaasi-geeni ja sen promoottori (DDX11L2). Kromosomissa pitäisi olla myös *kaksi sentromeeria*, mutta toista ei ole löytynyt ja toinenkin on väärässä paikassa. Fuusiohypoteesi on siis osoitettu vääräksi ja asiasta suurta ääntä pitänyt solubiologi, ns. teistinen evolutionisti Kenneth Miller on ollut hiljaa. Noin kymmenen vuotta sitten hän näet julisti YouTube-videollaan, että jos kromosomifuusio ei ole totta, ihminen ei ole kehittynyt apinoista ja jos ihminen ei ole kehittynyt apinoista, evoluutio ei ole totta. Kuitenkin, ihmetyttää, että Campbell edelleen puhuu fuusiosta ikään kuin se olisi varmistettu tosiasia (s.488). Tämä osoittaa, miten toivottomasti kurssikirjat voivat joskus olla ajastaan jäljessä. (Saman olen joutunut toteamaan myös joistain oman alani, kirurgian oppikirjoista – valitettavasti.)

Ks. lisäksi artikkeli Luominen ry:n kotisivuilta, jossa viitataan myös Tomkinsin tuoreempaan ja laajempaan analyysiin vuodelta 2017.<sup>99</sup>

98 Tomkins J, Bergman J. The chromosome 2 fusion model of human evolution – part 1: re-evaluating the evidence, *Journal of Creation* 25(2):106–10, 2011 sekä The chromosome 2 fusion model of human evolution – part 2: re-analysis of the genomic data. Sama lehti, sivut 111–117.

99 Ihmisen ja simpanssin pseudogeenien samankaltaisuus, [luominen.fi/pseudo-sama](http://luominen.fi/pseudo-sama).

## DNA:n emäsjärjestys kertoo sukulaisuussuhteista (s.148)

”Esimerkiksi ihmisen ja hiiren DNA:n rakenne on selvitetty ja todettu 90-prosenttisesti samanlaisiksi” (s.148).

Tällä koululaisille yritettäneen viestiä ihmisen ja hiiren yhteisestä ja läheisestä kehityshistoriasta (vaikka esimerkiksi yllä mainitut gastrulaatiovaiheet eivät olekaan 90-prosenttisesti samanlaisia). Ihmisellä ja hiirellä on varmasti genomeissaan alueita, jotka DNA:n emäsjärjestyksiensä puolesta ovat 90-prosenttisesti, jopa enemmänkin samanlaisia. Mutta mitä tarkoittaa epämääräinen termi ”DNA:n rakenne”? Ainakaan kromosomit eivät ole 90-prosenttisesti samanlaisia ja monin paikoin DNA:n emäsjärjestykset lienevät kovinkin erilaisia.<sup>100</sup> Jokaisen eliölajin geeneissä on näet noin 10–30 % sellaisia,<sup>101</sup> ns. orpogeenejä, joita ei ole millään muulla lajilla eli ne eivät ole voineet kehittyä mistään ”yhteisistä kantageeneistä” mutaatioiden kautta. Mutta yhteisiäkin geenejä toki on; ja pitääkin olla. Elämmehän samassa maailmassa ja kaikilla eliöillä on esim. aineenvaihduntansa ja muun biokemiansa puolesta paljon yhtäläisyyksiä.

”Ihmisen ja simpanssin DNA:ssa on vain muutaman prosentin ero” (kuvateksti sivulla 149).<sup>[102]</sup>

Mitä tarkoittaa ”DNA:ssa on vain muutaman prosentin ero”? Mitä on ”muutama”. Onko se 8? Kysyn vain siksi, että simpanssin genomissa DNA:ta on noin 8 % enemmän kuin ihmisellä. Jos ”erolla” tarkoitetaan DNA:n emäsjärjestyseroja, genomit ovat kuitenkin jo pelkän kokonsa puolesta vertauskelvottomat. Ja mitä itse geenien emäsparien tilastolliseen vertailuun tulee, siitäkin on tullut vaikea ala sen jälkeen kun geenin atomistinen eli fyysinen malli jouduttiin korvaamaan kyberneettisellä: Yksittäinen geeni ei olekaan jokin tietty yhtenäinen DNA-jakso jossain tietyssä kromosomissa jossain tietyssä paikassa, vaan se on kuin veteen piirretty viiva. Solu muokkaa genomiaan jatkuvasti ja samaa DNA-sekvenssiä voidaan lukea molempiin suuntiin, lukeminen voidaan aloittaa eri paikoista, eri lajit saattavat käyttää samoja geenialueita hyvin eri tavoin jne. Svante Pääbo totesikin eräessä *Science*-lehden Newsfocus-osion artikkelissa v. 2007, ettei hän osaa sanoa miten prosentuaalisia eroja pitäisi laskea. ”Se miten näemme eromme, on poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen asia”, hän totesi. Tosiasia on, että ihmisellä ja simpanssilla on paljon yhteisiä geenejä. Mutta toinen tosiasia on, että genomimme eivät ole läheskään 98–99-prosenttisesti identtiset, kuten on joskus kuviteltu. Lisäksi me käytämme geenejämme niin eri tavalla, että proteiininimme vaikuttaisivat eroavan jopa 80 %.

Luulen kuitenkin, että tuo yllä mainittu ”muutaman prosentin ero” tarkoittaa 1,5 % (5 %?), mistä yleensä on puhuttu melko hiljattainkin. Koulubiologian analyysistä käy kuitenkin hieman tarkemmin ilmi, miksi näin ei ole. Kerron kuitenkin jotain uudempaa tietoa:

Vertailevissa DNA-analyyseissä on ollut se ongelma, että kun DNA:n emäsjärjes-

100 Kaikki hiiren kromosomit ovat ns. akrosentrisiä eli sentromeerit sijaitsevat aivan kromosomien pään vieressä, mutta ihmisen kromosomeista vain viisi on akrosentrisiä eli muut kromosomipuolikkaita (kuroumalla) yhdistävät sentromeerit sijaitsevat keskemällä (jolloin kromosomin lyhyempää päätä kutsutaan p- ja pidempää q-osaksi).

101 Haemes *et. al.*, A Continuum of Evolving De Novo Genes, *Journal of Molecular Evolution* 88:382–398, 2020. Sekä: Rödelsperger C. *et. al.*, New Gene Origin and Deep Taxon Phylogenomics, *Trends in Genetics* 35:914–922, 2019. Nämä viitteet kirjasta *The Essence of Biological Species*, Branko Kozulić, Branko Kozulic Publisher 2021, p. 146.

102 Olisi mielenkiintoista tietää, monenko ”prosentin” ero on ihmisen ja simpanssin munasoluissa.

tys halutaan selvittää, kromosomit ja DNA on pitänyt pilkkoa pieniksi, noin 75–1500 emäsparin pätkiksi ja niistä saatu järjestys koota uudelleen kromosomeiksi. Ongelmana ovat olleet erityisesti pitkät säätelyaluiden toistojaksot (jota luultiin tarpeettomaksi ”jäänteeksi” ja sai siksi nimen ”roska-DNA”). Menetelmät ovat kuitenkin kehittyneet ja nyt pystytään lukemaan 10 000–215 000 emäsparin mittaisia DNA-jaksoja. Tämä on tehnyt kromosomien rekonstruoinnista selvästi luotettavampaa ja se on tuottanut melkoisia yllätyksiä: Aina on sanottu, että kaksi ihmistä, mistä päin tahansa maailmaa, eivät DNA:n ”kirjainjärjestyksensä” puolesta eroa kuin 0,1%. Nyt on kuitenkin osoittautunut, että erot ovatkin keskimäärin 4,5 %<sup>103</sup> – Miten siis eroamme toisistamme 4,5 %, mutta simpansseista vain 1,5–5 %? Lisäksi, yllä mainitsemani geneetikko Tomkins on jatkanut ihmisen ja simpanssin DNA-vertailuja ja on toistaiseksi päätenyt siihen, että eromme ovat vähintään 15 % (vaikka eromme hiireen pitäisi olla vain 10%).<sup>104</sup>

## Molekyylit käyvät omia aikojaan

”Tietyissä DNA:n osissa tapahtuu mutaatioita vakionopeudella. Näiden mutaatioiden perusteella voidaan rakentaa niin kutsuttu **molekyylit**, joka kertoo, missä vaiheessa mikin ryhmä tai laji on lähtenyt kehittymään omaan suuntaansa. Mitä enemmän kahden lajin DNA:t eroavat toisistaan, sitä kaukaisempaa sukua lajit ovat toisilleen” (s.148).

*Tietyissä DNA:n osissa* tapahtuu siis mutaatioita *vakionopeudella*?<sup>105</sup> Asiayhteys tässä edellyttää, että näin on tapahtunut aina, miljoonia, kymmeniä ja satoja miljoonia vuosia. Kuitenkin, jotta näin voitaisiin esittää, olisi jonkun pitänyt matkustaa aikakoneella menneisyyteen ja mitata mutaationopeuksia esim. sadan vuoden välein miljooniin vuosiin saakka ja todeta ne samoiksi. Mutaationopeuksia on kuitenkin pystytty mittaamaan vasta muutaman vuosikymmenen ajan. (Ja mutaatiot, sattumanvaraisia kun ovat, niiden nopeudetkin saattavat vaihdella; puheet ”vakionopeudesta” eivät taida olla uskottavia.) *BIOS1* jättää siis kertomatta sen tärkeän yksityiskohdan että tutkijat vain *olettavat*,<sup>106</sup> että tietyissä DNA:n osissa ne ovat aina pysyneet muuttumattomina eli olleet nykyistä suuruusluokkaa koko eliöryhmän olemassaoloajan.

Molekyylit perustuu kahteen hypoteesiin, joita ei voi todentaa: 1) yhteinen kantamuoto, 2) vakioinen mutaationopeus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ensin *kello kalibroidaan fossiililöytöjen tulkinnan perusteella*: On esimerkiksi arvioitu (= ”tiedetään”, esim. johtofossiilien perusteella), että kaksi elossa olevaa lajia, A ja B, erkanivat yhteisestä kantamuodostaan 25 miljoonaa vuotta sitten. Molemmat perivät proteiini X:n geenin yhteiseltä esi-isältään. Sen jälkeen molempien X-geeni on mutatoitunut toisistaan riippumattomasti (mutta vakionopeudella). Nyt tarvitsee määrittää vain molempien lajien X-geenien tai X-proteiinien emäs- tai aminohappojärjestysten väliset erot. Oletetaan, että näiden kahden lajin välinen ero on 10 %. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmat

103 English A.C. et al., Assessing structural variation in a personal genome, *BMC Genomics* 16:286, 2015, doi.org/10.1186/s12864-015-1479-3.

104 Tomkins J.P. Analysis of 101 Chimpanzee Trace Read Data Sets: Assemblment of Their Overall Similarity to Human and Possible Contamination With Human DNA, *Answers Research Journal* 9:294–298, 2016. Ks. myös *Chimps and Humans: A Geneticist Discovers DNA Evidence That Challenges Evolution*, 2021; ISBN 978-1-946245-35-6, [ICR.org](http://ICR.org).

105 On havaittu, että kun esim. ihmisen solu jakaantuu, noin joka sadas miljoonaa ”kirjain” kopiautuu väärin.

106 Liekö tämän analyysin I. painoksen (2018) ansiota, että *BIOS1:n* uusi painos (2021) on muuttanut lausemuodon varovaisemmaksi: ”Molekyylitellon laatiminen perustuu oletukseen, että tietyissä DNA-jaksoissa tapahtuu mutaatioita vakionopeudella” (s.90).


eroavat oletetusta yhteisestä kantamuodosta 5 % ( $5 + 5 = 10$ ). Näin molempien mutaationopeudeksi saadaan  $5\%/25$  eli 0,2 % per miljoonaa vuotta. Tätä lukuarvoa käytetään sitten kun lasketaan ”elämän sukupuun” niiden oksien haarautumisajankohtia, joita ei voida päätellä fossiiliaineistosta. Menetellään siis seuraavasti: määritetään X-proteiinin aminohappojärjestykset kahdelle lajille C ja D. Jos lajien välinen ero on 8 %, molempien ero yhteiseen kantamuotoon on 4 %. Eron yhteisestä kantamuodosta täytyi siis tämän mukaan tapahtua 20 miljoonaa vuotta sitten ( $4/0,2$ ).

Ajatus, että proteiinit tai geenit ovat evolutiivisia kelloja, ei kuitenkaan toimi, sillä mitä enemmän aminohappojärjestyksiä tai genejä ja niiden eroja tutkitaan, sitä suurempi on hajonta - moni kello käy omaa aikaansa; eri geneillä onkin erilaisia mutaationopeuksia. Paljon riippuu esim. siitä, miten hyvin kukin yksilö pystyy saamaan geenimuutoksia korjaamaan.

”Evoluutio tapahtuu tietyssä aikakehyksessä, mutta molekyylikellot antavat elämän historiasta kuvan, joka on vakavasti ristiriidassa fossiiliaineiston kanssa. Kumpi on oikeassa?”<sup>107</sup>

Hypoteesi siis edellyttää muuttumatonta mutaationopeutta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että *mutaatiot eivät ole niinkään ajan kuin sukupolven funktio* – perimän muutokset on sidottu pikemminkin sukupolven vaihtumiseen kuin aikaan. Ja kun eri eliölajien toisistaan hyvinkin poikkeavat sukupolvien iät ja lisääntymisnopeudet huomioidaan, kello menettää paljon uskottavuuttaan. Molekyylikello, jonka piti ratkaista sukupuiden ongelmia, vaikuttaa ennemminkin pahentaneen kuin ratkaisseeseen niitä.

107 Morris S.C., Bringing Molecules into the Fold, *Cell* **100**(1):1–11, 7 January 2000, doi:doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81679-7. Simon Conway Morris on paleontologian professori Cambridgen yliopistossa (UK).



**Professori John C. Sanford** osoittaa kirjassaan *Eliömaailma rappeutuu* (Datakirjat 2015, tarkistettu 2. painos 2018), että evoluution sijaan ihmiskunta rappeutuu: [luominen.fi/emr](http://luominen.fi/emr).

## Yhteenveto ja johtopäätökset

Evoluutioteorian voitaneen katsoa kuuluvan 2000-luvun yleissivistykseen, onhan sitä opetettu Suomessakin ainakin jo koko itsenäisyytemme ajan. Sen opetukseen tulisi kuitenkin liittää tieteenfilosofian ja tietoteorian perusteet, jotta jo lukiolaiset oppisivat arvioimaan kriittisesti heille tieteenä tarjottua tietoa. Heidän tulisi saada tietää, mikä ero on nykyhetkessä tehtävillä havainnoilla ja toistettavilla kokeilla, ns. operatiivisilla tieteillä ja historiallisilla tieteillä (joiden piiriin myös evoluutio kuuluu).

Keskeisimmät operatiivisen tieteen alat ovat fysiikka ja kemia sekä niitä tukevat matematiikka ja informatiikka. Niin sanotut soveltavat tieteenalat, kuten geologia, teknologia ja lääketiede perustuvat näihin ”perustieteisiin” – niin kuin myös biologia/bio-

kemia, joka tutkii sitä, mistä, luonto ja eliöt koostuvat ja miten ne toimivat. Historialliset tieteet, vaikka hyödyntävätkin operatiivisten tieteiden menetelmiä ja välineitä, eivät kuulu ns. kovien tieteiden, operatiivisten tieteiden piiriin: Historialliset tieteet, kuten arkeologia ja rikostutkinta sekä oikeuslääketiede (engl. *forensic sciences*) nojautuvat tämän päivän todistusaineistoon

ja koettavat päätellä siitä, mitä eilen kenties tapahtui; oliko kyseessä murha vai luonnollinen kuolema jne. Painovoiman tai äänen ja valonnopeuden mittauksissa ei ole paljoakaan varaa erilaisille tulkinnoille ja mielipiteille; puhutaan ”eksakteista” (täsmällisistä) tieteistä. Toisin on historiallisissa tieteissä: Todistaja- ja asiantuntijalausunnokset ovat usein ristiriitaisia, syyttäjän ja puolustajan näkökannat ovat tavallisesti yhtä kaukana toisistaan kuin itä lännestä. Sama koskee ns. ”evoluutiotiedettä”. Esimerkiksi jonkin fossiilin (kuten kallo KNMER-1470) välimuotoisuudesta tai iästä saatetaan käydä kovia kiistoja. Oppikirjojen antama kaunisteltu, siloiteltu kuva ”tapahtuneesta evoluutiosta” on usein kaukana siitä, mitä kulissien takana tapahtuu: Apinaihmissen sirpaleisista jäänteistä kiistellään. Eri fossiilien löytäjät ovat toisilleen kateellisia, koska juuri oma löytö on se ratkaiseva ”puuttuva rengas”; jokainen haluaisi olla ihmisen esi-isän löytäjä. Paleontologit ja biokemistit ovat käyneet kiistaa esim. siitä mistä ja koska sammakkoeläimet tai valaat polveutuvat. Molekyylit ja molekyylikellot saattavat antaa aivan toisenlaisia osviittoja kuin paleontologien morfologiaan ja anatomiaan perustuvat johtopäätökset.



**Operatiivisen tieteen ja historiallisen tieteen välinen ero. Mikrobista mikrobiologiaksi -evoluutio ei kuulu todellisen tieteen piiriin.**

## Tarvitaan syvällisempää tiede- ja evoluutio-opetusta

Niinpä, kun puhutaan evoluutiosta ja evoluutiotutkimuksesta (ja varsinkin elämän synnyn tutkimuksesta), on muistettava, että usein liikutaan hämärän rajamailla, seuduilla, jonne tieteen valo ei aina loista. Evoluutio-opetusta tulisikin laajentaa tähän vähälle huomiolle jääneeseen suuntaan – oli se sitten poliittisesti korrekta tai epäkorrekta – tiede ei joka tapauksessa tunne korrektiutta. Parhaimmillaan tiede on sitä, että se tekee kaikkensa kyseenalaistaakseen esitetyt hypoteesit ja teorit. Jos se ei siinä onnistu, saattaa olla, että teoria on oikea. Ns. tieteellisistä teorioista, uusdarwinistinen evoluutioteoria<sup>108</sup> taitaa olla kaikkein helpoimmin kyseenalaistettavissa. Jos teoria voidaan perustellusti kyseenalaistaa, olisi parasta ruveta miettimään jotain parempaa vaihtoehtoa. Modernin synteisin tapauksessa sellaiseksi on tarjottu mm. ”laajennettua synteesiä”. Kukaan ei kuitenkaan vaikuta tietävän, mitä se on. Niinpä vuonna 2008 Itävallan Altenbergissä järjestettiin ”kriisikokous” suljettujen ovien takana. Kokoukseen osallistuneet alan 16 johtavaa tutkijaa eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen siitä, mitä tuo laajennus on (Kokoontuminen tunnetaan nimellä Altenberg 16.) Niinpä marraskuussa 2016 Lontoon Royal Society järjesti uuden, nyt avoimien ovien ”kriisikongressin” *New Trends in Evolutionary Biology*. Mukana olleen tiedetoimittaja Suzan Mazurin<sup>109</sup> mukaan tilaisuus jäi pannukakuksi: ”Miksi kongressiin kutsuttiin kansainvälisesti tunnustettuja henkilöitä, vaikka puhujilla ei ollut esitettävään juuri mitään tieteellisesti uutta (*if speakers had little new science to present*)? Miksi tuhlat ihmisten aikaa ja rahaa?” (Huffington Post).

### Loppusanat

Todellakin: miksi tuhlat ihmisten aikaa ja rahaa? Tai miksi tuhlat biologian tunteja tarinointiin: ”Kaasukehän arvellaan koostuneen epäorgaanisista kaasusta... Sateet piiskasivat autiota maankuorta ja irrottivat siitä erilaisia mineraaleja... Elämän arvellaan syntyneen kolmessa vaiheessa... Tumallisen solun arvellaan kehittyneen siten, että... Ravinnosta saatu lisäproteiini ja energia edistivät aivojen kasvua... Sosiaalisuus kehittyi, ja luonnonvalinnan seurauksena myös aivojen koko kasvoi.” Jne.

Kaikki me tiedämme, että luonnontieteiden perspektiivistä katsottuna tämä on pelkkää tarinointia – jopa valehtelua: ”Seuraavassa vaiheessa nämä elämän rakennusaineet liittyivät yhteen, jolloin muodostui isoja jättimolekyylejä: ensin DNA:ta ja sitten niiden ohjeiden mukaan syntyneitä proteiineja.”


108 Jos rehellisiä ollaan, darvinismin tapauksessa ei pitäisi lainkaan puhua tieteellisestä teoriasta, vaan pikemminkin evoluutio-olettamuksesta.

109 Mazur pääsi mukaan myös Altenbergiin, josta hän on kirjoittanut kirjan *The Altenberg 16*.

En suinkaan ole yksin ajatuksieni kanssa. Eräs tunnetuimmista evoluutioteorian kriitikoista on bioprosessiteknikan professori emeritus Matti Leisola, joka jakaa näkemykseni siitä, että darvinistisella evoluutiolla ei yksinkertaisesti ole mitään mekanisme. Hän on näyttänyt maailmanlaajuista mainetta alallaan – ei evoluutiokriittisyydestään johtuen, vaan *siitä huolimatta*. Hän oli alunperin evolutionisti ja närkästy kun evoluutio kyseenalaistettiin. Ryhtyessään puolustamaan evoluutiota hän huomasi sen monet puutteet ja päätyi evoluutiokriitikoksi. Hänen elämästään ja urastaan on kirjoitettu mielenkiintoinen kirja *Evoluutiouksen ihmemaassa*,<sup>110</sup> jossa elämäkerrallisen kerronnan lisäksi on meheviä teoria-osioita joissa asiat selitetään mielenkiintoisen selkeästi.<sup>111</sup>

Oma ehdotukseni on, että evoluutio-osio supistettaisiin siihen, mitä oikeasti tiedetään ja millä on merkitystä elämän sopeutumisen ja sen monimuotoisuuden kannalta kuten: Sopeutumismuuntelu (ja sen mekanismit kuten epigenetiikka), sopeutumislevittäytyminen, isolaatio, pullonkaulaus ja geneettinen ajautuminen, luonnonvalinta ja sen rajalliset mahdollisuudet (suuntaava, hajottava ja tasapainottava valinta). Oppilaille pitäisi korostaa, että jos mutaatiot eivät ole vaarallisia, ne ovat joko neutraaleja tai parhaimmillaankin vain erikoisolosuhteisiin sopeuttavia, mutta samalla rappeuttavia (kuten sairaalabakteerit). Heidän pitäisi saada myös tietää, että luonnonvalinta on aina eliminaatioprosessi, joka ei suinkaan luo uutta, vaan aina hävittää jotain jo olemassaolevaa. (Eikä kasvata aivojen kokoa!)

Spekulaatiot elämän synnystä ja makroevoluutiosta voitaisiin kuitata lyhyellä ”historiallisella katsauksella” esimerkkinä siitä, mitä ”biologian pimeällä keskiajalla” kuviteltiin. Näin varsinainen evoluutio-osio kutistuisi ehkä neljännekseen ja sen sijalla voitaisiin opettaa jotain hyödyllistä, kuten jo ehdottamaani tietoteorian perusteita sekä ekologiaa ja luonnonsuojelua.



110 Leisola M., *Evoluutiouksen ihmemaassa*, Datakirjat, 4. painos 2018, [luominen.fi/ihmemaassa](http://luominen.fi/ihmemaassa).

111 Suursuosittu kirja on käännetty myös saksaksi (*Evolution - Kritik Unerwunst*, 2017), englanniksi (*Heretic*, 2018) ja arabiaksi.



## ***Lukion opetussuunnitelman 2021 mukainen BIOS1 – elämä ja evoluutio***

**S**ANOMA PRON lukion biologia-sarjan osasta 1 on ilmestynyt uuden opetussuunnitelman mukainen painos. Vuonna 2018 kirjoittamani ”vastakirja” *BIOS 1 - elämä ja evoluutio – evoluutio-osion analyysi* perustuu vuoden 2016 laitokseen. Olen nyt lukenut uusimman lukion opetussuunnitelman mukaisen painoksen eikä ”vastakirjani” sen perusteella ole erityisen päivityksen tarpeessa: Perinteiseen tapaan uusi painos toistaa edellisen tarinoita; mitään oleellisesti uutta ei ole. – Ellei ”päivitykseksi” sitten katsota sitä, että kirjasta on jätetty pois kaksi kyseenalaista evoluution ”todistetta”:

”**Todiste**” 1: Vuoden 2016 painos kertoi seuraavaa

} *”Myös **alkionkehityksen** aikana tapahtuvaa rakenteiden kehitystä käytetään apuna evoluutiotutkimuksessa. Alkionkehityksen alkuvaiheessa eri selkärangaiset muistuttavat toisiaan. Kaikilla selkärangaisilla kehittyvät alkionkehityksen alussa kiduskaaret, joista myöhemmin muotoutuvat kaloilla kidukset ja nisäkkäillä muun muassa alaleuan luut ja kuuloluut” (s.147).* }

Tekstin vieressä oli kaksi valokuvaa kahden eri selkärangaisen alkioista (ilman kuvatekstiiä). (Vuoden 2008 laitoksessa on lähes samat kuvat + tekstit: ”Rotan alkio” ja ”Ihmisen alkio”).

”**Todiste**” 2: Lista ihmisruumiin ”surkastumista” yhteisen kantamuodon todisteina on lyhentynyt: viisaudenhampaat ja terävät kulmahampaat, vilkkuluomen jäännös, ruumiin karvapeite ja jaokkeinen vatsalihas on jätetty pois. Nyt vain häntänikamat ja korvanliikuttajalihakset ovat jääneet yhteisen evoluutiopolun todistajiksi. Parempi näinkin (vaikka siinäkin on kaksi liikaa). (Korvanliikuttajalihakset toimivat siis mm. kasvolihasina; etummainen kuuluu suupielen lihaksistoon.)

Lisäksi: Molekyylikelloa kuvaavan lauseen sanamuotoa on korjattu oikeaan suuntaan: Aikaisemmin kerrottiin, että ”Tietyissä DNA:n osissa tapahtuu mutaatioita vakionopeudella” (s.148). Nyt sentään tunnustetaan, että tämä on pelkkää oletusta: ”Molekyylikelon laatiminen perustuu oletukseen, että – –” (s.90).

Kirjan kustantaja sai *BIOS1:n* analyysin käsikirjoituksen kolmena kappaleena talvella 2018. Kustannustoimittaja lupasi lähettää ne paitsi kirjoittajille, myös ”Suomen johtavalle evoluution asiantuntijalle”. Heistä ei kuitenkaan kuulunut mitään. Soitin kuukauden kuluttua toimittajalle ja kysyin, että mitä mieltä he ovat; löytyykö asiavirheitä tai muuta huomautettavaa? Toimittaja oli kiusaantuneen oloinen ja sanoi, että jos nykyisessä on virheitä, ne pyritään korjaamaan seuraavassa painoksessa. Ehkä he huomasivat, että ainakin väitteet alkioiden samankaltaisuudesta ja surkastumista olivat virhe?

## Poimintoja uudesta kirjasta

### Luku 3: Perinnöllisyys ja lisääntyminen ovat elämän tunnusmerkkejä

Olisi jo ollut aika edes lyhyesti mainita, että ihmisen DNA:ssa on paljon, erittäin paljon muutakin ja muitakin kuin vain proteiineja koodaavia geenejä (kuten RNA-geenejä). Nyt vain todetaan, että ihmisellä on noin 20 000 geeniä ja se on siinä, mitä DNA sisältää. Sivulla 36 on ympyrä, ”Ihmisen geenien evolutiivinen alkuperä”:

} ”Ihmisen noin 20 000 geenistä vain 1 % on ihmislajille ominaisia geenejä. Tämä on yksi todiste }  
eliöiden yhteisestä alkuperästä ja evoluutiosta.” }

Näinhän jotkut ovat joskus luulleet, mutta luulot ovat radikaalisti muuttuneet, kun menetelmät 2010-luvulla kehittyivät ja halpenivat niin, että jo kymmenien tuhansien eliöiden koko genomit on kartoitettu ja tallennettu ”geenipankkeihin”, joissa ne ovat kaikkien luetavissa. Niistä käy ilmi, että jokaisen lajin proteiineista/proteiineja koodaavista geeneistä / geneettisistä ohjelmista 10–30 % on jokaiselle lajille ominaisia, uniikkeja, sellaisia, joita ei ole millään muilla lajeilla.<sup>1</sup> Puhutaan ns. singeltonista ja orpogeneeistä. Esimerkiksi ihmisellä on yli 600 sellaista geeniä, jotka puuttuvat simpanssin genomista ja vastaavasti simpanssilla on yli 900 sellaista geeniä, joita meillä ei ole. Tästä lisätietoa mm. biokemisti Branko Kozulicin mainiossa, keväällä 2021 ilmestyneessä kirjassa *The Essence of Biological Species*.<sup>2</sup> Evolutionistien 1980-luvun odotuksista, siitä, että laajamittainen geenien kartoitus tulee lopullisesti todistamaan yhteisen kantamuodon, Kozulic toteaa seuraavaa:

”To say that these expectations have failed to materialize would be an understatement, because it would still leave open the hope that future experimental data will make those expectations come true. But that will not happen: the fundamental premises serving as the ground for those expectations are now known to be false. And each additional sequenced genome proves them false once again. Currently the number of such clear-cut instances of falsification runs into tens of thousands, allowing us to pronounce a definitive judgement that is beyond a rational doubt” (p. 3-4).

Suomeksi: ”Sanoa, että nämä odotukset eivät ole realisoituneet, olisi vähättelyä, koska se jättäisi jäljelle toivon, että tulevaisuuden tutkimustieto osoittaisi näiden odotusten olleen sittenkin oikeita. Mutta niin ei tule käymään: näiden odotusten perustana olevien lähtökohtaoletusten tiedetään nyt olevan väärä. Ja jokainen uusi sekvensoitu genomi osoittaa ne kerta toisensa jälkeen vääriksi. Tällä hetkellä esimerkit tällaisista ilmiselvistä tapauksista ovat jo kymmenissä tuhansissa ja se oikeuttaa meidät julistamaan lopullisen tuomion ilman mitään järjellistä epäilyä.” (s. 3–4)

Tällä hetkellä joka päivä sekvensoidaan noin 30 ”uuden” eliön koko genomit.

1 Haemes *et. al.* sekä Rödelsperger C. *et. al.* (ks. viite 101 sivulla 98).

2 Kozulic, B., *The Essence of Biological Species*, ISBN 978-953-49358-0-4.

BIOS1:

”DNA:n kieli, **geneettinen koodi**, on samanlainen kaikilla eliöillä, sama emäsjärjestys tarkoittaa siis samaa asiaa, onpa kyse sitten bakteerisolusta, voikukan solusta tai ihmisen solusta. Tämä on yksi todiste eliöiden yhteisestä alkuperästä” (s. 38, korostus alkuperäinen)

Jos *toistuvat* vakuutellut yhteisestä alkuperästä jätettäisi hieman vähemmälle, sivumäärässä pysyminen mahdollistaisi edes lyhyesti kertoa, mitä geneettinen koodi tarkoittaa, ja että vaikka sitä sanotaankin universaaliksi, siitä on kuitenkin lukuisia poikkeuksia (jotka todistavat yhteistä alkuperää vastaan).

#### Luku 4: Mikroevoluutio perustuu mutaatioihin, luonnonvalintaan ja sattumaan

Kirjan mukaan mikroevoluutio perustuu mm. geenimutaatioihin, ”jotka ovat evoluutiolle välttämättömiä, koska niiden seurauksena populaatioon muodostuu uusia fenotyyppiejä”. Näin joskus onkin. Usein ne ovat kuitenkin esimerkkejä pelkästä degeneratiivisesta adaptaatiosta, rappeuttavasta sopeutumisesta (kuten sirppisoluanemia). Epigenetiikka on suhteellisen nuori tieteenala. Nyt kuitenkin eletään jo vuotta 2021 ja kirjoittajien, jos olisivat alaansa seuranneet, pitäisi tietää, että tavallisesti mikroevoluution takana eivät ole geenimutaatiot, vaan *epigeneettiset mekanismit*.<sup>3</sup> Epigenetiikka mullistaa käsityksemme siitä, miksi eliöt muuttuvat ja erityisesti, mihin muutos johtaa. Tämä paljastaa kirjan tekijöiden tietämättömyyden – tai salailun: darvinismin oppeja kyseenalaistavista tieteiden uusista tutkimustuloksista ei haluta kertoa.

#### Luku 5: Makroevoluutiosta populaatiosta syntyy uusia lajeja

Edellisessä luvussa kerrottiin, että ”Lajin määritelmä ei ole yksiselitteinen”, mutta ei kerrota miksi. Siksikö, että luvun 5 esimerkit makroevoluutiosta ovat nekin mikroevoluution maailmasta: jaavansarvikuono/isosarvikuono, saimaannorppa/itämerennorppa, harmaalokki/selkälokki, hernekerttu/pensaskerttu – ja tietysti: Darwinin sirkut!

Miksi näin? Siksikö, että oppilaat on helpompi saada uskomaan, että mikroevoluutio + paljon aikaa = makroevoluutio. Kun näet edetään hieman pidemmälle, ruvetaankin puhumaan ”avainsopeutumista” (joka sekun on siis makroevoluutiota):

”Sopeutumislevittäytyminen edellyttää yleensä jonkinlaisen sopeuman kehittymistä, joka mahdollistaa uuden elinympäristön valtaamisen tai kokonaan uuden elintavan. Tällaisia sopeutumisia sanotaan **avainsopeutumiksi**.  
Lintujen kehitys on hyvä esimerkki sopeutumislevittäytymisestä. Niiden tärkein avainsopeutuma oli lentokyky [– –]” (s. 76, *alleiviivaus* minun).

Todellisuudessa kaikki luvun 5 mainitsemat todelliset esimerkit elävästä elämästä, ”uusista lajeista” (siis ilman uusia avainsopeutumia) eivät ole muuta kuin ”mikroevoluutiota” eli biologisen perusr ryhmän (suvun tai heimon) sisäistä muuntelua, joka pääosiltaan perustuu epigeneettiseen säätelyyn.

3 Katso esimerkiksi Aalto, T., Epigenetiikka, *Luominen* 40:54–58, 2021; [luominen.fi/L40](http://luominen.fi/L40).

## Luku 6: Eliömaailman luokittelu perustuu evoluutiotutkimukseen

*”Käsitys eliömaailman kehityksestä perustuu tieteelliseen tietoon, joka on saatu selville joko kokeellisten tutkimusten tai havaintojen avulla. Eräs tieteenhistorian merkittävimmistä teorioista on Charles Darwinin **evoluutioteoria**, joka perustuu luonnonvalintaan. Teorian pohjana ovat Darwinin 1800-luvulla tutkimusmatkoillaan tekemät havainnot, fossiililöydöt ja näistä tehdyt johtopäätökset” (s. 82, alleviivaus minun).*

Kirjoittajat eivät ole tainneet edes lukea Darwinin kirjaa (josta laskin 696 oletusta ja 61 uskon ilmaisua). Darwin itse oli sen verran rehellinen, että myönsi, että ehkä painavin vastaväite, johon hänen teoriansa antaa aiheutta on se, että ”Geologia ei tosiaankaan osoita meille mitään tuollaista asteittaisesti toisiinsa liittyvien elollisten muotojen ketjua” (s.420). Darwinin mielestä tämä johtui ”geologian kertomuksen tavattomasta epätäydellisyydestä” (jota se ei enää ole). Huomaa alleviivaus johtopäätökset! Darwin tosiaankin teki johtopäätöksiä (joihin hänen havaintonsa eivät oikeuttaneet): Jos kerran pieni muutos (kuten sirkun nokan muoto) on mahdollinen, silloin mikä tahansa muutos on mahdollinen (ks. alle).

Kirjan tekijät yhä toistavat vanhoja mantroja – totta kai, kuten: ”fossiilien ikä voidaan määrittää tarkasti”, että nisäkäslisko ja liskolintu ovat välimuotofossiileja, että fossiiliarja kertoo hevosen historian, että eri selkärankaisten eläinten luuston perusrakenne kertoo yhteisestä alkuperästä ja että molekyylikello auttaa selvittämään milloin lajit erkanivat toisistaan.

## Luku 7: Elämä syntyi ja kehittyi merissä

Sama vanha tarina jatkuu: aurinkokunta syntyi tiivistymällä avaruuden kaasu- ja pölypyörteistä. Sitten kerrotaan yli sata vuotta vanha satu, jonka mukaan elämä syntyi tulivuorenpurkauksista, meteoriittipommituksista, UV-säteilystä ja sähköpurkauksista. Mitään varauksia ei esitetä – eipä tietenkään.

*Tiede*-lehden numerossa 4/2019 oli artikkeli ”Tuliko elämä avaruudesta?” (kursivointi minun):

”Astrobiologit uskoivat vuosikymmeniä, että elämä sai alkunsa merenpohjan mustissa savuttajissa. Mineraaleja ja kaasuja pursuavat kuumat kasaumat tuntuivat sopivilta elämän ensi kehdoilta. Kirsi Lehdon mukaan ajatuksesta on nyt luovuttu. Uusien arvioiden mukaan<sup>4</sup> äärimmäiset olot olisivat ehtineet hajottaa elämän molekyylit ennen elämän syntyä. Niinpä *elämän synty vaatii maan paljastumista*. Ajatusta tukee se, etteivät elämän varhaisimpia merkkejä säilöneet stromatoliititkaan näytä kehittyneen merissä vaan maankamaran laavakentillä.”

4 Nämä ”arviot” eivät ole mitään uusia; jokainen, joka tietää jotain kemian perusteista, ymmärtää, että vesimolekyylien lämpöliike nopeasti hajottaa elävän solun ulkopuolelle joutuneet biologiset makromolekyylit.

Mitä stromatoliitteihin tulee, *BIOS*:n sivulla 106 on kuva stromatoliiteista. Kuvateksti kertoo, että

} ”Syanobakteerit kukoistivat aikoinaan matalissa merissä ja muodostivat valtavia yhdyskuntia. }  
 } Näitä syanobakteerien ja muiden samaan aikaan eläneiden bakteerien fossiloituneita jäänteitä }  
 } kutsutaan stromatoliiteiksi.” }

### Luku 10: Eläimet sopeutuivat elämään maalla

Mitä tulee elämän siirtymiseen maalle, kirjamme lyhyessä tarinassa on edelleenkin mukana varsieväkala *Tiktaalik rosae*, mutta myönnetään, että ”erikoisuudestaan huolimatta *Tiktaalik* oli kala, ja se lisääntyi ja saalisti vedessä”. Kirja kuitenkin väittää, että ”*Tiktaalik* liikkui välillä maallakin”. Kukaan ei kuitenkaan tainnut olla tuota maihinousua todistamassa, mutta jotkut uskovat, että otus saattoi etueviensä varassa nousta vesirajalle liejuryömijän tapaan. Voihan se tietysti niinkin olla. Jennifer Clack kuitenkin toteaa, että *Tiktaalikilla* eviensä varsista huolimatta oli viuhkaevät ja että muutoinkin se oli tukirankansa puolesta kyvytön liikkumaan maalla.<sup>5</sup> Mistähän kirjamme tekijät ovat saaneet sellaisen tiedon, että *Tiktaalikilla* oli sekä kalan, matelijan että *nisäkkään* piirteitä (s.138)? Lisäksi he väittävät, että ”Sen ja vastaavien muiden kalafossiilien löytäminen on antanut lisätietoa eläinten vähittäisestä sopeutumisesta maaelämään”. Mitähän nämä kalafossiilit ovat olleet? Alla tavallisimmat ehdokkaat:

Vuoden 2016 laitoksessa oli vielä kuva ”kalasammakko” *Acanthostegasta* mukamas ensimmäisenä maaselkärankaikana, mutta nyt siitä ei puhuta mitään.<sup>6</sup> Yksi ehdokas on ollut Latviasta löytynyt petokala *Panderichtys*. Evolutiivinen aukko *Panderichtysin* ja ensimmäisten maaselkärankaisten välillä oli paleontologien mukaan kuitenkin merkittävä (a major gap) – kunnes vuonna 2006 löydettiin aukon täyttäjän, *Tiktaalik rosae*! Tämän alkuinnostuksen huumassa paleontologi Neil Schubin erehtyi tunnustamaan, että aukko oli ollut jopa ”turhauttavan suuri” (tiedelehti *Nature*). Mutta: pari vuotta myöhemmin Puolasta eräästä kalkkikivikerrostumasta löytyi selvät, noin kaksimetrisen salamanterin tai liskon jalanjäljet, joiden piti ikämäärityksen mukaan olla *Tiktaalikia* 18 miljoonaa vuotta vanhempia! Jennifer Clack perehtyi tapaukseen ja kertoi *The Guardian* -lehden haastattelussa 5. tammikuuta 2010, että ”Nämä jäljet pakottavat radikaaliin uudelleenarvioon siinä mitä tulee ajoitukseen, ekologiaan, maaselkärankaisten evoluutioon ja fossiiliaineistoon yleensä. Näiden jalanjalkien myötä ’maaselkärankaisten evoluutio lentää ulos vedestä’ ”.

*Panderichtyksen* rinnalla toinen siirtymäehdokkaat on ollut ”kalasammakko” *Acanthostegaa* viisi miljoonaa vuotta vanhemmaksi arvioitu *Ichtyostega*. Sillä oli kuitenkin kidukset myös aikuisena ja se oli muutenkin sopeutunut elämään vedessä eivätkä sen varsievät ja muu luusto kyenneet kannattamaan sitä maalla.<sup>7</sup> Clack’n mukaan *Ichtyostega* oli ”sekasotku mosaiikkimaisia piirteitä”, omituinen ja omalla tavallaan erikoistunut devonikauden varsieväkala, eikä se missään nimessä edusta sitä devonikauden nelijalkaista, josta maaselkärankaikaiset olisivat voineet kehittyä.

5 Jennifer Clack, viimeaikojen ehkä tunnustetuin selkärankaisten paleontologi oli sitä mieltä, että sekä *Tiktaalik* että *Acanthostega* olivat täydellisesti sopeutuneita elämään vedessä, josta ne eivät koskaan poistuneet (*The Fish-Tetrapod Transition in Evolution: Education and Outreach*, 2009,2:213-23).

6 Viite 5 (Clack, J, 2009)

7 (Pierce ym. 2012).

Sivulla 85 on elävän varsieväkalan, *Latimerian* (joka on syvänmeren kala) *valokuva* ja sen alla tekstissä kerrotaan, että ”Varsieväkalojen *esi-isistä* kehittyivät ilmeisesti ensimmäiset maaselkärankaist, sammakkoeläimet”. Sivulla 139 puolestaan kerrotaan, että

} **”Sammakkoeläimet kehittyivät todennäköisesti joissa ja jokisuistoissa eläneistä varsieväka-** }  
} **loista. [– –] Eivätkä kehittyivät ajan kuluessa maalla liikkumiseen soveltuvat raajat.”** }

Evien kehittymisestä ei kuitenkaan ole mitään todisteita ja on kummallista, että vähän aikaisemmin (s. 85) kirja kertoo, että sammakkoeläimet kehittyivät – eivät varsieväkalosta – vaan niiden esi-isistä! Eikö viuhkaeväisistä pitänyt kehittyä ensin varsieväisiä ja vasta niistä sammakkoja?

Sivulla 138 on puolestaan *taiteilijan näkemys* sukupuuttoon kuolleesta varsieväkalasta, *Tiktaalikista* ja sen elinympäristöstä, matalasta rantavedestä. Sen serkku *Latimeria* on kuitenkin syvemmän meren rinteiden ja riuttojen voimakkaissa virtauksissa elävä pohjakala (josta syystä varrelliset evät). Miksi *Tiktaalit* oli matalien rantavesien kala? Siksi, että sen piti muuttaa maalle? Entä jos sekin oli syvempien vesien kala, eikä koskaan tullut tiedustelemaan jokisuiston maisemia?

Niin tai näin, kalojen muuttuminen sammakkoeläimiksi on kirjoittamme mukaan kuitenkin selvää ilman *Tiktaalikia*, keuhkokalaa tai muuta ”esimaaeläintä”. Miksi? Siksi että *evoluutioteoria edellyttää sitä* – sitä, että jollekin kalalle, mikä se sitten lieneekin ollut, oli pakko kehittyä *avainsopeutumia*: ”uudenlainen hengitys- ja liikuntaelimestö” (s.138) – noin vain simp-sala-pim! Entä täysin erilainen verenkierto, munuaiset, maan päällä toimiva kuulo- ja näköaisti, kuivuutta kestävä iho, toukan muodonvaihdos eli morfogeneesi aikuismuodoksi jne? (Opettaja varmaan voi ne selittää – jos joku älyää kysyä?)

Välimuotoisiksi uskottuja, yllä mainittuja varsieväisiä piti elää keski- ja myöhäisdevonikaudella noin 385–365 miljoonaa vuotta sitten. Niiden fossiileja on siis löydetty vain tältä evoluution asteikolla hyvin lyhyeltä ajanjaksolta. Sitä seuraa noin 30 miljoonan vuoden tauko, jota kutsutaan Rohmerin aukoksi (Rohmer’s gap). Näin siksi, että fossiilista ei toistaiseksi ole löytynyt mitään viitteitä vähittäisestä kehityksestä (jota teoria edellyttää) esimerkiksi *Ichtyostegasta* varsinaisiin sammakkoeläimiin. Ensimmäiset kiistattomat sammakkoeläinten fossiilit putkahtavat esiin vasta sitten kun hiilikauden alkamisesta oli kulunut 25 miljoonaa vuotta. Evolutionistien on jälleen kerran pantava toivonsa hamaan tulevaisuuteen, jolloin aukko ehkä täyttyy. Voihan niin uskoa, mutta se ei ole tiedettä (vaikka evoluutiota mainostetaankin tieteellisenä tosiasiana, josta on ”tonneittain todisteita”).

## Luku 11: Ihmisen evoluutio on osa kädellisten evoluutiota

Tässä kirja toistaa samaa vanhaa ”nuotiotarinaa”:

”Tulen käyttö oli tärkeä ravintoon liittyvä keksintö. Kun liha kypsennettiin, sen sisältämät ravintoaineet imeytyivät paremmin suolistosta vereen. Kypsennöksen ansiosta myös suurin osa ravinnon sisältäneistä haitallisista mikrobeista kuoli. Ravinnosta saatu lisäproteiini ja energia edistivät aivojen kasvua”, (s. 149-150).

Edistikö kypsän lihan syönti myös kallon kasvua, jota ilman aivot eivät voi kasvaa? Mistä tällainen ”koevoluutio”? Eikö tämä ole hölmöä: Tulen käyttö oli tärkeä keksintö. Miten apinamiehen pienillä aivoilla voitiin tehdä tällainen tärkeä keksintö? Tässähän pannaan rattaat hevosen eteen? (Olen pari kertaa katsonut TV-sarjaa Alastomat selviytyjät: Raavaat miehet itkevät, kun eivät saa tulta syttymään, vaikka heillä on valmiit välineet ja heille on kerrottu, miten tuli tehdään.)

Etelänapinat (apinaihmiset) istuvat myös uudessa BIOSI:ssä kuin täit tervassa. Ne ovat kirjan mukaan yhä linkki ihmisen ja ”yhteisen kantamuodon” välillä vaikka on jo pitkään tiedetty, että ne elivät Afrikassa yhtä aikaa ihmisen (pystyihminen) kanssa. Nyt on kuitenkin opittu sen verran, että varotaan puhumasta mistään yksittäisistä ”välitävistä” muodoista, kuten käteväihmisestä (*Homo habilis*) tai Lucysta (etelänapina). Kerrataan vain yleisellä tasolla vanhaa tarinaa, jonka mukaan noin 12 miljoonaa vuotta sitten Afrikassa käynnistyi valtava geologinen mullistus, kun mannerlaatta alkoi hajota kahteen osaan: Idänpuolisella alueella sateet vähenivät ja sademetsät joutuivat väistymään savannien tieltä.

”Savanneilla elävät kädellisten populaatiot joutuivat alttiiksi uusille **valintapaineille**. Lisäksi hautavajoama toimi **isolaatiotekijänä**, ja populaatiot alkoivat kehittyä erilaisiksi” (s.148, lihavointi alkuperäinen).

Sivulla 151 on kuvattu neljä kalloa:

1. Apinaihminen, aivokoko 500 cm<sup>3</sup>,
2. Varhainen ihminen [*Homo erectus*], aivokoko 850-1100 cm<sup>3</sup>,<sup>8</sup>
3. Neandertalinihminen, 1500 cm<sup>3</sup> ja
4. nykyihminen, 1350 cm<sup>3</sup>.<sup>9</sup>

Kallot ovat kirjan mukaan olleet erittäin tärkeässä roolissa kun on rakennettu ihmisen sukupuuta (s.14). Kallolla 1 (ilmeinen etelänapina) ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ihmisen sukuun kanssa: ”Lucy [etelänapina/apinaihminen] päätyi jopa suomalaisiin biologian oppikirjoihin. Maine on yhä tallella, vaikka nykyisin juuri mukaan paleoantropologi ei enää usko afarensiksen olevan ihmisiin johtavassa sukuhaarassa”.<sup>10</sup> Silti BIOSI tietää, että:

8 On syytä huomata, että *Homo erectus*’n aivojen koko oli vaihteluväliltään nykyihmisen kaltainen.

9 Pystykävelyn kehittymisen ohella aivojen koon kasvu on ollut evolutionisteille tärkeä, erittäin tärkeä tekijä ihmisen kehityspolulla. Kun sitten kävi ilmi, että alkukantaisena luolamiehenä pidetyn neandertalinihmisen aivokoko olikin suurempi kuin nykyihmisen, materialistinen selitysgeneraattori tuotti seuraavanlaisen ratkaisun: Kun aivokoko pieneni, neuronien väliset yhteydet lyhenivät, jolloin niiden kommunikointi nopeutui ja aivotointi tehostui! Tämän selityksen mukaan apinaihmissen tynkäaivojen pitäisi kait toimia noin kolme kertaa tehokkaammin kuin meidän aivojen?

10 Valste, J., *Evoluutio – Miten lajit kehittyvät*, SKS 2018, s. 191.

”Ensimmäiset ihmisen kehityslinjan edustajat olivat metsäsavanneilla eläviä **apinaihmisiiä**, jotka kävelivät kävelivät pystyasennossa ja osasivat käyttää alkeellisia työkaluja” (s. 148-9).

**Korostus** on alkuperäinen, tekstin vieressä on taiteilijan mielikuvituksen loihtima kuva apinaihmisistä eli Lucyn suvusta *Australopithecus*. Onko ”sukuhaara” sitten sama kuin ”kehityslinja”, lienee tulkintakysymys. Väite pystykävelystä on hyvin kiistanalainen ja ihmisen evoluution kannalta vähämerkityksellinen: Myös kengurut ja pingviinit kävelevät pystyssä, vaikka eivät olekaan ihmisen kehityslinjalla. Ja mitä työkaluihin tulee, kirja jättää kertomatta, että samoista kerrostumista, joista on löytynyt apinaihmisiiä ja työkaluja, on löytynyt myös pystyihmisen, siis ”oikean ihmisen” luita. Työkalut ovat siis ihmisten, eivät apinaihmissien valmistamia (ks. esim. kirjoitukseni ”Apinoiden planeetta 2”).<sup>11</sup>

Ei pitäisi olla enää mikään salaisuus, että etelänapinat olivat uniikki, sukupuuttoon kuollut kädellisryhmä. Charles Oxnardia (s.1933) on pidetty ehkä kaikkien aikojen arvostetuimpana anatomina mitä tulee ihmisen oletettuun evoluutioon. Oxnardin mukaan etelänapinoiden ainutlaatuinen anatomia puhuu sen puolesta, että kyseessä ei ollut välittävä muoto: ne erosivat sekä ihmisistä että Afrikan suurista apinoista enemmän kuin mitä nämä kaksi eroavat toisistaan.

Palataan ennen yhteenvetoa vielä lyhyesti kirjan alkupuolelle.

## 1.7 Biologinen tutkimus noudattaa tiettyjä vaiheita

”Saadut tutkimustulokset voivat joskus olla niin yllättäviä, että tutkijalta vaaditaan myös rohkeutta puolustaa niitä. Esimerkiksi Darwinin evoluutiotutkimuksen tulokset herättivät valtavan vastarintaa 1800-luvun Englannissa” (s.14).

Tässä on mielenkiintoista se, että vastarinta (perusteltu ja edelleenkin pätevä) syntyi, ei kirkon, vaan tiedeyhteisön piirissä! Ja jos rehellisiä ollaan ja mitä Darwiniin tulee, kysymys ei ollut *tutkimustuloksista* vaan niistä johtopäätöksistä, jotka hän teki kenttähavainnoistaan: Darwin huomasi esimerkiksi Galápagosin sirkkujen ja kilpikonnien muuntelevan. Tästä hän teki sen epätieteellisen johtopäätöksen, että jos pieni muutos (”mikroevoluutio”) on mahdollinen, se johtaa valtaviin muutoksiin, jos on käytettävissä paljon aikaa (miljoonia vuosia).

Nykyään vaaditaan kuitenkin rohkeutta, jos tutkija uskaltaa esittää ja puolustaa tutkimustuloksia, jotka ovat evoluutioteorian ja sen ”syvän ajan” perspektiivistä katsottuina yllättäviä. Tähän tilanteeseen joutui esimerkiksi Mary Schweitzer, kun hän löysi hyvin säilyneitä pehmytkudoksia 69 miljoonaa vuotta vanhaksi väitetyn *Tyrannosaurus rexin* reisiluun ytimeistä. Hänen esimiehensä Jack Horner hermostui ja väitti löytöä virhetulkinnaksi. Schweitzer kumosi väitteen ja kysyi, että mikä näyttö hänelle riittää. ”Ei mikään!” vastasi Horner. Ja eipä vielä uusinkaan BIOS1 puhu mitään näistä nyt jo sadoista (tuhansista?) ns. orgaanisista fossiileista, joita on alkanut löytyä ympäri maailmaa – nyt kun niitä on nyt opittu etsimään.

Jo lukiolainenkin ymmärtää, että verisuonet, verisolut ja hermot eivät voi säilyä taipuisina ja tunnistuskelpoisina miljoonia vuosia lähellä maanpintaa kosteissa (ja lämpimissä) sedimenttikerrostumissa: Vesi, molekyylien lämpöliike ja luonnon taustasäteily hajottavat

11 Apinoiden planeetta 2 – *Homo habilis*, pieni mies, jota ei ollut olemassa ja muita tarinoita ihmisen evoluutiosta [luominen.fi/apinoiden-planeetta-2](http://luominen.fi/apinoiden-planeetta-2).



ne, ellei tuhansissa, niin viimeistään kymmenissä tuhansissa vuosissa. Kirja tosin mainitsee meripihkassa säilyneet kokonaiset hyönteiset ja Siperian ikiroutaan hautautuneet mammutit, muttei puhu mitään hyvin säilyneistä pehmytkudoksista (puhumattakaan DNA:sta): ”Fossiilit jaetaan syntytapansa perusteella kivettyisiin, valelmiin ja painaumiin” (s.83). Ehkä *BIOS*:n kirjoittajat olivat vielä v. 2016 tietämättömiä dinosauriossien pehmytkudoksista, mutta tuskin enää; ehkä nyt voisi ruveta epäilemään, että kyseessä on salailutapaus. Jopa kotimainen lääketieteellinen aikakauslehti *Duodecim* kertoi asiasta jo vuonna 2005 otsikolla ”Hirmuliskon verisuonet”:<sup>12</sup>

”Tutkijat löysivät ikivanhan *Tyrannosaurus rexin* luurangon pohjoisilta Kalliovuorilta. He demineralisoivat aseptisissa oloissa reisiluun palan ja onnistuivat eristämään läpinäkyviä, taipuisia ja onttoja verisuonia. Suonia voi venyttää useita kertoja niin, että ne palautuivat alkuperäiseen kokoonsa. [– –] Kyseessä ei ole uuden tietiselokuvan prologi vaan paleontologiryhmän *Science* -lehdessä (2005;307:1952) julkaisema raportti. [– –] 69 miljoonaa vuotta vanhat verisuonet ja -solut näyttävät kuvissa kuitenkin niin samanlaisilta kuin nykyisin laboratoriossa eristetyt tuoreet vastineensa, että mielikuviutus lähtee helposti laukkaamaan.”

*Microscopy Today* -lehti julkaisi tämän vuoden (2021) maaliskuussa artikkelin sarvi-naamasauruksen kallosta löytyneistä taipuisista hermosäikeistä ja niitä ympäröivistä kaksoiskierteisistä, kollageenin muodostamista hermotupista.<sup>13</sup> Osoitteesta [luuminen.fi/biolista](https://www.luuminen.fi/biolista) löytyy päivitetty lista vertaisarvioituissa tiedelehdissä julkaisuista pehmytkudostapauksista.

Kaikenlaisia selitysyrikyksiä on tarjottu, kuten ”mahdollisesti läsnä olleen raudan suojaava vaikutus” tai ”näytteen pinnalle syntyneen polymeerin suojaava vaikutus” tai jopa väite, että kyseessä on pelkkä artefakta kuten bakteerien myöhemmin muodostama biofilmi. Nämä kaikki on ollut helppo torjua.

### Summa summarum: LOPS 2021 yhteenveto

Mitään uusia evoluution todisteita uusi *BIOS* ei siis esitä, vaikka kahteenkin kertaan vakuutetaan, että ”tiedot tarkentuvat jatkuvasti”. Sitä ei kuitenkaan kerrota, miten tiedot ovat tarkentuneet. Trendi vaikuttaa olevan päinvastainen: yhä enemmän vanhoja tarinoita joudutaan hylkäämään ja uusia on vaikea keksiä. Esim. vielä vuoden 2008 laitoksessa kerrottiin ”kivihiihen evoluutiosta” kuvien kera:

}
}
*”Maapallolla oli laajoja sanikkaismetsiä 300 miljoonaa vuotta sitten. Suoalueille ja mataliin vesistöihin kerääntyi kuollutta kasviainesta. Hiekka ja savi peittivät maatuvan kasviaineksen, joka kovan paineen alla puristui kivihieksi” (s.102).*

Kuka tällaisia juttuja uskoo? Tuskin kukaan, jos viitsii vähänkin ajatella. Kirjoittajat ovat kai sen itsekin huomanneet? (Ja kaksi heistä on jo jäänyt pois.)

<sup>12</sup> *Duodecim* 121(13):1371, 2005.

<sup>13</sup> Armitage M., First report of peripheral nerves in bone from *Triceratops horridus* occipital condyle, *Microscopy Today* 29(2):20–25, 2021.

Nykyään esimerkiksi selkärankaisten alkioit tai ihmisen terävät kulmahampaat, karvapeite, suora vatsalihas ja umpilisäke eivät enää ole niin hyviä todisteita evoluutiosta kuin mitä aikaisemmin vakuutettiin. Niinpä syntynyttä ”vajetta” yritetään paikata oikeudenkäynneistä tutuksi tulleella *vakuutteluargumentilla* heti kirjan alussa (jossa todistajina esiintyy useita kalloja):

*”Hypoteesin paikkansapitävyys testataan tutkimuksen avulla. Tutkija laatii tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen. Tutkimussuunnitelmaan kuuluu esimerkiksi se, mitä tutkimusmenetelmiä käytetään ja millainen koejärjestely on. Osassa tutkimuksista hypoteesi testataan etsimällä havaintoaineistoa, kuten fossiileja. Esimerkiksi ihmisen evoluutiotutkimuksessa eri puolilta maailmaa löytyneet fossiloituneet kallot ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa, kun on rakennettu ihmisen sukupuuta” (s.14).*

Sivulla 151 kuvatut neljä ”erittäin tärkeää” kalloa eivät siis kuitenkaan vakuuta muusta kuin siitä, että joskus oli olemassa etelänapinoita ja että ihmisen kalloissa on aina (ja vieläkin) esiintynyt kohtalaisen runsasta lajin sisäistä muuntelua (josta osa johtuu sairauksista kuten kretinimistä, ks. Apinoiden planeetta).

### **Lopuksi pari irtopointia siitä, miten kaikki kehittyi tai ei kehittynyt (korostukset alkuperäisiä)**

*”Vaikka luonnonvalintaa ei enää ajatella olemassaolon taisteluna, jossa vahvat syrjäyttävät heikot, tai jotkin lajit kehittyvät toisia paremmiksi, ovat Darwinin yli sata vuotta vanhat päätelemät edelleen koko evoluutioteorian pohja” (s.83).*

Toistuvasti kirja kuitenkin korostaa luonnonvalinnan merkitystä. Mitähän tämän kirjan luonnonvalinnalla oikein tarkoitetaan? Miksi olemassaolon taistelun tärkeää merkitystä ei enää haluta tuoda esiin? Sehän on ikivanha totuus: ”Meidän voimamme määrätköön, mikä oikeata on; sillä se, mikä on heikkoa, osoittaa itsensä kelvottomaksi” (*Viisauden kirja*, 2:11, 100 eKr.).

*”Sosiaalisuus kehittyi, ja luonnonvalinnan seurauksena myös aivojen koko kasvoi” (s.150).*

*”Samalla tietoisuus kehittyi, koska piti pystyä ennakoimaan muiden ajatuksia ja tekoja” (s.153).*

Tämän tiedekirjana pidetyn teoksen rivien välistä kuulua – kuten odottaa saattaa, selvä materialistinen ideologia, jota entisessä Neuvostoliitossa kutsuttiin tieteelliseksi ateisiksi: Mitään varauksia ei esitetä niin kuin ”normaalissa” tieteellisessä kirjallisuudessa. Koska evoluutioideologia on pääaihe, muutamat perusasiat sivuutetaan kokonaan, kuten epigenetiikka ja RNA-geenit sekä se, mitä geneettinen koodi tarkoittaa. Voisi myös kertoa, miten tärkeä rakenne pystyasennossa kulkevan ihmisen lantionpohjalle häntäluu (*coccyx*, häntänikamat) on (tai vilkkuluomi, umpilisäke, ihon karvankohottajalihas jne.). Luulen, että itse pystyisin laatimaan paremman oppikirjan (ilman mitään uskonnollisia elementtejä). Laitan asian harkintaan; e-kirjana se saisi olla ladattavissa ilmaiseksi...

Muuan 30 vuotta lukion biologian ja maantieteen lehtorina toiminut henkilö kommentoi kirjaa mm. seuraavasti:

”Lukion biologian kirja BIOS1/LOPS2021 sisältää tarinan kerrontaa, satuja ja satukirjan kuvia huomattavan paljon. Samat valeet, mutta lukion biologian opetuksessa evoluution suhteettoman suureksi paisunut osuus ja aatteen ujuttaminen lähes kaikkiin kursseihin on entisestään vahvistunut. Kevyeksi on mennyt.”

### **Koralli BI<sub>1</sub>, lukion biologia**

Toinen käytössä oleva oppikirja *Koralli BI<sub>1</sub> – Elämä ja evoluutio* (Otava 2016, ei toistaiseksi uutta painosta) on vielä surkeampi – ainakin mitä evoluutiotarinaa tulee: Esimerkiksi sivulla 69 on kuva lihaksikkaasta miehestä, jonka vatsalla on hyvin näkyvissä suoran vatsalihaksen profiili ”jaokkeinen”. Vieressä on valokuva lohifileestä! Kirjan mukaan tämä on todiste siitä, että olemme kehittyneet kaloista: ”Kaikki muut ihmisen lihakset ovat jaokkeettomia, mutta vatsalihakset ovat jaokkeellisia. Rakenteen tai surkastuman taustalla on yhteinen alkuperä kalojen kanssa.”<sup>14</sup> Seuraavalla sivulla on kuvasarja Ernst Haeckelin vuonna 1874 vääristelemistä selkärankaisalkoista, joka on todiste yhteisestä kantamuodosta. Sitä seuraavalla sivulla on väärennetty valokuva koivumittareista puunrungolla: Kyseessä on kaksi preparaattia (tumma ja vaalea), jotka on liimattu runkoon (koivumittarit eivät lepäile puun rungoilla vaan lehvistön suojuissa.)<sup>15</sup>

### **Lopuksi vinkki:**

Muutamista BIOS1:n käsittelemistä aiheista kuten elämän synnystä löydät mielenkiintoista ja yksityiskohtaista lisätietoa toimittamastamme biokemisti Marcos Eberlinin kirjan Foresight (2019) suomenkielisestä lyhennelmästä. Kolme Nobel-palkinnon saanutta luonnontieteilijää suosittelee kirjaa: Sir John Gurdon (lääketieteen ja fysiologian Nobel 2012), Brian Josephson (fysiikan Nobel 1973) ja Gerhard Ertl (kemian Nobel 2007). Lisäksi suosittelijoiden listalla on mm. viisi kemian / lääketieteen professoria.

Lisätietoja kirjasta löydät nettisivuiltamme [luominen.fi/eberlin](http://luominen.fi/eberlin).

14 Kirjoittajat ovat täysin ulkona siinä, mitä tulee näiden lihasten anatomiaan ja funktioon: Ihmisen suoran (ja pitkän) vatsalihaksen (*musculus recti abdominis*) navan yläpuolisen osan perusyksikkö koostuu kolmesta tai neljästä peräkkäin kytketystä lihassäikeestä sekä niiden välisistä sidekudosjuosteista. Elastisilla ja lujilla sidekudossäikeillä on tärkeä funktio sekä pallean toiminnan että vatsan seinämän lujuuden kannalta. Kalan vartalon kymmenet rinnakkain kytketyt lihasyksiköt, ns. myomeerit taas saavat aikaan uintiliikkeen niiden supistuessa synkronisesti peräkkäin; anatomiat ja funktiot ovat ihmisellä ja kalalla täysin erilaiset.

15 Tämän Dr Kettlewell'n tekemän petoksen paljasti muuan suomalainen biologi jo ajat sitten. Itsellekin hyönteisiä 1960-luvulla keränneelle kuvasta herää heti epäily, että kyseessä taitavat olla preparaatit, eivät elävät perhoset.

# **BIOS 1 – ELÄMÄ JA EVOLUUTIO EVOLUUTIO-OSION ANALYYSI**

Evoluution sanotaan olevan yhtä varma asia kuin maan vetovoima, mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Jokainen voi tehdä tieteellisen kokeen ja pudottaa kappaleen vaikkapa tikapuilta. Painovoimaan liittyvää pudotuskoetta tekevä voi toistaa sitä miten monta kertaa tahansa ja havainnoida koetta nykyhetkessä.

Evoluutio mikrobista mikrobiologiksi on kokeellisen tieteen ulottumattomissa oleva todistamaton uskomus. Menneisyyden tapahtumia ei voida toistaa, eikä niitä voi mitenkään havainnoida nykyhetkessä. Evoluution voi "todistaa" vain uskomalla siihen. Enemmistö tiedemaailmasta on jo etukäteen sitoutunut naturalistiseen evoluutioparadigmaan, mikä tarkoittaa sitä, että ainoa sallittu selitys on kaiken syntyminen luonnollisilla prosesseilla – itsestään.

Tutkimustietoa pitäisi julkaista vapaasti, ilman evolutionistisen uskonnon etukäteisfilteröintiä. Asiaista kannattaa ottaa itse selvää. Tässä kirjassa kirurgi Mikko Tuuliranta analysoi evoluutio-osion lukion biologian oppikirjasta BIOS 1 – Elämä ja evoluutio (SanomaPro 2016). Hän osoittaa, miten heppoisin eväin evoluutiota tarjotaan ainoana selityksenä kaiken syntyyn. Disinformaatio erotetaan todellisesta tietees-  
tä viiltävällä tarkkuudella, ja lukijalle avautuu aivan toinen, todellinen kuva näennäistieteellisestä evoluutio-uskomuksesta. Kirja sopii erinomaisesti luettavaksi myös itsenäisesti, ilman lukion biologian kirjaa. Loppuvuodesta 2021 julkaistiin kirjan toinen painos, joka on lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukainen.

